

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 |

תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה:

1. שם התכשיר וצורתו: רוליד טבליות

2. הרכב: החומר(ים) הפעיל(ים) וכמותם/ריכוזם: כל טבליה מכילה 150 mg roxithromycin.
חומרים בלתי פעילים:

Hydroxypropyl cellulose, Poloxamer, Povidone, Colloidal anhydrous silica,
Magnesium stearate, Talc, Maize starch, Hypromellose, Anhydrous glucose,
Titanium dioxide, Propylene glycol.

3. פעילות רפואית:

תכשיר אנטיביוטי ממשפחת המקרולידים לטיפול בזיהומים בקטריאלים במערכת הנשימה כולל אף אוזן וגרון, זיהומים
ברונכופולמונרים, זיהומים ברקמות העור, וזיהומים במערכת המין (פרט לזיהומים גונוקוקים).

4. מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה, או לתרופה אחרת מקבוצת המקרולידים (כגון אריטרומיצין)
אין להשתמש בו-זמנית עם נגזרות ergot (לטיפול במיגרנה) עם cisapride (לטיפול ב-reflux של הושט) עם
pimozide (תכשיר נזירולפטי) או עם תרופות לטיפול באלרגיה המכילות טרפנדין או אסטמיזול.
אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך מיניקה

5. אין להשתמש בתרופה מבלי להוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
אם הינך בהריון
אם הינך סובלת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד:
הכליה/מערכת השתן
הכבד

6. אזהרות:

השימוש בתרופה זו עלול לגרום להרגשת סחרחורת.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
בטיפול ממושך או במינונים גבוהים יש לערוך בדיקות תפקוד כבד.

7. תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטלת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים
או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:
תרופות נגד קרישת דם ואנטיביוטיקות כגון: לינקומיצין, וכלוראמפניקול.
יש להוועץ ברופא אם הינך נוטלת ציקלוספורין A, תיאופילין, דיזופירמיד, דיגוקסין, מיזולום וטרפנדין, ברומוקריפטין

8. תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון:
שלשול, בחילה, הקאה, כאבים במערכת העיכול העליונה, חוסר תיאבון, במקרים נדירים שלשול דמי, סימפטומים הדומים
לפנקריאטיטיס.
בדומה לכל האנטיביוטיקות ממשפחת המקרולידים תתכנה תופעות של רגישות יתר כגון:
פריחה או נפיחות נדיר ביותר, ברונכוספיזם, שוק אנפילקטי, תתכן הרגשת סחרחורת, כאבי ראש, עייפות, חוסר תחושה,
יתכנו שינויים באנזימי הכבד (דווח על מקרה של צהבת עם עליה ברמת הבילירובין בדם), תיתכן אפשרות של התפתחות
מוגברת של זיהומי פטריות, הפרעות בחוש הטעם והריח.
במקרים אלו עליך לפנות לרופאך שיווה לך המשך טיפול בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעת לוואי שלא צויינה בעלון זה,
או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להיוועץ עם הרופא מיד.

10. מינון לפי הוראת רופא בלבד:

המינון המומלץ:

1 טבליה בבוקר ו-1 טבליה בערב למשך 10 ימים

אין להמשיך את הטיפול למעלה מ-10 ימים.

הרופא יתאים את המינון לחולים הסובלים ממחלות כבד חמורות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הקצוב, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.

11. אופן השימוש:

אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מעט מים כשעה לפני הארוחה או על קיבה ריקה.
אם מופיעות תופעות לוואי במערכת העיכול – יש ליטול את התרופה עם או לאחר הארוחה.

12. כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

13. מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות וע"י כך תימנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה עימך.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא! תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, לחולה אחר/ת היא עלולה להזיק. אל תתן תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך. אין ליטול תרופות בחושך. בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת התרופה, הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

14. אחסנה:

מקום קריר .

גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות אינן נשמרות לתקופות ארוכות. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לערבב תרופות שונות באותו מיכל.

מס' רישום התרופה:

רוליד טבליות 150מ"ג 417825741

יצרן: אוונטיס

כתובת: צרפת

בעל הרישום: סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ כתובת: ת.ד. 8090 , נתניה 42504
