

ביקורים במחלקה לרפואה דחופה מאפייני הפעילות 2015



ציונה חקלאי
ג'יל מרון, גלי שליצ'קוב, ד"ר יעל אפלבוים, מרים אבורבה

הפרסום "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה, 2015" מציג מאפיינים של הפעילות במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים לאשפוז כללי, כחלק ממערך הפרסומים של משרד הבריאות. מטרת הפרסום היא לסייע למקבלי ההחלטות במערכת הבריאות בתכנון, מעקב ומחקר על השימוש במחלקות לרפואה הדחופה בישראל במטרה לשפר את השירות לפונים.

הפרסום כולל מגמות בשיעור הביקורים במחלקות לרפואה דחופה וכן מדדים המצביעים על מאפייני הפעילות במחלקות לרפואה דחופה בהתאם לתכונות הדמוגרפיות והתחלואה של הפונים בשנת 2015 ומגמות בעשור האחרון.

נשמח לקבל הערות.

ציונה חקלאי

מנהלת אגף מידע

אגף המידע

ירמיהו 39, ירושלים

טל: 02-5082177

אתר משרד הבריאות: www.health.gov.il

עמוד הבית של אגף המידע: www.health.gov.il/moh-info

צור קשר: health.info@moh.health.gov.il



תוכן העניינים

הקדמה

6.....	הגדרות	
8.....	מבוא וממצאים עיקריים	
13.....	מספר ושיעור עמדות בתקן	1
15.....	מספר ושיעור ביקורים	2
21.....	מספר ושיעור מבקרים	3
25.....	ביקורים חוזרים	4
31.....	ביקורים לפי בית חולים	5
36.....	משך שהיה	6
46.....	תפוסה	7
52.....	זמן הפניה	8
62.....	גורם מפנה	9
65.....	סיבת כניסה	10
70.....	אשפוזים מהמלר"ד	11
78.....	פטירות	12
	אבחנות	13
80.....	13.1 אחוז כיסוי קידוד אבחנות במלר"ד	
86.....	13.2 אבחנות שכיחות לפי גיל	
101.....	13.3 אבחנות שכיחות לפי בית חולים	
116.....	13.4 אבחנות עם השכיחות הגבוהה והנמוכה	
124.....	13.5 קבוצות האבחנות	
	עונתיות	14
136.....	14.1 עונתיות - סיבת כניסה וגיל	
137.....	14.2 עונתיות - אבחנות שכתוחי	
142.....	מאפיינים גיאוגרפיים	15
148.....	נספח: רשימת אבחנות לפי קודי ICD-9-CM	
I-XIII.....	English Summary	

- עמדות בתקן: מספר העמדות לרפואה דחופה המאושר בתעודות הרישום שמשדר הבריאות מנפיק לכל בתי החולים.
- ביקורים: מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים.
- שיעור ביקורים מתוקנן: השיעור המתוקנן לגיל, כאשר אוכלוסיית התקן הוגדרה כאוכלוסייה ממוצעת בישראל בשנת 2009.
- אוכלוסיית התקן עבור שיעור הביקורים במלר"ד: אוכלוסייה ממוצעת בישראל בשנת 2009, בהתאם לקבוצות הגיל הבאות: 0, 1-4, 5-14, 15-17, 18-21, 22-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85+.
- אוכלוסיית התקן עבור שיעור הביקורים במלר"ד לפי קופת חולים: אוכלוסייה ממוצעת בישראל בשנת 2009, בהתאם לקבוצות הגיל הבאות: 0, 1-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85+.
- סיבות כניסה: כולל מחלה, סיבות חיצוניות ולידה.
- ביקורים עקב מחלה: ביקורים שנרשמה להם סיבת כניסה מחלה.
- ביקורים עקב סיבות חיצוניות: ביקורים עקב פגיעות מכוונות, תאונות דרכים, תאונות עבודה, תאונות לא מכוונות ותאונות עם כוונה לא ידועה, בהתאם לרישום סיבת הכניסה בבית החולים.
- ביקורים עקב לידה: כולל סיבת כניסה לידה או ביקורים שנרשמו במחלקה לרפואה דחופה יולדות.
- ביקורים ללא יולדות: לא כולל ביקורים עקב לידה.
- מבקרים: סך כל האנשים שפנו לקבלת טיפול במחלקה לרפואה דחופה במשך התקופה.
- התפלגות הביקורים למבקר: אחוז המבקרים שהיו במחלקה לרפואה דחופה פעם אחת, פעמיים, שלוש פעמים וכו' במשך התקופה.
- פטירות: מספר המבקרים שנפטרו במחלקה לרפואה דחופה, לא כולל מבקרים שהגיעו ללא רוח חיים, בהתאם לרישום בבתי החולים.
- אחוז פטירות: מספר הפטירות במחלקה לרפואה דחופה מחולק בסך כל הביקורים.
- אחוז אשפוזים: מספר המטופלים במחלקה לרפואה דחופה שהועברו לאשפוז באותו בית חולים מחולק בסך כל הביקורים.
- ביקורים חוזרים: חזרה למחלקה לרפואה דחופה באחד מבתי החולים בתוך זמן מוגדר מתאריך השחרור מהמחלקה לרפואה דחופה.

- אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות: מספר הביקורים החוזרים בתוך 24 שעות מחולק בסך כל הביקורים (ללא פטירות וללא אשפוזים) בתקופה.
 - אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות: מספר הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות מחולק בסך כל הביקורים (ללא פטירות וללא אשפוזים) בתקופה.
 - אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 יום: מספר הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים מחולק בסך כל הביקורים (ללא פטירות) בתקופה.
 - אחוז תפוסה: סך כל זמן שהיה בפועל של כל המטופלים במלר"ד במהלך התקופה מחולק בזמן הפוטנציאלי בהתאם למספר העמדות בתקן.
 - מדד ניצול עמדות: מספר הביקורים לעמדה בתקן בבית החולים מחולק במספר הביקורים לעמדה בתקן בארץ.
- (סה"כ הביקורים במלר"ד בבית החולים)

(סה"כ עמדות מלר"ד בתקן בבית החולים)

(סה"כ הביקורים במלר"ד ארצי)

(סה"כ עמדות מלר"ד בתקן ארצי)
- ממוצע שהיה: מספר השעות הממוצע שמטופל שהה במלר"מ, דכניסתו ועד שחרורו.
 - חציון שהיה: מספר השעות שמחצית המטופלים שהו במלר"מ, דכניסתם ועד שחרורם.
 - אחוז הביקורים במלר"ד יולדות עם רישום אבחנות הריון או לידה: אחוז הביקורים במלר"ד יולדות בהם נרשמה לפחות אבחנה אחת מקודי האבחנות המצביעות על הריון או לידה: V22, 630-677, V27, V23.
 - אחוז הביקורים עקב סיבות חיצוניות עם רישום אבחנות תאונות או פגיעות: אחוז הביקורים עקב סיבות חיצוניות בהם נרשמה לפחות אבחנה אחת מקודי האבחנות של תאונות או פגיעות: 800-999, ללא 999.9, או E-codes.
 - מחוז: בהתאם להגדרה המנהלית של משרד הפנים ורישום ישוב המגורים של הפונה בבית החולים.
 - יחס שיעורים: השיעור במחוז מחולק בשיעור הארצי.

הפרסום "ביקורים במחלקות לרפואה דחופה, 2015" כולל היבטים שונים של הפעילות במחלקה לרפואה דחופה בבתי החולים לאשפוז כללי בשנת 2015 והשוואה לשנים קודמות. בפרסום מגמות של מספר ושיעור העמדות בתקן ברמה ארצית, מגמות של שיעור הביקורים בעשור האחרון המבוסס על דיווח בתי חולים לאשפוז כללי, 28 בתי חולים ללא בתי החולים במזרח ירושלים. הפרסום כולל מידע על מאפיינים דמוגרפיים, מאפייני תחלואה, סיבות כניסה, מועדי כניסה ושחרור של הפונים ומאפייני הפעילות במחלקות לרפואה דחופה, שהיה ותפוסה בבתי החולים.

ממצאים עיקריים

עמדות בתקן: בסוף 2015 היו 1,195 עמדות לרפואה דחופה בתקן, מהן 1,176 בתי חולים לאשפוז כללי. שיעור העמדות לרפואה דחופה ירד ל-0.141 ל-1,000 נפש לעומת 0.152 בשנת 2006. המידע מבוסס על מאגר רישוי מוסדות רפואה המנוהל באגף לרישוי מוסדות רפואה ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, הכולל מידע על תעודות הרישום שמשרד הבריאות מנפיק לכל מוסדות הרפואה בישראל.

מספר ושיעור ביקורים: בשנת 2015 נרשמו כ-2.9 מיליון ביקורים, מהם כ-2.6 מיליון ביקורים ללא יולדות בכל בתי חולים הכלליים, ללא בתי החולים במזרח ירושלים. מספר ביקורים גבוה מעל 160 אלף נרשם בסורוקה, סוראסקי, שיבא, מאיר ואסף הרופא. כמחצית (48%) מהביקורים ללא יולדות היו בבתי החולים הממשלתיים ושליש (35%) בבתי החולים בבעלות שירותי בריאות כללית.

שיעור הביקורים המתוקן לגיל במגמת ירידה, 353 ל-1,000 נפש בשנת 2015 לעומת 349 בשנת 2012, ירידה ב-3%, ירידה בגיל צבא 18-21 ב-8%, בגיל 65-74 ב-7%, בגיל 1-14 ב-6%, וירידה לעומת עליה ב-10% בגיל 85 ומעלה. שיעור הביקורים גבוה לתינוקות עד גיל שנה, בגיל 18-34 ומגיל 35 במגמת עליה. שיעור הביקורים ללא יולדות המתוקן לגיל גבוה בקרב זכרים בהשוואה לנקבות, 322 ל-1,000 נפש לעומת 289 בשנת 2015. השיעור לזכרים גבוה במרבית הגילים פרט לגילאי 22-34. שיעור הביקורים המתוקן לגיל בשנת 2015 של מבוטחי כללית גבוה פי 1.5 בהשוואה למבוטחי מכבי ומאוחדת ופי 1.2 בהשוואה למבוטחי לאומית, משנת 2012 נרשמה ירידה ב-5% בשיעור הביקורים למבוטחי לאומי, ת-3% למבוטחי מכבי ומאוחדת וב-2% למבוטחי כללית.

מספר ושיעור מבקרים: בשנת 2015 בקרו כ-1.7 מיליון אנשים במחלקה לרפואה דחופה לפחות פעם אחת. כשני שלישי (67%) מהמטופלים פנו פעם אחת בלבד, 26% פנו 2-3 פעמים ו-7% פנו 4 פעמים ומעלה במהלך השנה (70%, 25% ו-5%, בהתאמה, מהפונים ללא יולדות). כמחצית הפונים בגיל 85 ומעלה ביקרו לפחות פעמיים במשך השנה במלר"ד. ממוצע הביקורים ללא יולדות למבקר בשנת 2015 היה 1.5, ממוצע הביקורים גבוה לזכרים בהשוואה לנקבות במרבית קבוצות הגיל, פרט לגיל הפריון 15-44.

ביקורים חוזרים: אחוז הביקורים החוזרים במגמת ירידה בשנים האחרונות, 17.9% בתוך 30 ימים מכלל הביקורים ללא יולדות בשנת 2015 לעומת 18.4% בשנת 2010, 5.7%-ו-6.1%, בהתאמה, בתוך 48 שעות ו-3.5%-ו-3.7%, בהתאמה, בתוך 24 שעות. קיימת שונות בין בתי החולים, האחוז בתוך 24 שעות נע בין 2%-12% בבתי החולים, בתוך 48 שעות נע בין 3%-14% ובתוך 30 ימים נע בין 15%-26%. אחוז ביקורים חוזרים גבוה נרשם המשפחה הקדושה, שניידר, לניאדו, הסקוטי, מעייני הישועה, סנט וינסנט, יוספטל, שיבא, בילינסון והדסה הר הצופים. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים גבוה למבטחי כללית ולאומית לעומת מכבי ומאוחדת במרבית הגילים.

משך שהיה: בשנת 2015 חציון השהיה במלר"ד ללא יולדות היה 2.90 שעות, עלייה מ-2.48 בשנת 2012, מגמת עלייה נרשמה במרבית בתי החולים משנת 2012. חציון שהיה גבוה נרשם בבני ציון, שערי צדק, הדסה עין כרם, רמב"ם, בילינסון, הכרמל, שניידר, וולפסון, אסף הרופא, שיבא, סורוקה, קפלן וסוראסקי. חמישית (22%) מהמטופלים שהו מעל 5 שעות ו-6% שהו מעל 9 שעות. חציון השהיה למטופלים שאושפזו גבוה (3.73) בהשוואה לאלו ששוחררו (2.67). חציון השהיה במשמרת הערב קצר לעומת משמרת הבוקר והלילה. חציון השהיה עולה עם הגיל.

תפוסה: בשנת 2015 התפוסה הממוצעת במלר"ד היתה 111%, עלייה מ-100% בשנת 2012. מהשעה 12:00 בצהריים ועד חצות התפוסה גבוהה מעל 120% ובשעות 14:00-16:59 מעל 150%. בחורף התפוסה גבוהה יותר בכל בתי החולים. תפוסה גבוהה מהממוצע הארצי נרשמה בקפלן (258%), שניידר (185%), ברזילי (184%), שיבא (164%), מאיר (152%), בילינסון (143%), רמב"ם (137%), סורוקה (134%), סוראסקי (133%), שעריצדק (124%) ווולפסון (120%).

מדד ניצול העמדות במלר"ד מחושב לפי מספר הביקורים לעמדה בתקן בבית החולים ביחס לממוצע הארצי. ניצול העמדות גבוה בקפלן, סנט וינסנט, ברזילמ, יאיר, שיבא, סורוקה, שניידר וסוראסקי.

זמן הפניה: שעות העומס עם מספר כניסות גבוה ממספר שחרורים, הן השעות 09:00-13:59 ושעות הערב 18:00-20:59. ביום נר'אשם מספר הביקורים הגבוה ביותר ובשבת הנמוך ביותר. בערב שישי מספר הביקורים נמוך לעומת שאר ערבי השבוע. מספר הפניות של גילאי 45 ומעלה גבוה יותר בשעות הבוקר, ושל ילדים וצעירים עד גיל 25 גבוה יותר בשעות הערב. מספר ההעברות לאשפוז יציב מחצות היום עד חצות הלילה. עשירית מההעברות לאשפוז היו בשעות הבוקר וחמישית בשעות הצהריים. מספר ההעברות לפנימיות גבוה יותר בשעות 15:00-21:59. למבטחי מכבי מספר ביקורים נמוך יותר בשעות 17:00-19:59 בהשוואה לשאר הקופות, ומספר הביקורים בשעות 10:00-12:59 גבוה יותר למבטחי לאומית.

גורם מפנה: כשני שלישי (69%) מהביקורים בשנת 2015 היו עם הפניה רפואית, 72% עקב מחלה ו-60% עקב סיבות חיצוניות, עליה מ-63%, 67% ו-53%, בהתב, המאשנת 2006. אחוז הביקורים עם הפניה רפואית גבוה בקרב מבוטחי כללית (76% עקב מחלה ו-64% עקב סיבות חיצוניות) בהשוואה לשאר הקופות, למבוטחי מכבי נרשם האחוז הנמוך ביותר (64% ו-51%, בהתאמה).

סיבת כניסה: בשנת 2015, שני שלישי (65%) מהביקורים היו עקב מחלה, 21% עקב סיבות חיצוניות ו-13% ללידה בהשוואה ל-65%, 25% ו-10%, בהתאמה, בשנת 2006. שלושה רבעים מהביקורים ללא יולדות היו עקב מחלה ורבע מסיבות חיצוניות. כשליש (30%) מפניות הזכרים היו מסיבות חיצוניות לעומת 19% מפניות הנקבות. מספר הביקורים עקב סיבות חיצוניות גבוה לזכרים עד גיל 65 בהשוואה לנקבות, במיוחד בגיל 13-14 (פי 2.6 בהשוואה לנקבות) ובגיל 20-21 (פי 3.0 בהשוואה לנקבות), ואילו בגיל 82 ומעלה מספר הביקורים של נקבות גבוה פי 2 בהשוואה לזכרים. בשנת 2015, שני שלישי (68%) מהביקורים עקב סיבות חיצוניות היו כתוצאה מפגיעות לא מכוונות או ללא כוונה ברורה, חמישית (19%) עקב תאונות דרכים, עשירית (10%) עקב תאונות עבודה ו-3% היו פגיעות מכוונות.

אחוז האשפוזים: אחוז האשפוזים מכלל הביקורים ללא יולדות היה 27% בשנת 2015 בהשוואה ל-29% בשנת 2006, 32% עקב מחלה, 11% עקב סיבות חיצוניות ו-48% לנשים שהגיעו ללידה. רבע (25%) מהפונים עקב פגיעה מכוונת אושפזו, 23% לאחר פעולות איבה, 13% מפגיעה לא מכוונת, 8% לאחר תאונת דרכים, 7% מכוונה לא ידועה ו-6% לאחר תאונת עבודה. אחוז האשפוזים גבוה (32%) לתינוקות עד גיל שנה ומגיל 55 ומעלה, 34% בגיל 55-64, 43% בגיל 65-74, 53% בגיל 75-84 ו-61% בגיל 85 ומעלה. אחוז האשפוזים מהביקורים ללא יולדות גבוה יותר לפונים שהגיעו בשעות 05:00-07:00 וכן לאלו שהשתחררו בשעות 08:00-10:00. שלישי (33%) מהפונים שאושפזו הועברו לפנימיות, 14% ליולדות, 10% לילדים, 10% לנשים, 10% להשהיה, 7% לכירורגיה כללית, ו-16% בשאר המחלקות. אחוז האשפוזים של מבוטחי לאומית גבוה בהשוואה לשאר הקופות לילדים עד גיל 4 ולגילאי 45 ומעלה. למבוטחי כללית נרשם אחוז האשפוזים הנמוך ביותר בכל הגילאים. אחוז האשפוזים מכלל הביקורים ללא יולדות גבוה מהממוצע הארצי בהדסה עין כרם (41%), בני ציון (40%), רמב"ם (38%) נהריה (33%), שיבא (32%) ושערי צדק (31%). אחוז אשפוזים גבוה לפונים בגיל 65 ומעלה נמצא בנהריה, רמב"ם, בני ציון, ברזילי, הדסה עין כרם, לניאדו והלל יפה ולפונים עד גיל 17 בהדסה עין כרם ובבני ציון.

פטירות: בשנת 2015 היו 2,057 פטירות במלר"ד, 1,807 עקב מחלה ו-209 מסיבות חיצוניות. אחוז הפטירות מכלל הביקורים במלר"ד רשם עליה קלה בשנים האחרונות, 0.07% בשנת 2015 לעומת 0.05% בשנת 2006. האחוז גבוה לזכרים (0.09%) בהשוואה לנקבות (0.05%) ועולה עם הגיל. כשני שלישי (70%) מהנפטרים היו בגיל 65 ומעלה

תחלואה: בשנת 2015 85% מהביקורים היו עם קידוד אבחנה מוגדרת בהשוואה ל-78% בשנת 2012. האחוז נמוך במעייני הישועה (35%), הדסה עין כרם (45%), המשפחה הקדושה (66%), הדסה הר הצופים (68%), סורוקה (75%), ברזילי (76%), שערי צדק (78%), סוראסקי (80%), בילינסון (81%). אחוז הביקורים במלר"ד יולדות עם קודי אבחנות המצביעות על הריון או לידה היה 60% ואחוז הפניות עקב סיבות חיצוניות עם קידוד אבחנות של תאונות או פגיעות היה 76%.

בשנת 2015, האבחנות השכיחות שנרשמו היו הריון ולידה (8.8%), סימפטומים כלליים (6.7%), סימפטומים של בטן ואגן (6.2%), כאבים בחזה (4%), חום, בדיקות חשד למצבים שלא אומתו, סימפטומים נשימתיים, סיבוכים של הריון ולידה, וכן שברים, פציעות וחבלות שונות. אחוז הפניות עקב חום גבוה בקרב ילדים בגיל 0-4, 13% לעומת 3% מכלל הביקורים.

אחוז האשפוזים: האחוז גבוה לפונים עם אלח דם, דלקת תוספתן, אוטם שריר הלב, בצקת ריאות, מחלות כלי דם במוח, מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, שבץ מוחי, אירוע איסכמי חולף, מחלות במערכת העיכול, פלאוריטיס, אי ספיקת כליות, מחלת ריאות חסימתית כרונית, אנמיה ודימום במערכת העיכול.

אחוז הביקורים עם הפניה רפואית: אחוז גבוה נרשם לפונים עם מחלות ורידים ומערכת הלימפה, אלח דם, דלקת תוספתן, זיהומי עור ורקמות רכות, אנמיה, הפרעות קצב, סימפטומים מטבוליים, מחלות כלי דם, היפרדות רשתית, ברונכיטיס, דלקת ריאות, זיהומים בכליות, סימפטומים עוריים והפרעות במערכת העצבים הפריפריית.

אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות: אחוז גבוה נרשם לפונים עם מחלות כלי דם במוח, חיון ולידה, זיהומים בכליות, הריון בסיכון גבוה, מחלת לב איסכמית, סיבוכים של הריון ולידה, מחלות במערכת העיכול, אירוע איסכמי חולף, סימפטומים במערכת השתן ומחלות כלי דם.

אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות: אחוז גבוה נרשם לביקורים עם אבחנה של הריון ולידה, הריון בסיכון גבוה, מחלות כלי דם במוח, מצבים שמקורם בזמן הלידה, זיהומים בכליות, סיבוכים של הריון ולידה, מחלת לב איסכמית, סימפטומים במערכת השתן, מחלות במערכת העיכול, מחלות כלי דם ומחלת ריאות חסימתית כרונית.

אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים: האחוז גבוה נרשם לנשים בהריון בסיכון גבוה, נשים בהריון לקראת לידה, סיבוכים של הריון ולידה, פלאוריטיס, שאתות, בצקת ריאות, מחלת ריאות חסימתית כרונית, אי ספיקת לב, אנמיה, מחלות דם וכלי דם, מחלות אנדוקריניות, אי ספיקת כליות, סימפטומים בדרכי השתן והפרעות פסיכוטיות.

חציון שהיה: חציון שהיה גבוה נרשם לפונים עם דלקת תוספתן, אי ספיקת כליות, מחלות במערכת העיכול, אירוע איסכמי חולף, מחלות כלי דם במוח, מחלות במערכת העצבים המרכזית, אבנים בכיס

המרה, אפילפסיה, מחלות מטבוליות, שבר בעמוד שדרה וגו', סוכרת, סחרחורת, פגיעה עצמית ושימוש באלכוהול וסמים.

חציון שהיה למטופלים שאושפזו: חציון השהיה גבוה נרשם למטופלים שאושפזו עם השפעות מאוחרות של מחלות כלי דם במוח, דלקת תוספתן, יתר לחץ דם, תאונות דרכים, שימוש באלכוהול וסמים, סימפטומים של ראש וצוואר, שברים בעמוד שדרה וגו', מחלות במערכת העצבים המרכזית והפריפריית, סחרחורת, נפילות, סימפטומים של בטן ואגן, אבנים בכיס מרה, אי ספיקת כליות ומחלות במערכת העיכול.


עונתיות: מספר הפניות עקב סיבות חיצוניות לילדים בגיל 0-14 נמוך בחורף וגבוה בשאר החודשים, ואילו לגילאי 75 ומעלה המספר גבוה יותר בחורף. מספר הפניות עקב מחלה לילדים בגיל 0-4 ולגילאי 75 ומעלה גבוה בחודשי הסתיו והחורף ונמוך באביב ובקיץ. קיימת שונות בתדירות הביקורים במהלך השנה לפי סוגי המחלות, שחלקן מופיעות בתדירות אחידה וחלקן בעלות אופי עונתי. מספר הביקורים ממחלות זיהומיות בדרכי הנשימה, דלקת ריאות וברונכיטיס חריפה גבוה יותר בחורף. פניות עם חום מאופיינים בעונתיות שקשורה למחלות החורף ובאביב. ביקורים עם הפרעות נוירוטיות, חרדה ואלכוהוליזם מופיעים בשיעור יציב יחסית כל השנה, אך בחודשי החורף מספרם נמוך מעט בהשוואה לשאר חודשי השנה. מספר הביקורים עם יתר לחץ דם, הפרעות קצב לבביות ואי ספיקת לב גבוה יותר בסתיו ובחורף, ואילו מספר הביקורים עם כאבים בחזה, אוטם לבבי, שבץ מוחי ומחלות אנדוקריניות ומטבוליות יציב במהלך השנה. בחורף ניכרת עליה בביקורים עם מחלות ריאה כרוניות וניכרת עליה מאסתמה בתחילת הסתיו. ביקורים עם בעיות במערכת העיכול גבוהים יותר באביב ובקיץ. ביקורים עם דלקות בדרכי השתן וביקורים עם בעיות עור גבוהים יותר בעונות המעבר ובקיץ.

מאפיינים גיאוגרפיים: שיעור הביקורים ללא יולדות המתקנן לגיל במגמת ירידה במרבית המחוזות, פרט לשיעור יציב במחוז הצפון, ירידה בשיעור הביקורים ניכרת במיוחד בביקורים עקב סיבות חיצוניות. שיעור הביקורים ללא יולדות במחוז הצפון גבוה פי 1.29 מהממוצע הארצי, השיעור עקב מחלה גבוה פי 1.26 ועקב סיבות חיצוניות פי 1.37, במחוז חיפה שיעור הביקורים גבוה פי 1.04, 1.05 ו-1.04, בהתאמה, במחוז הדרום פי 1.02, 1.01 ו-1.01, בהתאמה, ובמחוז המרכז פי 1.04 עקב מחלה וסיבות חיצוניות בהשוואה לממוצע הארצי. במחוז ירושלים השיעור נמוך, 0.65 בהשוואה לממוצע הארצי, עקב מחלה 0.67 ועקב סיבות חיצוניות 0.56, גם ביהודה ושומרון השיעור נמוך, 0.66, 0.67 ו-0.63, בהתאמה, בהשוואה לממוצע הארצי. שיעור נמוך זה הינו, כנראה, תוצאה מפעילות סניפי "טרם" באזור. בנוסף, יש לציין כי השיעור בירושלים אינו כולל את פעילות בתי החולים במזרח העיר. בשנת 2015, מרבית הפניות היו לבתי חולים הממוקמים באותו מחוז המגורים, ובמרבית בתי החולים הפונים הגיעו מאותו המחוז.

ו. מספר ושיעור עמדות בתקן


מספר ושיעור העמדות לרפואה דחופה בתקן מבוסס על תעודות הרישום שמשדר הבריאות מנפיק לכל בתי החולים. בסוף 2015 היו 1,195 עמדות בתקן, מהן 1,176 עמדות בבתי חולים כלליים, 18 עמדות בבתי חולים פסיכיאטריים ועמדה אחת בבית החולים הרצוג בירושלים. בשנים 2006-2015 נוספו 114 עמדות לרפואה דחופה בתקן, אך שיעור העמדות ירד ל-0.141 ל-1,000 נפש בסוף 2015 לעומת 0.152 בסוף 2006.

מספר עמדות לרפואה דחופה בתקן, 2006-2015




שיעור עמדות לרפואה דחופה בתקן, 2006-2015


שיעור ל-1,000 נפש



מספר עמדות בתקן לפי סוג מוסד, 2015




מספר עמדות בתקן בבתי חולים כלליים, 2015




2. מספר ושיעור ביקורים

בשנת 2015 נרשמו כ-2.9 מיליון ביקורים במחלקות לרפואה דחופה, מהם כ-2.6 מיליון ללא יולדות. שיעור סך כל הביקורים המתוקנן לגיל היה 353 ל-1,000 נפש בשנת 2015, עליה מ-349 בשנה שעברה. משנת 2012 נרשמה מגמת ירידה, 363, ירידה ב-3%, ירידה ב-8% בגיל צבא 18-21, ב-6% בקרב ילדים בגיל 1-14 וב-7% בגיל 65-74, לעומת עליה של 10% בגיל 85 ומעלה. מרבית הפניות היו עקב מחלה, 230 ל-1,000 נפש, לעומת 75 עקב סיבות חיצוניות ו-46 למיון יולדות. שיעור הביקורים גבוה לתינוקות עד גיל שנה, לצעירים בגיל 18-34 ובגיל 65 ומעלה. שיעור הביקורים ללא יולדות גבוה לזכרים בהשוואה לנקבות במרבית הגילים, כאשר בגיל 5-14 יחס השיעורים היה 1.5, אך בגיל 22-34 השיעור גבוה יותר לנשים. שיעור הביקורים המתוקנן לגיל למבוטחי כללית גבוה פי 1.2 ממבוטחי לאומית ופי 1.5 ממבוטחי מכבי ומאוחדת. משנת 2012 נרשמה ירידה ב-5% בשיעור הביקורים למבוטחי לאומית, ב-3% למבוטחי מכבי ומאוחדת וב-2% למבוטחי כללית.

שיעור סך כל הביקורים, 2006-2015
שיעור מתוקנן לגיל ל-1,000 נפש



שיעור ביקורים ללא יולדות לפי גיל, 2006-2015
שיעור ל-1,000 נפש



מספר סך כל הביקורים לפי גיל, 2006-2015
מספרים מוחלטים (אלפים)

גיל	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
סה"כ	2,952.6	2,872.1	2,843.5	2,873.5	2,789.1	2,794.5	2,674.4	2,590.1	2,581.3	2,564.6
0	98.8	100.4	96.4	97.8	98.7	107.0	93.2	98.8	98.1	97.5
1-4	187.1	186.0	186.8	188.0	191.5	195.3	179.0	178.0	179.2	183.9
5-14	231.4	229.4	227.5	229.9	227.1	225.1	221.0	210.4	208.4	210.0
15-17	77.4	76.2	74.5	73.7	71.2	70.2	71.2	68.2	66.6	67.6
18-21	215.0	209.5	215.2	224.6	229.2	238.7	244.0	234.2	255.5	255.6
22-34	750.4	728.3	715.8	725.5	698.5	690.9	666.8	634.9	628.1	618.4
35-44	361.6	347.5	343.9	341.8	324.9	318.7	299.8	285.1	276.9	269.9
45-54	231.5	225.6	230.0	233.7	225.8	229.0	220.5	216.9	218.0	219.3
55-64	249.6	242.1	240.9	242.2	236.8	234.1	218.7	208.1	198.7	191.4
65-74	217.9	205.5	199.2	200.2	186.3	185.6	176.5	175.6	177.3	179.4
75-84	205.1	200.2	197.3	199.4	190.3	193.0	185.8	186.2	186.7	186.7
85+	125.1	119.7	113.7	113.7	106.1	104.6	95.5	91.2	85.4	82.3

שיעור סך כל הביקורים לפי גיל, 2006-2015
שיעור ל-1,000 נפש


גיל	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
שיעור מתוקן לגיל*										
סה"כ	353.4	349.2	352.3	362.7	358.8	366.2	356.9	355.2	360.2	364.2
שיעור גולמי										
סה"כ	352.3	349.6	352.8	363.3	359.1	366.6	357.3	354.4	359.5	363.6
0	558.1	578.8	564.7	581.6	598.1	659.0	590.9	643.3	656.8	670.8
1-4	272.4	275.1	281.9	290.6	304.2	319.5	300.3	302.0	307.9	320.6
5-14	153.8	156.0	158.0	162.9	163.6	165.6	165.8	158.0	159.7	164.1
15-17	193.3	194.8	195.5	198.4	194.3	194.4	198.3	191.4	189.9	194.8
18-21	431.4	427.2	443.7	467.0	484.7	508.6	523.5	506.3	555.0	558.0
22-34	490.0	480.4	477.0	488.2	475.2	470.6	457.0	442.4	442.7	441.1
35-44	336.4	329.5	332.9	339.0	332.0	334.9	324.2	325.4	325.2	325.7
45-54	276.5	274.9	284.8	292.5	284.5	291.6	283.1	287.2	289.1	291.0
55-64	332.5	326.8	330.1	334.8	329.5	333.1	323.0	326.3	329.5	336.8
65-74	427.6	426.7	434.4	460.0	452.0	471.4	459.2	467.6	471.4	478.7
75-84	704.2	700.3	707.4	736.0	716.4	745.5	726.4	735.8	742.2	748.5
85+	1,154.3	1,035.9	1,016.3	1,049.0	1,003.2	1,044.8	1,015.7	1,097.1	1,101.1	1,124.7

* אוכלוסיית 2009 נקבעה כאוכלוסיית התקן.


שיעור ביקורים לפי סיבת כניסה, 2006-2015 שיעור גולמי ל-1,000 נפש

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	סה"כ
363.6	359.5	354.4	357.3	366.6	359.1	363.3	352.8	349.6	352.3	סה"כ ללא יולדות
325.3	320.8	314.8	316.2	323.1	315.2	317.9	308.5	303.9	305.9	מחלה
234.5	232.1	228.5	233.8	238.0	230.9	233.6	228.1	226.6	229.6	סיבות חיצוניות
88.4	86.1	83.5	80.5	81.5	82.2	82.4	79.2	76.2	75.2	לידה
38.3	38.7	39.6	41.1	43.5	43.9	45.4	44.3	45.7	46.4	

שיעור סך כל הביקורים לפי גיל, 2015 שיעור גולמי ל-1,000 נפש




אחוז השינוי בשיעור סך כל הביקורים לפי גיל, 2015/2012



התפלגות הביקורים ללא יולדות לפי גיל ומגדר, 2015

אחוזים




ביקורים ללא יולדות לפי גיל ומגדר, 2015


מספרים מוחלטים (אלפים), אחוזים ושיעור ל-1,000 נפש

שיעור ל-1,000 נפש			מספר ביקורים			סה"כ
נקבות	זכרים	סה"כ	נקבות	זכרים	סה"כ	
294.8	317.1	305.9	49%	51%	2,563.4	סה"כ
504.1	608.0	557.8	44%	56%	98.8	0
243.7	299.4	272.3	44%	56%	187.0	1-4
124.1	182.1	153.8	39%	61%	231.3	5-14
174.6	207.1	191.3	45%	55%	76.6	15-17
346.9	412.5	380.4	45%	55%	189.6	18-21
330.6	279.8	305.2	54%	46%	467.4	22-34
261.7	265.5	263.7	50%	50%	283.4	35-44
253.4	296.9	274.7	47%	53%	229.9	45-54
298.9	369.2	332.5	47%	53%	249.5	55-64
392.3	468.3	427.5	49%	51%	217.9	65-74
669.2	750.9	704.2	54%	46%	205.1	75-84
1,090.7	1,264.1	1,154.2	59%	41%	125.1	85+


יחס שיעורים זכרים/נקבות, 2015
ביקורים ללא יולדות



שיעור סך כל הביקורים לפי מגדר, 2015, 2012
שיעור מתוקנן לגיל ל-1,000 נפש




שיעור ביקורים ללא יולדות לפי מגדר, 2015, 2012
שיעור מתוקנן לגיל ל-1,000 נפש



שיעור ביקורים ללא יולדות לפי גיל וקופה, 2015
שיעור ל-1,000 נפש

גיל	כללית	לאומית	מכבי	מאוחדת
שיעור מתוקן לגיל				
סה"כ	329.4	275.5	220.3	220.8
שיעור גולמי				
סה"כ	343.2	271.3	217.0	207.9
0	524.2	361.1	339.2	291.9
1-4	323.3	209.4	222.7	184.4
5-14	177.2	132.7	124.7	110.4
15-24	294.4	235.7	193.3	191.5
25-34	323.7	287.0	218.6	224.1
35-44	289.4	275.4	196.1	215.6
45-54	326.8	274.1	191.9	214.8
55-64	379.3	323.6	239.2	253.2
65-74	464.1	414.9	303.8	310.1
75-84	754.6	651.3	531.0	530.8
+85	1049.7	1008.5	870.8	880.0

שיעור ביקורים ללא יולדות לפי קופה, 2010-2015
שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש



אחוז השינוי בשיעור ביקורים ללא יולדות לפי קופה, 2015/2012



3. מספר ושיעור מבקרים

בשנת 2015 היו מעל 1.7 מיליון אנשים שפנו למחלקות לרפואה דחופה ב-28 בתי החולים לאשפוז כללל, ילא בתי החולים במזרח ירושלים, מהם 1.6 מיליון ביקורים ללא יולדות.

שני שלישי (67%) מהאנשים שטופלו במלר"ד פנו פעם אחת במהלך השנה, רבע (26%) פנו 2-3 פעמים ו-7% פנו 4 פעמים ומעלה (70%, 25% ו-5%, בהתאמה, מהפונים ללא יולדות).

אחוז הפונים ללא יולדות שהיו במלר"ד לפחות פעמיים במשך שנה היה יציב בעשור האחרון ונע סביב 30%, האחוז עולה מגיל 45 ומעלה, כאשר בגיל 85 ומעלה כמחצית הפונים ביקרו במלר"ד לפחות פעמיים בשנה.


מחצית (52%) הפונים למלר"ד היו נקבות, אחוז הנקבות גבוה מזכרים בקרב פונים שביקרו במלר"ד 2-3 פעמים בשנה (56%) ובקרב הפונים שביקרו 4 פעמים ומעלה (65%), ונמוך (49%) בקרב מבקרים שפנו פעם אחת במהלך השנה. בקרב הפונים למלר"ד ללא יולדות אחוז הנקבות נמוך יותר, 48% מסך כל הפונים ללא יולדות, 48% מהפונים פעם אחת בשנה, 49% מהפונים 2-3 פעמים ו-50% מהפונים 4 פעמים בשנה ומעלה.

ממוצע הביקורים ללא יולדות למבקר בשנת 2015 היה 1.5, ממוצע הביקורים גבוה לזכרים בהשוואה לנקבות במרבית קבוצות הגיל, פרט לגיל הפריון 15-44.


בשנת 2015, שיעור המבקרים ללא יולדות היה גבוה לתינוקות עד גיל שנה, 249 ל-1,000 נפש לפונים פעם אחת במהלך השנה, 79 לפונים 2-3 פעמים ו-11 לפונים 4 פעמים ומעלה, בגיל הצבא 18-21, 159, 62 ו-13, בהתאמה, ועולה מגיל 55 ומעלה, כאשר בגיל 85 ומעלה השיעור היה 301, 209 ו-71 ל-1,000 נפש, בהתאמה.

שיעור הזכרים שפנו למלר"ד גבוה בהשוואה לנקבות ללא יולדות במרבית קבוצות הגיל. השיעור גבוה במיוחד בקרב ילדים בגיל 5-14, פי 1.4 למבקרים שפנו פעם אחת למלר"ד במהלך השנה ופי 1.6 לאלו שפנו 2-3 פעמים. בקרב מבקרים שפנו למלר"ד 4 פעמים ומעלה במהלך השנה, שיעור הזכרים גבוה בהשוואה לנקבות במיוחד לתינוקות עד גיל שנה ובגיל 45 ומעלה, פי 1.4.

התפלגות מספר ביקורים למבקר, 2015




אחוז מבקרים שהיו לפחות פעמיים במלר"ד, 2015 ביקורים ללא ילדות




התפלגות המבקרים במלר"ד לפי מספר ביקורים בשנה, 2015 מספרים מוחלטים (אלפים), אחוזים

ביקורים ללא ילדות			כל הביקורים			
נקבות	זכרים	סה"כ	נקבות	זכרים	סה"כ	
779.6	834.4	1,614.2	906.7	834.3	1,741.2	סה"כ
48%	52%		52%	48%		אחוזים
542.8	590.0	1,133.0	574.1	590.0	1,164.2	ביקור אחד
48%	52%		49%	51%		אחוזים
194.1	201.9	396.0	252.3	201.9	454.3	2-3 ביקורים
49%	51%		56%	44%		אחוזים
42.7	42.5	85.2	80.3	42.5	122.8	4 ביקורים ומעלה
50%	50%		65%	35%		אחוזים

אחוז מבקרים שהיו לפחות פעמיים במלר"ד לפי גיל, 2015




ממוצע ביקורים למבקר, 2015
ביקורים ללא ילדות



שיעור מבקרים לפי גיל ומספר ביקורים בשנה, 2015
שיעור ל-1,000 נפש

ביקורים ללא ילדות				סך כל הביקורים				גיל
4 ומעלה ביקורים	2-3 ביקורים	ביקור אחד	סה"כ	4 ומעלה ביקורים	2-3 ביקורים	ביקור אחד	סה"כ	
11.2	79.4	248.6	339.2	11.2	79.5	248.7	339.4	0
6.9	44.7	141.4	193.0	6.9	44.7	141.4	193.0	1-4
1.9	20.1	95.5	117.5	1.9	20.1	95.5	117.5	5-14
3.3	27.0	104.4	134.7	3.5	27.2	104.5	135.2	15-17
12.9	62.4	159.0	234.3	17.5	68.8	162.2	248.6	18-21
9.1	46.9	138.1	194.0	27.2	74.2	151.8	253.2	22-34
7.3	40.0	124.0	171.3	14.1	52.0	131.6	197.7	35-44
8.6	41.1	125.1	174.8	8.8	41.4	125.2	175.5	45-54
12.7	50.9	139.4	203.0	12.7	50.9	139.4	203.0	55-64
19.9	67.9	156.7	244.5	19.9	67.9	156.7	244.5	65-74
39.9	118.1	207.9	365.9	39.9	118.1	207.9	365.9	75-84
70.6	209.1	300.9	580.6	70.6	209.1	300.9	580.6	85+


שיעור מבקרים ללא ילדות לפי גיל ומספר ביקורים בשנה, 2015
שיעור ל-1,000 נפש



שיעור מבקרים ללא יולדות לפי גמ, ליגדר ומספר ביקורים בשנה, 2015
שיעור ל-1,000 נפש

ביקור אחד			2-3 ביקורים			4 ביקורים ומעלה			גיל
זכרים	נקבות	זכרים\נקבות	זכרים	נקבות	זכרים\נקבות	זכרים	נקבות	זכרים\נקבות	
262.7	233.3	1.1	87.7	70.6	1.2	13.0	9.3	1.4	0
152.9	129.2	1.2	49.8	39.2	1.3	7.7	6.1	1.2	1-4
112.4	77.7	1.4	24.6	15.4	1.6	2.2	1.6	1.3	5-14
117.4	90.7	1.3	29.8	24.1	1.2	2.8	3.8	0.7	15-17
174.6	142.8	1.2	69.7	54.8	1.3	13.4	12.4	1.1	18-21
136.2	140.0	1.0	42.1	51.7	0.8	6.8	11.4	0.6	22-34
128.5	119.5	1.1	39.8	40.2	1.0	6.6	8.0	0.8	35-44
132.1	118.3	1.1	44.4	38.0	1.2	9.8	7.5	1.3	45-54
147.0	132.5	1.1	56.3	45.9	1.2	15.0	10.5	1.4	55-64
163.1	151.2	1.1	73.4	63.2	1.2	23.4	16.8	1.4	65-74
207.7	208.1	1.0	121.8	115.2	1.1	46.1	35.3	1.3	75-84
298.2	302.9	1.0	219.9	203.0	1.1	86.3	61.4	1.4	85+

יחס שיעורים זכרים/נקבות לפי מספר ביקורים בשנה, 2015
ביקורים ללא יולדות



4. ביקורים חוזרים


אחוז הביקורים החוזרים במגמת ירידה בשנים האחרונות. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים ירד ל-17.9% בשנת 2015 בסך הביקורים ללא יולדות בהשוואה ל-18.4% בשנת 2010, 20.0% ו-20.7%, בהתאמה, עקב מחלה ו-11.5% ו-11.6%, בהתאמה, עקב סיבות חיצוניות. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות ירד ל-5.7% בכלל הביקורים ללא יולדות מ-6.1% בשנת 2010, 6.6% ו-7.2%, בהתאמה, עקב מחלה ו-3.5% ו-3.7%, בהתאמה, עקב סיבות חיצוניות. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 24 שעות היה 3.7% בביקורים ללא יולדות מ-4.0% בשנת 2010, 4.2% ו-4.7%, בהתאמה, עקב מחלה ו-2.5% ו-2.6%, בהתאמה, עקב סיבות חיצוניות.

אחוז הביקורים החוזרים גבוה בקרב תינוקות עד גיל שנה ובמגמת עלייה מגיל 35, והאחוז הנמוך ביותר נרשם לילדים בגיל 5-14. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים גבוה יותר גבוה יותר בנים בהשוואה לבנות עד גיל 5, וכן לגברים בהשוואה לנשים בגיל 45 ומעלה, ואילו בגיל פריון, 15-44, אחוז הביקורים גבוה יותר לנשים.


אחוז הביקורים החוזרים בבתי החולים השונים נע בין 2% ל-12% בתוך 24 שעות, בין 3% ל-14% בתוך 48 שעות, ובין 15% ל-26% בתוך 30 ימים. אחוז הביקורים החוזרים גבוה בבתי החולים הבאים: המשפחה הקדושה, שניידר, לניאדו, הסקוטי, מעייני הישועה, סנט וינסנט, יוספטל, שיבא, בילינסון והדסה הר הצופים.

אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים גבוה בקרב מבוטחי כללית (19%) ולאומית (18%) בהשוואה למבוטחי מכבי ומאוחדת (16%), ההבדל ניכר במרבית קבוצות הגיל.


אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים לפי גיל ומגדר, 2015
ביקורים ללא יולדות




בתוך 30 ימים



בתוך 48 שעות



בתוך 24 שעות



אחוז ביקורים חוזרים ללא יולדות, 2015


חזרה בתוך 30 ימים			חזרה בתוך 48 שעות			חזרה בתוך 24 שעות			
סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	גיל
סה"כ									
11.5%	20.0%	17.9%	3.5%	6.6%	5.7%	2.5%	4.2%	3.7%	סה"כ
10.2%	17.8%	17.2%	3.6%	8.3%	7.8%	3.0%	5.4%	5.1%	0
8.8%	14.5%	12.7%	3.8%	6.7%	5.7%	3.0%	4.7%	4.1%	1-4
8.0%	13.1%	10.8%	3.4%	6.4%	4.9%	2.7%	4.9%	3.8%	5-14
12.4%	18.2%	16.2%	3.5%	5.8%	4.9%	2.4%	3.8%	3.3%	15-24
10.7%	20.6%	18.0%	3.3%	7.3%	6.2%	2.2%	4.5%	3.9%	25-34
10.8%	19.8%	17.6%	3.3%	7.1%	6.1%	2.2%	4.5%	3.8%	35-44
11.5%	19.6%	17.9%	3.3%	6.5%	5.6%	2.2%	4.1%	3.6%	45-54
13.0%	21.2%	19.7%	3.7%	6.5%	5.9%	2.4%	4.1%	3.8%	55-64
15.5%	22.9%	21.9%	4.2%	6.1%	5.8%	2.5%	3.8%	3.6%	65-74
18.3%	24.2%	23.5%	4.8%	5.9%	5.7%	3.1%	3.5%	3.5%	75-84
20.5%	24.8%	24.2%	4.3%	5.5%	5.3%	2.7%	3.3%	3.2%	85+
זכרים									
11.6%	20.1%	17.6%	3.6%	6.7%	5.6%	2.6%	4.4%	3.8%	סה"כ
10.4%	18.4%	17.7%	3.6%	8.3%	7.9%	3.2%	5.4%	5.2%	0
9.0%	14.8%	13.0%	3.7%	6.5%	5.5%	3.0%	4.5%	3.9%	1-4
8.3%	13.0%	10.6%	3.4%	6.3%	4.7%	2.8%	4.7%	3.6%	5-14
12.8%	17.1%	15.1%	3.6%	5.3%	4.5%	2.5%	3.6%	3.1%	15-24
11.1%	17.7%	15.2%	3.5%	6.6%	5.3%	2.4%	4.5%	3.6%	25-34
11.2%	18.8%	16.4%	3.5%	6.7%	5.6%	2.3%	4.4%	3.7%	35-44
12.2%	20.7%	18.7%	3.5%	7.0%	5.9%	2.4%	4.5%	3.8%	45-54
13.4%	23.2%	21.5%	3.9%	7.8%	6.9%	2.7%	5.1%	4.5%	55-64
15.9%	24.2%	23.2%	4.3%	6.9%	6.5%	2.8%	4.3%	4.1%	65-74
19.2%	26.0%	25.3%	4.7%	6.7%	6.4%	3.2%	4.1%	3.9%	75-84
22.2%	26.7%	26.2%	4.6%	6.5%	6.2%	3.3%	3.9%	3.8%	85+
נקבות									
11.3%	19.9%	18.2%	3.4%	6.5%	5.8%	2.3%	4.1%	3.7%	סה"כ
9.9%	17.1%	16.4%	3.5%	8.1%	7.6%	2.8%	5.3%	5.0%	0
8.5%	14.1%	12.5%	3.9%	7.0%	6.0%	3.1%	4.9%	4.3%	1-4
7.4%	13.3%	11.0%	3.3%	6.6%	5.2%	2.6%	5.0%	3.9%	5-14
11.6%	19.1%	17.5%	3.2%	6.2%	5.5%	2.1%	4.0%	3.6%	15-24
9.9%	22.4%	20.4%	2.9%	7.8%	7.0%	1.9%	4.6%	4.1%	25-34
9.9%	20.7%	18.8%	3.0%	7.5%	6.6%	2.0%	4.5%	4.0%	35-44
10.5%	18.4%	16.9%	3.1%	6.0%	5.3%	2.0%	3.7%	3.3%	45-54
12.5%	18.9%	17.8%	3.4%	5.3%	4.9%	2.1%	3.2%	2.9%	55-64
15.3%	21.4%	20.5%	4.1%	5.4%	5.2%	2.4%	3.3%	3.1%	65-74
17.7%	22.7%	21.9%	4.9%	5.3%	5.2%	3.0%	3.1%	3.1%	75-84
19.7%	23.4%	22.8%	4.2%	4.7%	4.6%	2.4%	2.8%	2.7%	85+

אחוז ביקורים חוזרים לפי בית חולים, 2015
ביקורים ללא יולדות


חזרה בתוך 30 ימים			חזרה בתוך 48 שעות			חזרה בתוך 24 שעות			בית חולים
סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	
11.5%	20.0%	17.9%	3.5%	6.6%	5.7%	2.5%	4.2%	3.7%	סה"כ
10.9%	22.2%	20.1%	3.1%	7.5%	6.5%	2.0%	5.0%	4.3%	שיבא
12.3%	20.7%	18.7%	3.8%	5.6%	5.0%	2.5%	3.4%	3.1%	רמב"ם
9.8%	18.5%	16.2%	2.4%	5.3%	4.4%	1.5%	3.1%	2.6%	אסף הרופא
12.2%	20.2%	18.0%	3.5%	6.4%	5.4%	2.2%	4.0%	3.4%	וולפסון
12.2%	19.2%	17.0%	3.5%	5.3%	4.6%	2.4%	3.2%	2.9%	רבקה זיו
10.7%	19.8%	16.9%	3.3%	6.1%	5.0%	2.3%	3.8%	3.2%	הלל יפה
10.2%	19.2%	16.4%	2.6%	6.3%	4.8%	1.6%	3.6%	2.8%	נהריה
11.3%	21.5%	18.4%	2.9%	7.9%	5.9%	2.0%	4.9%	3.8%	ברזילי
10.8%	19.3%	16.4%	3.1%	5.7%	4.6%	2.2%	3.6%	3.0%	פוריה
12.3%	19.6%	17.8%	3.0%	6.0%	5.1%	1.7%	3.7%	3.1%	סוראסקי
10.1%	18.8%	17.1%	3.2%	6.0%	5.2%	2.3%	3.7%	3.3%	בני ציון
13.3%	22.0%	20.5%	3.7%	7.2%	6.4%	2.7%	4.9%	4.4%	רבין ק. בילינסון
10.6%	18.6%	16.5%	2.7%	5.7%	4.8%	1.7%	3.7%	3.1%	סורוקה
10.6%	17.8%	16.0%	2.9%	5.5%	4.7%	1.7%	3.4%	2.9%	מאיר
10.7%	18.4%	16.6%	2.8%	5.9%	5.0%	1.7%	3.7%	3.1%	קפלן
11.7%	19.9%	17.9%	3.7%	6.1%	5.4%	2.6%	3.8%	3.4%	המרכזי בעמק
10.7%	17.4%	16.6%	2.8%	4.1%	3.9%	2.0%	2.4%	2.3%	הכרמל
12.9%	19.6%	18.1%	3.4%	5.7%	5.1%	2.5%	3.6%	3.3%	השרון ק. גולדה
15.0%	22.8%	20.8%	5.7%	8.3%	7.6%	3.9%	5.9%	5.3%	יוספטל
16.1%	18.9%	18.2%	11.9%	10.1%	10.6%	11.0%	7.6%	8.6%	שניידר
10.0%	17.4%	15.6%	2.3%	4.0%	3.5%	1.3%	2.3%	2.0%	הדסה עין כרם
12.4%	17.9%	16.3%	5.2%	6.4%	6.0%	4.3%	4.4%	4.4%	הדסה הר הצופים
13.1%	24.9%	20.8%	5.6%	10.3%	8.5%	4.6%	7.8%	6.5%	הסקוטי
14.6%	19.2%	18.9%	4.3%	8.2%	7.9%	3.2%	6.4%	6.1%	סנט וינסנט
15.1%	28.3%	25.4%	7.0%	15.9%	13.7%	6.0%	13.3%	11.5%	המשפחה הקדושה
9.8%	16.2%	14.9%	2.5%	4.2%	3.8%	1.7%	2.2%	2.1%	שערי צדק
12.9%	29.3%	25.7%	4.8%	12.6%	10.5%	3.6%	7.3%	6.2%	לניאדו
13.1%	22.3%	20.6%	6.5%	8.5%	8.1%	5.5%	5.9%	5.9%	מעייני הישועה

אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות ו-48 שעות לפי בית חולים, 2015
ביקורים ללא יולדות

■ בתוך 24 שעות ■ בתוך 48 שעות



אחוז ביקורים חוזרים ללא יולדות בתוך 30 ימים לפי קופה, 2015



אחוז ביקורים חוזרים ללא יולדות לפי קופה, 2015


מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	סה"כ	
חזרה בתוך 48 שעות					
5.7%	5.8%	5.8%	5.8%	5.7%	סה"כ
7.5%	6.9%	7.1%	7.1%	7.8%	0
5.7%	5.6%	5.2%	5.8%	5.7%	1-4
5.1%	4.9%	4.5%	4.9%	4.9%	5-14
5.6%	5.4%	5.3%	5.5%	4.9%	15-24
6.4%	6.3%	6.5%	6.2%	6.2%	25-34
6.0%	6.2%	6.6%	6.1%	6.1%	35-44
5.2%	5.4%	5.4%	5.9%	5.6%	45-54
5.3%	6.2%	5.2%	5.9%	5.9%	55-64
5.4%	5.6%	5.8%	5.9%	5.8%	65-74
5.4%	5.7%	6.6%	5.6%	5.7%	75-84
5.2%	5.4%	6.6%	5.1%	5.3%	85+
חזרה בתוך 30 ימים					
16.3%	16.4%	17.9%	18.6%	17.9%	סה"כ
15.3%	15.0%	16.2%	17.4%	17.2%	0
12.1%	11.6%	11.4%	13.3%	12.7%	1-4
10.5%	10.3%	11.0%	11.0%	10.8%	5-14
15.4%	14.8%	15.6%	15.8%	16.2%	15-24
18.0%	17.3%	18.8%	18.3%	18.0%	25-34
17.1%	16.6%	18.7%	18.1%	17.6%	35-44
16.7%	16.0%	17.1%	19.0%	17.9%	45-54
17.8%	18.0%	19.9%	20.5%	19.7%	55-64
19.5%	20.0%	22.6%	22.7%	21.9%	65-74
21.3%	21.9%	22.7%	24.1%	23.5%	75-84
22.9%	23.3%	24.5%	24.4%	24.2%	85+

*סה"כ כולל צה"ל ואחר.

5. ביקורים לפי בית חולים

בשנת 2015 נרשמו כ-3 מיליון ביקורים במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים לאשפוז כללי. מספר הביקורים גבוה בבתי החולים סורוקה, סוראסקי, שיבא, מאיר ואסף הרופא, למעלה מ-160 אלף ביקורים בכל אחד. כמחצית (48%) מכלל הביקורים ללא יולדות היו בבתי החולים הממשלתיים, כשליש (35%) בבתי החולים בבעלות שירותי בריאות כללית ו-18% בשאר בתי החולים. כחמישית (18%) מכלל הביקורים בשנת 2015 היו של תינוקות וילדים עד גיל 15, 15% של צעירים בגיל 15-24, 32% של גילאי 25-44, 16% של גילאי 45-64 ו-19% של גילאי 65 ומעלה. ביקורים של גילאי 65 ומעלה מהווים כחמישית (22%) מהביקורים ללא יולדות בבתי החולים הממשלתיים, הציבוריים ובתי חולים בבעלות שירותי בריאות כללית, 20% בהדסה ו-10% בבתי חולים של המיסיון בנצרת. אחוז גילאי 65 ומעלה במיוחד בבתי החולים השרון ק. גולדה (39%), הכרמל (33%), בילינסון (29%), שיבא וולפסון (27%), סוראסקי, יאיר ובני ציון (25%). אחוז הביקורים של ילדים בגיל 0-17 מכלל הביקורים ללא יולדות נמוך בבתי החולים הממשלתיים (20%), וגבוה בבתי החולים הציבוריים והדסה (25%), בבעלות שירותי בריאות כללית (26%) והמיסיון (28%). אחוז הביקורים של גילאי 0-17 גבוה במיוחד בבתי החולים סנט וינסנט (50%), מעייני הישועה (34%), הדסה הר הצופים (30%), סורוקה (27%) ושעריצדק (26%).

ביקורים ללא יולדות לפי בעלות המוסד, 2015



ביקורים+לפי בית חולים וסיבת כניסה, 2015
אלפים, אחוזים מסה"כ ללא-יולדות

++ חהוויים+	הס"כ כבי קוויים+	הס"כ ככללא ככדו++	+ חלה+	% סיב חיצונות
סה"	2,952.6	2,563.4	75%	25%
שיבא	184.2	159.7	81%	18%
רמב"ם	135.0	122.0	76%	24%
אסף הרופא	165.9	143.4	73%	27%
וולפסון	132.4	118.1	73%	27%
רבקה זיו	76.7	68.2	68%	32%
הלל יפה	117.4	105.9	69%	31%
נהריה	120.7	110.1	68%	31%
ברזילי	113.2	102.1	69%	31%
פוריה	73.1	65.3	66%	34%
סוראסקי	215.9	181.7	75%	24%
בני ציון	57.7	48.9	80%	20%
רבין ק. בילינסון	129.5	105.9	82%	18%
סורוקה	226.6	187.2	74%	26%
מאיר	166.1	143.8	75%	25%
קפלן	144.0	120.9	77%	23%
המרכזי בעמק	134.2	119.2	76%	24%
הכרמל	83.8	73.4	88%	12%
השרון ק. גולדה	39.6	39.6	76%	24%
יוספטל	45.0	41.2	66%	19%
שניידר	55.5	55.5	74%	26%
הדסה עין כרם	78.0	68.3	76%	24%
הדסה הר הצופים	57.9	51.6	71%	29%
הסקוטי	57.4	51.9	65%	35%
סנט וינסנט	32.6	27.3	94%	6%
המשפחה הקדושה	33.4	33.4	78%	22%
שערי צדק	133.4	108.2	81%	19%
לניאדו	84.1	76.6	78%	22%
מעייני"הישועה	59.6	34.2	80%	19%

¹ בבית החולים יוספטל 14% מהביקורים היו ללא רישום של סיבת כניסה.
בבית החולים סנט וינסנט אין רישום מלא של הסיבות החיצוניות.

ביקורים לפי בית חולים וגיל, 2015
אלפים, אחוזים מסה כ ביקורים

85+	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	15-24	5-14	1-4	0	סה"כ	ב חו"מ
4%	7%	7%	8%	8%	12%	20%	15%	8%	6%	3%	2,952.6	סה"כ
4%	7%	8%	9%	8%	13%	20%	15%	7%	6%	3%	1,392.0	מ
5%	8%	10%	10%	8%	14%	19%	12%	6%	5%	2%	184.2	שיבא
4%	7%	9%	10%	9%	11%	18%	16%	7%	6%	3%	135.0	רמב"ם
4%	7%	7%	8%	7%	12%	21%	17%	7%	6%	3%	165.9	אסף הרופא
6%	9%	9%	9%	8%	12%	19%	13%	6%	6%	3%	132.4	וולפסון
2%	5%	6%	8%	9%	12%	19%	21%	9%	6%	3%	76.7	רבקה זיו
3%	6%	7%	9%	9%	13%	19%	17%	9%	6%	3%	117.4	הלל יפה
3%	6%	7%	9%	10%	12%	19%	18%	8%	5%	3%	120.7	נהריה
4%	8%	7%	9%	8%	11%	19%	17%	7%	6%	3%	113.2	ברזילי
3%	5%	6%	8%	9%	13%	19%	18%	9%	7%	3%	73.1	פוריה
5%	8%	8%	8%	7%	16%	24%	11%	5%	5%	3%	215.9	סוראסקי
5%	8%	7%	9%	9%	13%	22%	12%	6%	5%	3%	57.7	בני ציון
4%	7%	8%	9%	8%	12%	19%	15%	9%	7%	4%	1,024.2	שיי וו ייריא וו לית
5%	9%	10%	10%	8%	15%	26%	13%	2%	1%	0%	129.5	רבין ק. בילינסון
3%	6%	6%	7%	7%	11%	20%	20%	9%	7%	4%	226.6	סורוקה
5%	7%	9%	10%	8%	13%	18%	13%	8%	6%	3%	166.1	מאיר
5%	7%	7%	9%	7%	12%	20%	13%	7%	7%	4%	144.0	קפלן
3%	6%	7%	9%	10%	12%	18%	16%	10%	6%	3%	134.2	המרכזי בעמק
7%	11%	11%	10%	8%	12%	18%	8%	6%	6%	3%	83.8	הכרמל
10%	15%	14%	15%	12%	13%	12%	8%	0%	0%	0%	39.6	השרון ק. גולדה
1%	4%	6%	8%	9%	13%	20%	21%	9%	7%	3%	45.0	יוספטל
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	37%	35%	19%	55.5	שניידר
4%	7%	7%	8%	8%	11%	18%	18%	9%	7%	4%	135.9	הדסה
4%	8%	9%	10%	8%	11%	19%	15%	8%	6%	3%	78.0	הדסה עין כרם
2%	5%	5%	6%	7%	11%	18%	22%	10%	8%	5%	57.9	הדסה הר הצופים
1%	4%	4%	7%	9%	12%	20%	21%	11%	7%	4%	123.4	סין
2%	4%	5%	8%	10%	13%	19%	22%	11%	5%	1%	57.4	הסקוטי
0%	1%	1%	3%	6%	10%	22%	19%	12%	16%	11%	32.6	סנט וינסנט
2%	5%	6%	8%	11%	14%	19%	22%	9%	3%	1%	33.4	המשפחה הקדושה
5%	7%	6%	6%	5%	12%	24%	18%	7%	7%	4%	277.0	צבבימממ"ר
5%	7%	7%	7%	6%	10%	21%	18%	7%	7%	5%	133.4	שערי צדק
6%	8%	7%	7%	6%	13%	25%	14%	6%	6%	3%	84.1	לניאדו
4%	3%	3%	3%	3%	12%	31%	23%	7%	7%	5%	59.6	מעייני הישועה


*סה"כ כולל גיל לא ידוע.

ביקורים ללא יולדות לפי בית חולים וגיל, 2015
אלפים, אחוזים מסה"כ ללא יולדות


סה"כ	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
סה"כ	2,563.4	4%	7%	9%	15%	14%	11%	9%	10%	8%	5%
ממששי	1,225.4	3%	6%	8%	15%	14%	12%	9%	10%	8%	5%
שיבא	159.7	2%	5%	7%	12%	12%	12%	9%	12%	10%	6%
רמב"ם	122.0	3%	6%	8%	16%	13%	10%	10%	11%	10%	4%
אסף הרופא	143.4	4%	7%	8%	17%	14%	11%	8%	10%	9%	5%
וולפסון	118.1	4%	7%	7%	12%	14%	11%	9%	10%	10%	7%
רבקה זיו	68.2	3%	6%	10%	21%	14%	12%	10%	9%	7%	3%
הלל יפה	105.9	3%	7%	10%	16%	14%	12%	10%	10%	8%	4%
נהריה	110.1	3%	6%	9%	17%	15%	12%	10%	9%	7%	4%
ברזילי	102.1	3%	7%	8%	16%	15%	10%	9%	10%	9%	5%
פוריה	65.3	3%	7%	10%	17%	15%	12%	10%	9%	7%	3%
סוראסקי	181.7	3%	6%	6%	12%	17%	13%	8%	10%	9%	6%
בני ציון	48.9	4%	6%	7%	12%	14%	12%	11%	11%	9%	6%
ש"י וו ייריא וווככלית	886.7	4%	8%	10%	14%	12%	11%	9%	10%	8%	5%
רבין ק. בילינסון	105.9	0%	1%	3%	13%	18%	14%	10%	12%	11%	6%
סורוקה	187.2	5%	8%	11%	18%	13%	10%	9%	9%	7%	3%
מאיר	143.8	3%	7%	9%	12%	11%	11%	10%	11%	10%	6%
קפלן	120.9	5%	9%	9%	13%	12%	11%	9%	10%	9%	6%
המרכזי בעמק	119.2	3%	7%	11%	15%	12%	12%	11%	10%	8%	3%
הכרמל	73.4	3%	6%	7%	8%	11%	10%	9%	12%	13%	8%
השרון ק. גולדה	39.6	0%	0%	0%	8%	12%	13%	12%	15%	15%	10%
יוספטל	41.2	3%	8%	10%	21%	16%	12%	9%	9%	4%	1%
שניידר	55.5	19%	35%	37%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
הדסה	119.9	4%	8%	10%	18%	13%	10%	9%	9%	7%	4%
הדסה עין כרם	68.3	3%	7%	9%	15%	13%	10%	9%	11%	10%	5%
הדסה הר הצופים	51.6	5%	9%	12%	21%	14%	10%	8%	7%	6%	3%
מיסיון	112.5	4%	8%	12%	19%	17%	12%	10%	7%	5%	2%
הסקוטי	51.9	1%	5%	12%	20%	16%	13%	11%	9%	6%	2%
סנט וינסנט	27.3	13%	19%	15%	15%	15%	10%	7%	4%	2%	0%
המשפחה הקדושה	33.4	1%	3%	9%	22%	19%	14%	11%	8%	6%	2%
צבבימממ"ר	219.0	5%	8%	8%	15%	17%	10%	7%	8%	7%	7%
שערי צדק	108.2	6%	9%	9%	15%	13%	9%	7%	8%	9%	6%
לניאדו	76.6	3%	6%	6%	14%	21%	12%	7%	8%	9%	7%
מעייני הישועה	34.2	8%	12%	12%	16%	16%	9%	5%	5%	6%	7%

*סה"כ כולל גיל לא ידוע.

אחוז ביקורים של ילדים ומבוגרים מכלל הביקורים ללא יולדות לפי בית החולים, 2015



אחוז ביקורים של ילדים ומבוגרים מכלל הביקורים לפי בעלות בית החולים, 2015




6. משך שהיה

בשנת 2015 ממוצע השהיה במחלקות לרפואה דחופה ללא יולדות היה 3.79 וחציון השהיה 2.90 שעות, עלייה מ-3.39 ו-2.48 בשנת 2012, בהתאמה. מגמת עלייה נמדדה במרבית בתי החולים, מלבד הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים והכרמל, בהם חציון השהיה ירד בהשוואה לשנת 2012. חציון שהיה גבוה נרשם בבני ציון (4.05), שערי צדק (3.85), הדסה עין כרם (3.83), רמב"ם (3.82), בילינסון (3.60), הכרמל (3.58), שניידר (3.48), וולפסון (3.43), אסף הרופא (3.23), שיבא (3.20), סורוקה (3.12), קפלן (3.08) וסוראסקי (2.95). חמישית (22%) מהמטופלים שהו מעל 5 שעות במחלקה לרפואה דחופה ו-6% שהו מעל 9 שעות, אחוז גבוה יותר נרשם בבני ציון, רמב"ם, הדסה עין כרם, שערי צדק, הכרמל, בילינסון, שניידר, וולפסון, אסף הרופא, קפלן, הדסה הר הצופים ושיבא. כעשירית (11%) מהמטופלים שהו עד שעה במלר"ד.


חציון השהיה למטופלים שאושפזו גבוה (3.73) בהשוואה לאלו ששוחררו לביתם (2.67). החציון גבוה במיוחד לאלו שהועברו לאשפוז במחלקות השהיה (6.95), ניירולוגיה (4.90), אונקולוגיה (4.47), כירורגיה כללית (4.39), גריאטריה חריפה (4.27), אורולוגיה (4.12), ניירוכירורגיה (3.97) ופנימית (3.95). חציון השהיה במשמרת הבוקר ארוך (3.07) בהשוואה למשמרת הערב (2.78) והלילה (2.77). השהיה הארוכה ביותר נרשמה למבקרים שהגיעו בשעות 06:00-06:59 בבוקר.

חציון השהיה עקב מחלה גבוה בהשוואה לסיבות חיצוניות, במיוחד לאלו ששוחררו לביתם. חציון השהיה עולה עם הגיל, 2.38 לילדים בגיל 0-17, לעומת 3.80 לגילאי 65 ומעלה, עקב מחלה ו-3.85, בהתאמה, ועקב סיבות חיצוניות 1.85 ו-3.53, בהתאמה. למטופלים בגיל 65 ומעלה שאושפזו נרשם חציון שהיה גבוה יותר, 5.03 עקב סיבות חיצוניות ו-4.03 עקב מחלה.


ממוצע שהיה לפי סוג שחרור
סה"כ ללא יולדות




חציון שהיה לפי סוג שחרור
סה"כ ללא יולדות




ממוצע שהיה לפי סיבת כניסה, 2006-2015



חציון שהיה לפי סיבת כניסה, 2006-2015




חציון שהיה של ילדים ומבוגרים לפי סיבת כניסה וסוג שחרור, 2015



ממוצע וחציון שהיה לפי שעת כניסה, 2015

סה"כ ללא יולדות, שעות



ממוצע וחציון שהיה לפי משמרת, 2015

סה"כ ללא יולדות, שעות


משמרות:

בוקר: 07:00 עד 14:59

עבר: 15:00 עד 22:59

לילה: 23:00 עד 06:59


■ ממוצע שהיה ■ חציון שהיה




חציון שהיה לפי בית חולים וסוג שחרור
סה"כ ללא יולדות, שעות

2010			2014			2015			סה"כ
שחרור הביתה	הועברו לאשפוז	סה"כ	שחרור הביתה	הועברו לאשפוז	סה"כ	שחרור הביתה	הועברו לאשפוז	סה"כ	
2.15	2.47	2.23	2.57	3.40	2.77	2.67	3.73	2.90	סה"כ
2.60	2.93	2.70	2.97	3.42	3.10	3.08	3.48	3.20	שיבא
2.80	4.48	3.23	3.00	6.73	3.73	3.10	6.82	3.82	רמב"ם
2.47	2.60	2.50	2.85	3.45	2.98	2.93	4.47	3.23	אסף הרופא
2.17	2.28	2.20	3.03	4.48	3.35	3.03	4.96	3.43	וולפסון
1.57	1.92	1.67	2.15	2.37	2.20	2.47	2.83	2.57	רבקה זיו
1.82	1.75	1.80	2.30	3.17	2.53	2.43	3.83	2.80	הלל יפה
1.88	1.80	1.85	2.48	2.87	2.62	2.48	3.65	2.85	נהריה
2.02	1.65	1.92	2.52	2.10	2.40	2.72	2.53	2.67	ברזילי
1.53	2.00	1.65	2.22	3.28	2.50	2.40	3.55	2.67	פוריה
2.18	2.28	2.22	2.70	4.00	2.97	2.68	4.08	2.95	סוראסקי
2.28	2.08	2.20	2.90	3.63	3.15	3.23	5.85	4.05	בני ציון
2.40	2.65	2.48	3.03	3.85	3.25	3.40	4.10	3.60	רבין ק. בילינסון
2.57	2.42	2.53	3.17	3.28	3.18	3.07	3.23	3.12	סורוקה
2.17	2.12	2.15	2.43	2.70	2.52	2.55	2.87	2.63	מאיר
2.15	2.43	2.23	2.70	3.67	2.92	2.85	3.90	3.08	קפלן
1.93	3.33	2.05	2.15	3.33	2.33	2.37	3.73	2.57	המרכזי בעמק
3.28	4.17	3.48	3.37	4.53	3.63	3.32	4.63	3.58	הכרמל
2.35	2.42	2.37	2.88	2.97	2.90	2.67	2.88	2.73	השרון ק. גולדה
1.52	1.70	1.53	1.95	2.55	2.00	1.92	2.38	1.97	יוספטל
2.82	4.55	3.03	2.77	5.73	3.05	3.22	6.17	3.48	שניידר
3.22	5.05	3.75	3.45	4.22	3.70	3.52	4.50	3.83	הדסה עין כרם
2.60	4.18	2.85	2.67	4.17	2.88	2.63	3.90	2.83	הדסה הר הצופים
1.10	1.33	1.10	1.25	1.38	1.27	1.45	1.90	1.52	הסקוטי
0.87	0.98	0.90	0.85	0.98	0.87	0.85	0.95	0.87	סנט וינסנט
1.13	1.40	1.18	1.27	1.52	1.32	1.35	1.57	1.38	המשפחה הקדושה
2.93	8.05	3.50	3.05	7.02	3.58	3.27	7.57	3.85	שערי צדק
1.35	1.92	1.53	1.67	2.37	1.87	1.68	2.52	1.90	לניאדו
1.67	1.32	1.58	1.90	1.73	1.87	2.07	1.92	2.03	מעייני הישועה

חציון שהיה לפי בית חולים
סה"כ ללא יולדות, שעות




חציון שהיה לפי מחלקה מאשפזת
שעות




התפלגות משך השהיה לפי בית חולים, 2015
סה"כ ללא יולדות

סה"כ	אחוזים	עד 30 דקות	30 דקות עד שעה	שעה עד שעתיים	שעתיים עד 3 שעות	3 שעות עד 4 שעות	4 שעות עד 5 שעות	5 שעות עד 9 שעות	מעל 9 שעות
6%	100%	3%	8%	20%	20%	16%	11%	16%	6%
שיבא	100%	1%	5%	18%	21%	18%	13%	18%	5%
רמב"ם	100%	2%	5%	15%	16%	14%	10%	22%	16%
אסף הרופא	100%	2%	7%	18%	18%	16%	13%	21%	4%
וולפסון	100%	2%	7%	16%	17%	16%	13%	23%	5%
רבקה זיו	100%	3%	10%	23%	23%	17%	11%	12%	1%
הלל יפה	100%	3%	9%	20%	23%	19%	12%	14%	1%
נהריה	100%	2%	8%	21%	23%	19%	12%	13%	2%
ברזילי	100%	2%	8%	23%	24%	18%	11%	13%	1%
פוריה	100%	2%	10%	25%	21%	17%	12%	13%	1%
סוראסקי	100%	3%	7%	18%	23%	16%	11%	17%	5%
בני ציון	100%	1%	4%	13%	16%	15%	13%	26%	12%
רבין ק. בילינסון	100%	1%	6%	16%	17%	16%	12%	23%	9%
סורוקה	100%	2%	7%	19%	19%	17%	13%	19%	4%
מאיר	100%	2%	7%	24%	26%	18%	10%	11%	2%
קפלן	100%	1%	6%	20%	20%	16%	12%	18%	6%
המרכזי בעמק	100%	3%	8%	22%	25%	14%	9%	13%	6%
הכרמל	100%	4%	7%	14%	16%	14%	11%	21%	13%
השרון ק. גולדה	100%	1%	8%	22%	24%	19%	12%	12%	1%
יוספטל	100%	3%	14%	34%	24%	13%	6%	5%	1%
שניידר	100%	1%	5%	17%	18%	16%	12%	20%	10%
הדסה עין כרם	100%	1%	3%	15%	18%	15%	11%	23%	14%
הדסה הר הצופים	100%	2%	7%	23%	20%	14%	9%	15%	9%
הסקוטי	100%	7%	23%	35%	19%	8%	3%	3%	2%
סנט וינסנט	100%	31%	24%	30%	11%	3%	1%	0%	0%
המשפחה הקדושה	100%	9%	23%	43%	18%	5%	2%	1%	0%
שערי צדק	100%	1%	5%	14%	17%	15%	11%	17%	19%
לניאדו	100%	7%	16%	29%	22%	12%	6%	6%	2%
מעייני הישועה	100%	4%	13%	32%	23%	14%	7%	6%	1%


התפלגות משך השהיה, 2015 סך הביקורים ללא יולדות



אחוז ביקורים מעל 5 שעות לפי סוג שחרור, 2006-2015 מסך הביקורים ללא יולדות




אחוז ביקורים מעל 5 שעות לפי משמרת, 2006-2015 מסך הביקורים ללא יולדות



אחוז ביקורים מעל 5 שעות לפי בית חולים וסוג שחרור
סה"כ ללא יולדות

2012			2015			
העברה לאשפוז	שחרור הביתה	סה"כ	העברה לאשפוז	שחרור הביתה	סה"כ	
25%	14%	17%	35%	17%	22%	סה"כ
28%	22%	24%	28%	22%	24%	שיבא
57%	20%	33%	62%	24%	38%	רמב"ם
19%	18%	19%	42%	21%	25%	אסף הרופא
19%	16%	16%	50%	22%	28%	וולפסון
9%	8%	8%	17%	12%	13%	רבקה זיו
9%	6%	7%	29%	9%	15%	הלל יפה
9%	8%	9%	25%	10%	15%	נהריה
6%	9%	8%	13%	14%	14%	ברזילי
15%	8%	9%	25%	11%	14%	פוריה
15%	10%	12%	43%	14%	22%	סוראסקי
14%	15%	15%	59%	24%	38%	בני ציון
20%	18%	18%	37%	31%	32%	רבין ק. בילינסון
28%	22%	24%	24%	22%	22%	סורוקה
10%	8%	9%	15%	13%	13%	מאיר
29%	17%	20%	35%	20%	24%	קפלן
32%	10%	15%	37%	14%	19%	המרקסי בעמק
58%	26%	36%	46%	29%	34%	הכרמל
11%	11%	11%	15%	13%	14%	השרון ק. גולדה
9%	3%	4%	13%	6%	6%	יוספטל
55%	21%	25%	62%	25%	30%	שניידר
56%	33%	42%	45%	31%	37%	הדסה עין כרם
43%	19%	25%	41%	18%	24%	הדסה הר הצופים
3%	2%	3%	8%	4%	5%	הסקוטי
0%	0%	0%	0%	0%	0%	סנט וינסנט
4%	2%	2%	2%	1%	2%	המשפחה הקדושה
64%	22%	34%	65%	25%	37%	שערי צדק
10%	4%	6%	13%	6%	8%	לניאדו
4%	3%	4%	8%	6%	7%	מעייני הישועה

אחוז ביקורים מעל 5 שעות לפי בית חולים
סה"כ ללא יולדות




7. תפוסה

אחוז התפוסה מחושב בהתאם לסך כל זמני השהיה של כל המטופלים במלר"ד בהשוואה לזמן הפוטנציאלי על פי מספר העמדות בתקן. בשנת 2015 התפוסה הממוצעת במלר"ד הייתה 111%, עלייה מ-100% בשנת 2012. בשעות הבוקר 05:00-08:59 התפוסה נמוכה יחסית לתפוסה גבוהה מעל 120% מהשעה 12:00 בצהריים ועד חצות, כאשר בשעות 14:00-16:59 התפוסה מעל 150%. התפוסה גבוהה בחודשי החורף והקיץ בכל בתי החולים.


בשנת 2015 תפוסה ממוצעת גבוהה במיוחד נרשמה בקפלן (258%), שניידר (185%), ברזילי (184%), שיבא (164%), מאיר (152%), בילינסון (143%), רמב"ם (137%), סורוקה (134%), סוראסקי (133%), שערי צדק (124%) ווולפסון (120%). תפוסה נמוכה נרשמה במשפחה הקדושה (36%) + יוספסל (48%), מעייני הישועה (52%) והסקוטי (55%).

מדד ניצול העמדות במלר"ד מחושב לפי מספר הביקורים לעמדה"בתקן בבית החולים ביחס לממוצע הארצי. ניצול העמדות גבוה בקפלן, סנט יונסנט וברזילי (פי 2.1 ביחס לממוצע הארצי), מאיר (1.6), שיבא (1.5), סורוקה, שניידר וסוראסקי (1.3). ניצול העמדות נמוך בהדסה-עין כרם (0.5) בהשוואה לממוצע הארצי, שערי צדק, הדסה הר הצופים והשרון ק. גולדה (0.6), בני ציון, יוספסל וזיו (0.7).

אחוז תפוסה לפי חודשי השנה, 2015, 2012




אחוז תפוסה לפי שעת כניסה, 2015, 2012




אחוז תפוסה לפי בית חולים, 2012, 2015

+




אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים במחוז+הצפון, 2010-2015




12	11	10	+09	08	07	06	05	04	03	+02	01	סה"כ	בית חולים / 2015
126%	131%	102%	125%	127%	115%	116%	113%	105%	113%	113%	110%	116%	המרכזי בעמק
81%	87%	82%	88%	88%	83%	84%	79%	76%	81%	78%	76%	82%	נהריה
72%	73%	77%	82%	96%	92%	82%	84%	82%	86%	77%	66%	81%	פוריה
76%	62%	65%	64%	64%	65%	68%	70%	63%	78%	73%	64%	68%	סנט וינסנט
57%	53%	60%	65%	73%	70%	64%	65%	62%	61%	57%	48%	61%	רבקה זיו
54%	55%	61%	66%	63%	59%	58%	69%	58%	62%	54%	51%	59%	הסקוטי
35%	33%	36%	41%	40%	38%	39%	35%	33%	36%	33%	31%	36%	המשפחה הקדושה

אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים במחוז חיפה, 2010-2015




12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	סה"כ	בית חולים / 2015
138%	142%	136%	141%	136%	138%	138%	138%	135%	141%	125%	132%	137%	רמב"ם
118%	109%	105%	112%	111%	101%	106%	113%	107%	121%	108%	118%	111%	הכרמל
85%	94%	86%	88%	92%	93%	93%	93%	84%	88%	78%	93%	89%	בני ציון
86%	86%	80%	97%	91%	89%	90%	93%	87%	92%	89%	83%	89%	הלל יפה

אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים במחוז המרכז, 2010-2015




12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	סה"כ	בית חולים / 2015
242%	256%	247%	275%	248%	240%	260%	240%	258%	281%	282%	267%	258%	קפלן
222%	230%	179%	181%	166%	193%	199%	189%	162%	183%	206%	179%	191%	שניידר
152%	152%	150%	163%	152%	151%	155%	155%	145%	150%	145%	150%	152%	מאיר
124%	127%	123%	140%	138%	146%	162%	169%	152%	150%	145%	146%	143%	רבין ק. בילינסון
109%	108%	100%	116%	112%	114%	112%	106%	98%	109%	107%	101%	108%	אסף הרופא
89%	95%	96%	104%	94%	90%	85%	84%	83%	88%	86%	88%	90%	לניאדו
52%	54%	56%	62%	60%	57%	56%	56%	54%	59%	59%	57%	57%	השרון ק. גולדה

אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים במחוז תל אביב, 2010-2015




12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	סה"כ	בית חולים / 2015
150%	163%	161%	176%	173%	172%	168%	167%	165%	166%	160%	171%	166%	שיבא
134%	138%	134%	138%	138%	136%	135%	134%	127%	128%	125%	125%	133%	סוראסקי
122%	125%	113%	131%	123%	121%	120%	112%	111%	118%	119%	122%	120%	וולפסון
61%	62%	55%	62%	55%	51%	50%	51%	47%	52%	57%	56%	55%	מעייני הישועה

אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים במחוז ירושלים, 2010-2015




12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	סה"כ	בית חולים / 2015
141%	121%	103%	123%	122%	118%	112%	121%	123%	136%	135%	136%	124%	שערי צדק
83%	75%	75%	83%	88%	81%	80%	77%	75%	76%	74%	68%	78%	הדסה עין כרם
68%	62%	58%	84%	77%	72%	70%	68%	64%	69%	68%	71%	69%	הדסה הר הצופים

אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים במחוז הדרום, 2010-2015



12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	סה"כ	בית חולים / 2015
170%	189%	186%	187%	201%	204%	198%	192%	178%	167%	170%	174%	170%	ברזילי
138%	132%	126%	116%	142%	143%	130%	130%	133%	131%	147%	145%	138%	סורוקה
38%	47%	42%	47%	58%	56%	51%	48%	51%	49%	46%	45%	38%	יוספטל


מדד ניצול העמדות במלר"ד, 2015



8. זמן הפניה

מספר ביקורים גבוה נרשם בשעות הבוקר והצהריים, 09:00-13:59, ובשעות הערב 18:00-20:59. מספר הפניות עקב מחלה גבוה בשעות 10:00-13:59 ועקב סיבות חיצוניות בשעות 17:00-20:59. מספר הפניות של גילאי 45 ומעלה גבוה יותר בשעות הבוקר, והפניות של ילדים וצעירים עד גיל 25 גבוה יותר בשעות הערב, מספר הפניות עקב סיבות חיצוניות בגילים הצעירים גבוה במיוחד בשעות הערב והלילה. מספר הביקורים נמוך יחסית בשעות הלילה המאוחרות ובשעות הבוקר המוקדמות, 15% מהביקורים היו במשמרת הלילה בשעות 23:00-07:00, לעומת 43% במשמרת בוקר ו-42% במשמרת ערב. כמחצית (47%) מהפניות למלר"ד יולדות היו במשמרת בוקר. כמחצית (47%) מהפניות למלר"ד ילדים היו במשמרת ערב. מספר הפניות בשעות הערב גבוה בבתי החולים המשפחה הקדושה, סנט וינסנט, הסקוטי, פוריה ונהריה. מספר הפניות בשעות הבוקר גבוה בבתי החולים השרון ק. גולדה, בני ציון, בילינסון, סוראסקי ומעייני הישועה. שעות העומס עם מספר כניסות גבוה מהשחרורים הן השעות 07:00-13:59 והשעות 18:00-20:59. ביום ראשון נרשם מספר הביקורים הגבוה ביותר ובשבת הנמוך ביותר. בערב שישי מספר הביקורים נמוך ובמוצאי שבת גבוה. מספר ההעברות לאשפוז יציב בין חצות היום לחצות הלילה. מספר ההעברות לאשפוז בפנימיות גבוה בשעות 15:00-21:59. כעשירית מההעברות לאשפוז היו בשעות הבוקר, 08:00-11:59 (12%) לאשפוז ללא יולדות, 11% לפנימיות), האחוז גבוה יותר בהדסה הר הצופים, רמב"ם ושערי צדק. לעומת זאת, חמישית מההעברות לאשפוז היו בשעות הצהריים, 12:00-15:59 (21% לאשפוז ללא יולדות, 20% לפנימיות), האחוז גבוה יותר בבית החולים הסקוטל, יניאדה, ושרון ק. גולדה ומאיר. מספר הביקורים בשעות 17:00-19:59 נמוך יותר למבוטחי מכבי בהשוואה לשאר הקופות, ומספר הביקורים בשעות 10:00-12:59 גבוה יותר למבוטחי לאומית.

סה"כ כניסות ושחרורים לפי שעת כניסה, 2012, 2015
מספרים מוחלטים



ביקורים לפי משמרת, 2015


משמרות:

בוקר: 07:00 עד 14:59


עבר: 15:00 עד 22:59

לילה: 23:00 עד 06:59


סה"כ




יולדות



ילדים




מיון כללי




ביקורים לפי סיבת כניסה ושעת כניסה, 2015


מספרים מוחלטים



שחרורים לפי סוג ושעת שחרור, 2012, 2015
מספרים מוחלטים




העברות לאשפוז בפנימיות לפי שעת כניסה ושחרור מהמלר"ד, 2015
מספרים מוחלטים




אחוז ההעברות לאשפוז כללי ללא יולדות לפי בית חולים, 2015

בשעות 12:00-16:00




בשעות 08:00-12:00




אחוז ההעברות לאשפוז בפנימיות לפי בית חולים, 2015

בשעות 12:00-16:00




בשעות 08:00-12:00




ביקורים לפי יום בשבוע ושעת כניסה, 2015

מספרים מוחלטים


סה"כ



מחלה




סיבות חיצוניות




התפלגות הביקורים לפי גיל ושעת כניסה, 2015


אחוזים
סה"כ




מחלה




סיבות חיצוניות




ביקורים לפי גורם מבטח ושעת כניסה, 2015



ביקורים לפי בעלות בית החולים ושעת כניסה, 2015+




ביקורים לפי מחוז בית החולים ושעת כניסה, 2015




ביקורים לפי בית חולים ושעת כניסה, 2015


מחוז צפון



מחוז חיפה




מחוז מרכז




ביקורים לפי בית חולים ושעת כניסה, 2015


מחוז תל אביב



מחוז ירושלים



מחוז דרום



9. גורם מכנה


אחוז הביקורים עם הפניה רפואית במגמת עליה, 69% בשנת 2015 בהשוואה ח-66% בשנת 2010 ו-63% בשנת 2006 מכלל הביקורים ללא יולדות. האחוז גבוה יותר בביקורים עקב מחלה, 72%, בהשוואה לביקורים עקב סיבות חיצוניות, 60%, בשנת 2015. אחוז הביקורים עם הפניה רפואית גבוה לילדים עד גיל 15 (75% מהביקורים עקב מחלה, 69% מהביקורים עקב סיבות חיצוניות) ולמבוגרים בגיל 65 ומעלה (76%-71%, בהתאמה) ונמוך יותר לצעירים בגיל 15-44 (67%-52%, בהתאמה).

ביקורים עם הפניה רפואית שכיחים יותר בשעות היום והערב, ואילו ביקורים ללא הפניה רפואית שכיחים יותר בשעות הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות.


אחוז גבוה של ביקורים עם הפניה רפואית נרשם בבתי החולים המרכזי בעמק (78%), קפלן (77%), שניידר ונהריה (76%), פוריה, הכרמל וסורוקה (75%), מאיר, אסף הרופא, יוספטל ורמב"ם (73%). אחוז נמוך של ביקורים עם הפניה רפואית נרשם במשפחה הקדושה (41%), לניאדו (46%), הסקוטי (56%), שיבא (58%), הדסה הר הצופים (62%), סוראסקי (64%), השרון ק. גולדה ובילינסון (65%), וולפסון ושערי צדק (66%).

אחוז הביקורים הנמוך ביותר עם הפניה רפואית נרשם בקרב מבוטח+מכבי (64% עקב מחלה ו-51% עקב סיבות חיצוניות), לעומת אחוז גבוה יותר בכללית (76% עקב מחלה ו-64% עקב סיבות חיצוניות), (תאומית (73%-61%, בהתאמה) ומאוחדת (72%-63%, בהתאמה).


אחוז ביקורים עם הפניה רפואית לפי סיבת כניסה, 2006-2015
מסך הביקורים ללא יולדות




אחוז ביקורים עם הפניה רפואית לפי סיבת כניסה וגיל, 2015
מסך הביקורים ללא יולדות




אחוז ביקורים עם הפניה רפואית לפי סיבת כניסה וגורם מבטח, 2015
מסך הביקורים ללא יולדות



אחוז ביקורים עם הפניה רפואית לפי שעת כניסה, 2015
מסך הביקורים ללא יולדות



אחוז ביקורים עם הפניה רפואית לפי בית חולים, 2015
מסך הביקורים ללא יולדות



ס. סיבת כניסה

בשנת 2015, שני שלישי (65%) מכלל הביקורים במחלקות לרפואה דחופה היו עקב מחלה, 21% עקב סיבות חיצוניות ו-13% עקב לידה, בהשוואה ל-65%, 25% ו-10% בהתאמה, בשנת 2006. שלושה רבעים מהביקורים ללא יולדות היו עקב מחלה ורבע עקב סיבות חיצוניות.

בעשור האחרון, 2006-2015, שיעור הביקורים עקב פגיעות חיצוניות ירד ב-15%, השיעור עקב פגיעות מכוונות ירד בשליש (33%), עקב תאונות דרכים ב-29%, עקב תאונות עבודה ב-25%, ושיעור הביקורים עקב פגיעות לא מכוונות או עם כוונה לא ידועה ירד ב-6%.

כחמישית (18%) מהביקורים עקב מחלה היו של תינוקות וילדים עד גיל 15, 38% של גילאי 15-44, 20% של גילאי 45-64 ורבע (25%) של גילאי 65 ומעלה. מספר הביקורים עקב מחלה גבוה לנקבות בגיל 15-44 ובגיל 75 ומעלה בהשוואה לזכרים באותם גילאים, כאשר בגיל 25-30 המספר גבוה פי 1.7 בהשוואה לזכרים.


אחוז הביקורים עקב סיבות חיצוניות גבוה יותר בקרב זכרים, 30% בהשוואה ל-19% בקרב נקבות מכלל הביקורים ללא יולדות. כשני שלישי (62%) מהביקורים עקב סיבות חיצוניות וכמחצית (48%) מהביקורים עקב מחלה היו של זכרים.

כרבע (27%) מהביקורים עקב סיבות חיצוניות היו של תינוקות וילדים עד גיל 15, חמישית (21%) של צעירים בגיל 15-24, רבע (25%) של גילאי 25-44 ורבע (27%) של גילאי 45 ומעלה. מספר הביקורים עקב סיבות חיצוניות גבוה לזכרים עד גיל 65 בהשוואה לנקבות, במיוחד בגיל 13-14 (פי 2.6 בהשוואה לנקבות) ובגיל 20-21 (פי 3.0 בהשוואה לנקבות), ואילו בגיל 82 ומעלה מספר הביקורים של נקבות גבוה פי 2 בהשוואה לזכרים.

בשנת 2015, שני שלישי (68%) מהביקורים עקב סיבות חיצוניות היו כתוצאה מפגיעות לא מכוונות או ללא כוונה ברורה, חמישית (19%) עקב תאונות דרכים, עשירית (10%) עקב תאונות עבודה ו-3% היו פגיעות מכוונות. מעל שני שלישי מהביקורים עקב פגיעות מכוונות, תאונות עבודה, פעולות איבה ותאונות דרכים היו של צעירים בני 15-44. למעלה ממחצית הביקורים עקב פגיעות לא מכוונות וכשני שלישי מהביקורים עקב פגיעה ללא כוונה ברורה היו של בני 1-24.


בשנת 2015, שיעור הביקורים עקב סיבות חיצוניות גבוה פי 1.6 לזכרים בהשוואה לנקבות, כאשר בביקורים עקב תאונות עבודה השיעור גבוה פי 3.6 בהשוואה לנקבות, עקב פגיעות מכוונות פי 1.9, עקב פגיעות עם כוונה לא ברורה פי 1.8 ועקב תאונות דרכים או פגיעות לא מכוונות פי 1.4.

ביקורים לפי סיבת כניסה, 2015




ביקורים ללא יולדות לפי סיבת כניסה ומגדר, 2015


זכרים




נקבות



מחלה




סיבות חיצוניות




ביקורים לפי סיבת כניסה וגיל, 2015


אחוזים




שיעור הביקורים לפי סיבת כניסה, 2006-2015
שיעור גולמי ל-1,000 נפש



שיעור הביקורים עקב סיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה, 2006-2015
שיעור גולמי ל-1,000 נפש



אחוז שינוי בשיעור הביקורים עקב סיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה, 2015/2006




ביקורים לפי סיבת כניסה, 2015
אלפים, שיעור גולמי ל-1,000 נפש

ס"ס	כ"נ	ס"ס	כ"ז	נ	קבו	זכר / קבו
ממפרים - אלפ						
ס"ס	2,952.6	1,316.9	1,635.1	0.81		
לידה	389.2		389.2			
מחלה	1,924.1	921.6	1,002.3	0.92		
סיבות חיצוניות	630.1	390.4	239.5	1.63		
תאונת דרכים	118.0	68.8	49.2	1.40		
תאונת עבודה	64.4	50.4	13.8	3.65		
פעולות איבה	1.1	0.7	0.4	1.70		
פגיעה מכוונת	18.0	11.7	6.2	1.89		
פגיעה לא מכוונת	309.9	182.0	127.9	1.42		
פגיעה עם כוונה לא ידועה	118.8	76.8	41.9	1.83		
שיעור גולמי ל-1,000 נפש						
ס"ס	352.3	311.6	393.7	0.79		
לידה			93.7			
מחלה	229.6	218.0	241.3	0.90		
סיבות חיצוניות	75.2	92.3	57.7	1.60		
תאונת דרכים	14.1	16.3	11.8	1.37		
תאונת עבודה	7.7	11.9	3.3	3.59		
פעולות איבה	0.1	0.2	0.1	1.67		
פגיעה מכוונת	2.1	2.8	1.5	1.86		
פגיעה לא מכוונת	37.0	43.0	30.8	1.40		
פגיעה עם כוונה לא ידועה	14.2	18.2	10.1	1.80		

ביקורים עקב סיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה, 2006-2015
אלפים, אחוזים

ממפרים - אלפ					אחוזים				
0006	0000	2222	1114	1115	0006	0000	2222	1114	1115
ס"ס	630.1	625.9	652.2	621.2	621.5	100%	100%	100%	100%
תאונת דרכים	118.0	109.7	120.5	123.9	139.4	22%	20%	18%	18%
תאונת עבודה	64.4	65.7	80.0	74.6	72.7	12%	12%	12%	10%
פעולת איבה	1.1	4.6	1.3	0.4	4.5	1%	0%	0%	1%
פגיעה מכוונת	18.0	18.8	20.1	21.3	22.7	4%	3%	3%	3%
פגיעה לא מכוונת	309.9	304.5	308.6	285.2	270.2	43%	46%	47%	49%
פגיעה עם כוונה לא ידועה	118.8	122.7	121.7	115.7	112.1	18%	19%	19%	20%

ביקורים עקב סיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה, 2015
אחוזים




ביקורים לפי סיבת כניסה וגיל, 2015
אלפים, אחוזים

פג יעי אחרת	פג לא מכוונת	פג מכוונת	פעילות איי	תא עבודה	תא דרכים	ס"כ יבנות צו	לידה	מ	ס"כ	ס"כ
118.8	309.9	18.0	1.1	64.4	118.0	630.1	389.2	1,924.1	2,952.6	ס"כ
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	000%	100%	100%	אחז
1%	2%	0%	1%	0%	1%	1%		5%	3%	0
11%	14%	0%	1%	0%	3%	9%		7%	6%	1-4
29%	20%	5%	5%	0%	7%	17%		6%	8%	5-14
22%	18%	36%	47%	18%	25%	21%	19%	13%	15%	15-24
11%	9%	23%	18%	28%	23%	15%	60%	14%	20%	25-34
8%	7%	14%	11%	23%	16%	11%	20%	11%	12%	35-44
6%	6%	10%	7%	16%	11%	8%		9%	8%	45-54
5%	6%	6%	6%	12%	8%	7%		11%	8%	55-64
3%	6%	3%	3%	3%	4%	5%		10%	7%	65-74
2%	7%	1%	1%	0%	2%	4%		9%	7%	75-84
1%	5%	1%	0%	0%	0%	3%		6%	4%	85+

סה"כ כולל גם ביקורים עם סיבת כניסה ללא ידועה.

יחס זכרים/נקבות בביקורים לפי סיבת כניסה וגיל, 2015



ו. אשפוזים מהמלר"ד

אחוז האשפוזים מהמלר"ד יציב בשנים האחרונות, 27% מכלל הביקורים ללא יולדות, ירידה מ-29% בשנת 2006. בשנת 2015 שליש (32%) מהפונים עקב מחלה אושפזו, עשירית (11%) מהפונים עקב סיבות חיצוניות ומחצית (48%) מהיולדות, ירידה מ-36%, 10% ו-56%, בהתאמה, בשנת 2006. רבע (25%) מהפונים עקב פגיעה מכוונת אושפזו, 23% מפעולות איבה, 13% מפגיעה לא מכוונת, 8% מתאונת דרכים, 7% עקב טעות לא ידועה ו-6% מהפונים עקב תאונת עבודה אושפזו.

אחוז האשפוזים בקרב הפונים עם הפניה רפואית גבוה בהשוואה לאלו ללא הפניה רפואית, 33% לעומת 31% בביקורים עקב מחלה, 12% לעומת 8% בביקורים עקב סיבות חיצוניות, תוהתאמה.


אחוז האשפוזים מסך הביקורים ללא יולדות וקטגוריות אחרות הממוצע הארצי בבתי חולים הדסה עין כרם (41%), בני ציון (40%), רמב"ם (38%), נהריה (33%), שיבא (32%) ושערי צדק (31%). אחוז האשפוזים מכלל הביקורים עקב מחלה גבוה בהדסה עין כרם (46%), בני ציון (45%), רמב"ם (44%), נהריה (42%), ברזילי (37%) ושיבא והלל יפה (36%) ושערי צדק (35%).

אחוז האשפוזים בגבוה לתינוקות עד גיל שנה (32%) ומגיל 55 ומעלה האחוז במגמת עליה. שליש (33%) מהפונים בגיל 55-64 אושפזו, 64% בגיל 65-74, 53% בגיל 75-84 ו-61% מהפונים בגיל 85 ומעלה. אחוז האשפוזים הנמוך ביותר נרשם בגיל הצבא 18-21. אחוז אשפוזים גבוה לפונים עד גיל 17 נרשם בבני ציון (36%), הדסה עין כרם (34%), מעייני השרון (27%), הכרמל (26%), הדסה הר הצופים, רמב"ם וסורוקה (25%). אחוז אשפוזים גבוה לגילאי 65 ומעלה נרשם בנהריה (67%), רמב"ם (64%), בני ציון וברזילי (61%), הדסה עין כרם ולניאדו (58%) והלל יפה (56%).


אחוז האשפוזים של מבטחי לאומית גבוה יותר בהשוואה לשאר הקופות בקרב ילדים עד גיל 4 ובגילאי 45 ומעלה, ואילו למבטחי כללית נרשם אחוז האשפוזים הנמוך ביותר בכל הגילאים.

אחוז האשפוזים מכלל הביקורים ללא יולדות גבוה יותר בשעות הבוקר בהשוואה לשאר שעות היממה, לפונים שהגיעו למלר"ד בשעות 05:00-07:00 וכן לאלו שהשתחררו בשעות 08:00-10:00. שליש (33%) מהפונים שאושפזו הועברו לפנימיות, 14% ליולדות, 10% להשהיה, 10% לילדים, 10% לנשים, 7% לכירורגיה כללית, 4% לאורתופדיה, 2% לנרולוגיה, 2% לאורולוגיה, 2% לכירורגיה ילדים ו-9% לשאר המחלקות.


אחוז האשפוזים לפי סיבת כניסה, 2015
מסה"כ הביקורים




אחוז האשפוזים לפי סיבת כניסה, 2006-2015




אחוז האשפוזים מסיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה, 2015




אחוז האשפוזים לפי שעת כניסה ושעת שחרור, 2015
מסה"כ הביקורים ללא יולדות




מסה"כ הביקורים עקב מחלה



מסה"כ הביקורים ללא ילדות



אחוז האשפוזים לפי גיל וסיבת כניסה, 2015



אחוז האשפוזים לפי סיבת כניסה וגורם מפנה, 2015

סיבת כניסה	הפניה רפואית	פניה עצמית
סה"כ	28%	32%
סה"כ ללא ילדות	28%	24%
מחלה	33%	31%
סיבות חיצוניות	12%	8%
ילדות	29%	56%

אחוז האשפוזים לפי סיבת כניסה וגיל, 2015

גיל	סה"כ	סה"כ ללא ילדות	מחלה	סיבות חיצוניות	ילדות
סה"כ	30%	27%	32%	11%	48%
0	32%	32%	33%	19%	
1-4	19%	19%	24%	9%	
5-14	17%	17%	24%	8%	
15-24	19%	14%	17%	7%	48%
25-34	28%	16%	19%	7%	47%
35-44	26%	19%	23%	7%	50%
45-54	26%	26%	30%	10%	48%
55-64	33%	33%	38%	13%	
65-74	43%	43%	46%	20%	
75-84	53%	53%	56%	32%	
85+	61%	61%	64%	41%	

אחוז האשפוזים לפי סיבת כניסה, קופה וגיל, 2015


מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	סה"כ	
סה"כ ללא יולדות					
27%	28%	29%	27%	27%	סה"כ
31%	30%	35%	29%	32%	0
21%	19%	23%	19%	19%	1-4
18%	17%	18%	16%	17%	5-14
17%	16%	17%	14%	14%	15-24
19%	18%	17%	15%	16%	25-34
22%	21%	21%	18%	19%	35-44
27%	27%	29%	25%	26%	45-54
35%	35%	37%	32%	33%	55-64
45%	45%	48%	41%	43%	65-74
56%	56%	57%	51%	53%	75-84
65%	64%	65%	59%	61%	85+
מחלה					
33%	34%	36%	32%	32%	סה"כ
32%	33%	37%	30%	33%	0
26%	25%	29%	23%	24%	1-4
25%	24%	27%	24%	24%	5-14
20%	20%	21%	18%	17%	15-24
23%	21%	20%	18%	19%	25-34
26%	25%	26%	22%	23%	35-44
32%	32%	34%	29%	30%	45-54
40%	39%	42%	36%	38%	55-64
49%	49%	52%	45%	46%	65-74
60%	59%	61%	54%	56%	75-84
68%	67%	68%	63%	64%	85+
סיבות חיצוניות					
11%	11%	12%	11%	11%	סה"כ
23%	15%	20%	18%	19%	0
11%	8%	11%	9%	9%	1-4
9%	8%	9%	7%	8%	5-14
9%	8%	9%	7%	7%	15-24
7%	7%	7%	6%	7%	25-34
8%	8%	8%	7%	7%	35-44
11%	10%	10%	9%	10%	45-54
13%	15%	13%	12%	13%	55-64
22%	22%	23%	19%	20%	65-74
35%	36%	35%	31%	32%	75-84
44%	47%	46%	40%	41%	85+

אחוז האשפוזים לפי גיל ובית חולים, 2015
מסה"כ הביקורים ללא יולדות

+

סה"כ	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
סה"כ	27%	32%	19%	17%	14%	16%	26%	33%	43%	53%	61%
שיבא	32%	25%	16%	18%	17%	19%	32%	38%	47%	56%	63%
רמב"ם	38%	32%	21%	23%	21%	26%	43%	51%	60%	66%	69%
א ס הרופא	22%	27%	14%	14%	9%	12%	22%	30%	38%	45%	46%
וולפסון	24%	32%	17%	14%	10%	11%	19%	26%	37%	47%	59%
רבקה זיו	26%	37%	23%	17%	14%	19%	25%	31%	42%	54%	64%
הלל יפה	28%	40%	24%	18%	14%	15%	27%	38%	47%	58%	68%
נהריה	33%	34%	22%	21%	18%	21%	33%	43%	58%	70%	76%
ברזילי	28%	32%	18%	12%	11%	15%	26%	35%	49%	64%	74%
פוריה	24%	45%	29%	17%	10%	12%	25%	34%	45%	55%	65%
סוראסקי	29%	23%	16%	19%	14%	16%	29%	37%	44%	52%	61%
בני ציון	40%	41%	35%	33%	27%	30%	37%	43%	53%	62%	69%
רבין ק. בילינסון	25%				10%	13%	22%	30%	38%	47%	56%
סורוקה	26%	40%	24%	18%	13%	15%	24%	32%	43%	53%	62%
מאיר	25%	24%	13%	12%	12%	13%	25%	32%	40%	50%	60%
קפלן	26%	34%	21%	16%	12%	12%	21%	29%	39%	54%	64%
המרכזי בעמק	21%	34%	22%	19%	11%	11%	18%	24%	33%	42%	48%
הכרמל	25%	41%	26%	20%	14%	12%	18%	24%	30%	38%	46%
השרון ק. גולדה	27%				9%	10%	19%	25%	32%	46%	58%
יוספטל	10%	16%	10%	6%	4%	6%	10%	13%	20%	29%	34%
שניידר	14%	21%	12%	17%							
הדסה עין כרם	41%	50%	33%	31%	27%	32%	40%	46%	53%	60%	65%
הדסה הר הצופים	24%	36%	24%	23%	14%	17%	24%	32%	38%	48%	57%
הסקוטי	17%	26%	14%	14%	10%	11%	18%	24%	33%	41%	47%
סנט וינסנט	17%	33%	22%	20%	11%	14%	7%	6%	6%	6%	7%
המשפחה הקדושה	13%				2%	7%	10%	13%	20%	31%	44%
שערי צדק	31%	28%	17%	18%	19%	25%	29%	36%	43%	52%	61%
לניאדו	28%	39%	25%	15%	12%	12%	26%	35%	47%	59%	69%
מעייני הישועה	27%	42%	26%	16%	17%	20%	20%	26%	32%	47%	59%

אחוז האשפוזים של ילדים ומבוגרים לפי בית חולים, 2015



התפלגות האשפוזים מהמלר"ד לפי מחלקה מאשפזת, 2015
מסה"כ האשפוזים מהמלר"ד




12. פטירות

בשנת 2015 נרשמו 2,057 פטירות במחלקות לרפואה דחופה ב-28 בתי החולים לאשפוז כללי, מהם 1,807 פונים שהגיעו עקב מחלה ו-209 עקב סיבות חיצוניות. אחוז הפטירות מכלל "הביקורים במלר"ד רשם עליה קלה בשנים האחרונות, 0.07% בשנת 2015 לעומת 0.05% בשנת 2006. אחוז הפטירות גבוה בקרב זכרים+ (0.09%) בהשוואה לנקבות (0.05%). האחוז עולה עם הגיל, 70% מהנפטרים היו בגיל 65 ומעלה, 12% בגיל 55-64, 14% בגיל 15-54, 3% ילדים בגיל 1-14 ו-2% תינוקת+עד גיל שנה בשנת 2015.

פטירות לפי סיבת כניסה, 2015
מספרים מוחלטים, אחוזים ואחוז מסה"כ הביקורים

סיבת כניסה	מספר פטירות	אחוז	אחוז הפטירות מסך הביקורים
סה"כ	2,057	100.0%	0.07%
ל ה	1	0.0%	0.00%
מחלה	1,807	79.7%	0.09%
סיבות חיצוניות	209	9.2%	0.03%
תאונת דרכים	61	2.7%	0.05%
תאונת עבודה	10	0.4%	0.02%
פעולת איבה	14	0.6%	1.24%
פגיעה מכוונת	57	2.5%	0.31%
פגיעה לא מכוונת	49	2.2%	0.02%
פגיעה אחרת	18	0.8%	0.02%
לא ידוע	40	1.8%	0.41%


אחוז הפטירות, 2006-2015
מסה"כ הביקורים



אחוז הפטירות לפי גיל ומגדר, 2015
מסה"כ הביקורים

גיל	סה"כ	זכרים	נקבות
סה"כ	0.07%	0.09%	0.05%
0	0.04%	0.04%	0.04%
1-4	0.01%	0.02%	0.01%
5-14	0.01%	0.01%	0.01%
15-24	0.01%	0.02%	0.00%
25-34	0.01%	0.03%	0.00%
35-44	0.02%	0.03%	0.01%
45-54	0.05%	0.07%	0.02%
55-64	0.09%	0.12%	0.06%
65-74	0.15%	0.19%	0.11%
75-84	0.25%	0.27%	0.23%
85+	0.48%	0.49%	0.47%

התפלגות הפטירות לפי גיל, 2015
מסה"כ הפטירות במלר"ד



13.1 אחוז כיסוי קידוד אבחנות במלר"ד

בעשור האחרון נרשמה מגמת עליה בקידוד האבחנות במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים. בשנת 2015 נרשמו כ-2.7 מיליון ביקורים עם סימול אבחנה לפי ICD-9-CM, 90% מכלל הביקורים, כאשר ל-85% מהביקורים נרשמה אבחנה מוגדרת (ללא קודי האבחנות 780.99, 796.9, 799.9), עליה מ-88% ו-78%, בהתאמה, בשנת 2012 ומאחוזים נמוכים יותר בשנים 2006-2011. אחוז כיסוי האבחנות לביקורים ללא יולדות גבוה יותר, 94% בשנת 2015, האחוז נע בין 93%-95% בקבוצות הגיל השונות.

אחוז כיסוי קידוד האבחנות במחלקות לרפואה דחופה עלה במרבית בתי החולים בשנים האחרונות, ובחלקם נרשמה עלייה ניכרת, יחד עם זאת, עדיין יש בתי חולים עם כיסוי נמוך. בשנת 2015 קידוד האבחנות, ללא אבחנות בלתי מוגדרות, היה נמוך בבתי החולים מעייני הישועה (35%), הדסה עין כרם (45%), המשפחה הקדושה (66%), הדסה הר הצופים (68%), סורוקה (75%), ברזילי (76%), שערי צדק (78%), סוראסקי (80%) ובילינסון (81%). בבתי החולים נהריה, סנט וינסנט, זיו, פורה, הילל יפה והסקוטי כיסוי האבחנות היה גבוה מ-95%.

אחוז האבחנות הבלתי מוגדרות (הקודים 780.99, 796.9, 799.9) הצטמצם ל-5% בשנת 2015 (139 אלף ביקורים) לעומת 10% בשנת 2012. האחוז גבוה בברזילי (23%), המשפחה הקדושה (20%), בני ציון (15%), שניידר ולניאדו (12%), מאיר (10%), שיבא והמרכזי בקמע (8%).

אחוז הביקורים במלר"ד יולדות עם קודי אבחנות המצביעות על הריון או לידה (V22, 630-677, V23, V27) היה 60% בלבד, האחוז נמוך במיוחד בהדסה הר הצופים (18%), מעייני הישועה (17%), הדסה עין כרם (13%), סורוקה (3%), סוראסקי ושערי צדק (פחות מאחוז), לעומת אחוז גבוה בלניאדו, וולפסון, אסף הרופא וזיו, בהם האחוז היה קרוב ל-100%.

לשלושה רבעים (76%) מהפניות עם סיבת כניסה המצביעה על תאונות או פציעות (סיבות חיצוניות) נרשמו קודי אבחנות של תאונות או פגיעות (800-999 ללא 999.9, או E-codes), האחוז גבוה בהלל יפה, פורז, הייז ויוספטל, ונמוך יותר במעייני הישועה, העין כרם, הכרמל וברזילי.

יש צורך בהמשך בקרה על איכות ושלמות קידוד האבחנות במלר"ד בבתי החולים.


אבחנה לא מוגדרת כוללת הקודים 780.99, 796.9, 799.9:

799.9	Other unknown and unspecified cause of morbidity or mortality
796.9	Other nonspecific abnormal findings
780.99	Other general symptoms

קודי האבחנות המצביעים על הריון או לידה: V22, V23, V27, 630-677.


קודי האבחנות המצביעים על תאונות או פגיעות: 800-999 ללא 999.9 או E-codes.

אחוז הביקורים עם קידוד אבחנות, 2006-2015
מסך הביקורים



* אבחנה לא מוגדרת כוללת הקודים: 799.9, 796.9, 780.99

אחוז הביקורים עם קידוד אבחנות לפי גיל, 2015
מסך הביקורים ללא יולדות




* אבחנה לא מוגדרת כוללת הקודים: 799.9, 796.9, 780.99

אחוז הביקורים עם קידוד אבחנות לפי בית חולים, 2012, 2015
מכלל הביקורים


אחוז הביקורים עם אבחנה לא מוגדרת *		אחוז הביקורים עם קידוד אבחנות, ללא אבחנה לא מוגדרת *		אחוז הביקורים עם קידוד אבחנות		בית חולים
2015	2012	2015	2012	2015	2012	
5%	10%	85%	78%	90%	88%	סה"כ
8%	28%	91%	72%	100%	100%	שיבא
1%	2%	87%	82%	88%	84%	רמב"ם
5%	3%	94%	96%	100%	99%	אסף הרופא
1%	1%	89%	81%	91%	82%	וולפסון
1%	4%	98%	93%	99%	98%	רבקה זיו
1%	4%	99%	67%	100%	72%	הלל יפה
1%	1%	95%	93%	96%	94%	נהריה
23%	20%	76%	80%	100%	100%	ברזילי
0%	2%	99%	96%	99%	98%	פוריה
1%	16%	80%	77%	81%	93%	סוראסקי
15%	42%	85%	57%	100%	99%	בני ציון
1%	6%	81%	82%	82%	87%	רבין ק. בילינסון
3%	10%	75%	74%	78%	83%	סורוקה
10%	14%	87%	84%	96%	98%	מאיר
3%	9%	94%	74%	97%	82%	קפלן
8%	12%	91%	84%	99%	96%	המרכזי בעמק
2%	12%	94%	83%	96%	95%	הכרמל
5%	6%	93%	94%	98%	100%	השרון ק. גולדה
6%	9%	92%	91%	98%	100%	יוספטל
12%	28%	86%	71%	98%	99%	שניידר
0%	0%	45%	46%	45%	46%	הדסה עין כרם
0%	0%	68%	60%	68%	60%	הדסה הר הצופים
1%	9%	99%	91%	100%	100%	הסקוטי
2%	3%	98%	97%	99%	100%	סנט וינסנט
20%	0%	66%	2%	85%	2%	המשפחה הקדושה
2%	4%	78%	73%	80%	77%	שערי צדק
12%	12%	88%	88%	100%	100%	לניאדו
0%	0%	35%	52%	35%	52%	מעייני הישועה

* אבחנה לא מוגדרת כוללת הקודים: 799.9, 796.9, 780.99.


אחוז הביקורים עם קידוד אבחנה, ללא אבחנה לא מוגדרת, 2012, 2015
קודי אבחנה לא מוגדרת: 780.99, 796.9, 799.9



אחוז הביקורים במלר"ד יולדות עם רישום אבחנות להריון או לידה, 2010, 2015
קודי אבחנות להריון או לידה: V27, V23, V22, 630-677



אחוז הביקורים עקב סיבות חיצוניות עם רישום אבחנות תאונות או פגיעות, 2010, 2015
קודי אבחנות תאונות או פגיעות: 800-999 ללא 999.9, או E-codes
סיבת כניסה: סיבות חיצוניות (תאונות ופציעות)



13.2 אבחנות שכיחות לפי גיל

התפלגות האבחנות במחלקות לרפואה דחופה מוצגת בהתאם להתפלגות הגילים של הפונים. בשנת 2015, האבחנות השכיחות שנרשמו היו הריון ולידה (8.8%), סימפטומים כלליים (6.7%), סימפטומים של בטן ואגן (6.2%), כאבים בחזה (4%), חום, בדיקות חשד למצבים שלא אומתו, סימפטומים נשימתיים, סיבוכים של הריון ולידה, וכן שברים, פציעות וחבלות שונות.

האבחנות השכיחות בגיל הינקות 0-4: חום (13%), סימפטומים כלליים (9.8%), סימפטומים במערכת העיכול (4.5%), זיהומים בדרכי הנשימה העליונות (4.2%), סימפטומים נשימתיים (4%), זיהומים ויראליים (3.6%), דלקת ריאות, דלקות לא זיהומיות במערכת העיכול, דלקות אוזניים, שברים, פציעות וחבלות שונות.

האבחנות השכיחות בקרב ילדים בגיל 0-17: סימפטומים כלליים (9%), חום (7.6%), סימפטומים של בטן ואגן (5.1%), סימפטומים במערכת העיכול, זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, שברים, פציעות וחבלות שונות.

האבחנות השכיחות בגיל 18-21: סימפטומים של בטן ואגן (8%), הריון ולידה (7.2%), סימפטומים כלליים (6.5%), בדיקות חשד למצבים שלא אומתו, מחלות של מערכת המין הנקבית, סימפטומים של ראש וצוואר, תאונות דרכים, שברים, פציעות וחבלות שונות.

האבחנות השכיחות בגיל הפריור 22-44: הריון ולידה (23.5%), סימפטומים של בטן ואגן (7%), סימפטומים כלליים (5%), סיבוכים של הריון ולידה (4.8%), מחלות של מערכת המין הנקבית, כאבים בחזה, בדיקות חשד למצבים שלא אומתו, כאבי גב, סימפטומים של ראש וצוואר, שברים, פציעות וחבלות שונות.


האבחנות השכיחות בגיל 45-64: כאבים בחזה (8.7%), סימפטומים כלליים (7.1%), סימפטומים של בטן ואגן (6.6%), כאבי גב, סימפטומים נשימתיים, סימפטומים של מערכת השתן, בדיקות חשד למצבים שלא אומתו, סימפטומים של ראש וצוואר, מחלות של מערכת השריר והשלד, מחלות עיניים, שברים, פציעות וחבלות שונות.


האבחנות השכיחות בגיל 65-74: כאבים בחזה (7.8%), סימפטומים כלליים (7.1%), סימפטומים של בטן ואגן (5.5%), סימפטומים נשימתיים (3.9%), דלקות בדרכי השתן, חום, כאבי גב, הפרעות קצב, עייפות וחולשה, שברים, פציעות וחבלות שונות.

האבחנות השכיחות בגיל 75 ומעלה: סימפטומים כלליים (7.3%), סימפטומים נשימתיים (5.4%), כאבים בחזה (5.4%), דלקות בדרכי השתן (4.4%), סימפטומים של בטן ואגן (4.4%), חום (3.9%), דלקת ריאות, עייפות וחולשה, הפרעות קצב, אנמיה, שברים, פציעות וחבלות שונות.

ביקורים לפי אבחנה, 2015


אבחנות שכיחות - סה"כ הגילים






ביקורים לפי אבחנה, 2015


אבחנות שכיחות – גיל 0-17




ביקורים לפי אבחנה, 2015
אבחנות שכיחות – גיל 18-21



ביקורים לפי אבחנה, 2015
אבחנות שכיחות – גיל 22-44




אבחנות שכיחות – גיל 45-64




ביקורים לפי אבחנה, 2015

אבחנות שכיחות – גיל 65-74



ביקורים לפי אבחנה, 2015
אבחנות שכיחות – גיל 75 ומעלה



ביקורים לפי אבחנה וגיל, 2015 - מספרים מוחלטים

אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
סה"כ ביקורים עם קידוד אבחנות	2,652,844	267,783	217,410	72,178	191,080	931,439	452,809	205,691	312,924
Normal delivery & pregnancy	234,348			389	13,669	219,068	1,014		
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	178,663	26,129	17,534	6,263	12,428	46,453	32,346	14,547	22,751
Abdominal & pelvic symptoms	163,697	3,881	16,657	7,632	15,274	65,496	29,774	11,217	13,711
Chest pain	107,242	130	1,636	1,301	3,700	28,139	39,506	15,967	16,831
Fever	78,025	34,933	6,578	1,099	1,929	8,336	7,448	5,334	12,348
Other injuries	67,910	13,814	10,555	2,378	5,181	15,563	7,690	3,783	8,850
Examination for suspected conditions not found	60,696	6,733	5,102	2,025	4,879	23,899	9,656	3,504	4,787
Respiratory symptoms	59,621	10,580	2,511	655	1,660	8,230	11,030	8,072	16,876
Fracture of upper limb	53,047	4,043	17,452	2,525	3,563	10,158	7,624	3,399	4,267
Open wound & injury of head, neck & trunk	49,673	14,490	12,712	1,784	2,960	9,917	4,650	1,414	1,703
Complications of pregnancy & delivery	49,179			166	3,381	44,872	566		
Contusions of lower limb	49,105	2,287	8,574	3,065	6,589	15,126	7,699	2,408	3,343
Contusions of upper limb	47,944	2,560	12,553	3,157	6,930	13,129	6,046	1,656	1,890
Unspecified musculoskeletal disorders of the back	46,994	114	651	532	3,388	18,520	14,670	4,677	4,433
Diseases of female genital organs & breast disorders	45,101	295	756	794	4,447	30,597	6,119	998	1,087
Urinary tract infection	43,468	2,513	1,623	715	2,798	8,105	7,673	6,198	13,838
Head & neck symptoms	42,817	1,201	4,468	1,738	3,781	16,045	8,720	3,306	3,548
Digestive symptoms	40,544	11,989	4,886	1,072	2,263	8,054	4,877	2,690	4,704
Upper respiratory tract infections	37,375	11,358	4,264	1,280	3,457	11,239	3,738	1,028	995
Infections of skin and subcutaneous tissue	34,890	2,646	2,489	1,234	3,279	10,106	7,696	3,154	4,278
Sprains and strains of joints and adjacent muscles	34,578	463	3,512	2,188	5,359	15,159	6,068	1,182	631
Open wound & injury of upper limb	34,279	1,958	3,855	1,896	4,187	13,984	6,103	1,356	911
Pneumonia	33,451	8,386	2,869	418	739	3,778	4,165	3,288	9,803
Unspecified musculoskeletal disorders excluding the back	32,151	2,701	3,325	921	2,484	8,683	7,695	3,124	3,210
Other unspecified disorders of the eye and adnexa	32,022	1,967	2,652	820	2,681	9,482	7,860	3,470	3,077
Noninfectious enteritis and colitis	31,111	8,292	2,712	926	3,054	8,935	3,345	1,547	2,293
Fracture of lower limb	30,646	1,629	4,039	1,239	1,907	6,992	5,966	2,674	6,186
Urinary symptoms	30,389	258	336	296	1,397	13,259	10,090	2,600	2,133
Vehicle accidents	29,759	1,029	2,304	1,252	3,767	14,607	5,419	966	399
Diseases of musculoskeletal system	28,177	1,346	1,820	573	2,037	8,795	7,906	2,809	2,883
Contusions of trunk	27,898	308	2,086	873	3,484	10,697	5,901	1,997	2,538
Other diseases of intestines and peritoneum	27,694	2,018	1,632	625	1,687	7,180	6,196	3,023	5,324
Diseases of the ear and mastoid process	27,355	2,478	2,265	754	2,281	8,862	6,107	2,530	2,072
Syncope & collapse	25,504	215	1,550	1,287	2,624	5,960	4,949	3,090	5,815
Malaise & fatigue	24,515	359	239	193	1,006	4,904	5,307	3,622	8,862
Foreign body on external eye	22,131	473	1,324	719	1,912	11,593	5,195	674	231
Viral infections, non-specific	21,292	9,660	2,512	540	1,382	4,046	1,649	625	871
Dizziness & giddiness	20,325	58	324	321	942	5,159	5,972	3,311	4,230
Factors influencing health status & contact with health services	19,543	1,199	1,160	494	1,663	7,846	3,409	1,566	2,180
Diseases of skin	18,305	2,669	1,814	551	1,615	5,120	3,315	1,337	1,876

ביקורים לפי אבחנות וגיל, 2015 - מספרים מוחלטים (המשך)

אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
Other specified disorders of the eye and adnexa	17,832	1,781	1,434	382	1,057	4,358	4,053	2,249	2,508
Dysrhythmia	17,762	107	113	74	129	1,330	4,483	4,277	7,247
Conjunctival disorders (conjunctivitis)	17,101	1,483	1,291	417	2,569	5,580	3,472	1,344	933
Accidental falls	16,343	2,476	1,816	453	862	2,652	2,160	1,477	4,440
Diseases of male genital organs	16,328	1,193	3,032	776	2,361	4,084	2,037	1,200	1,641
Other and unspecified effects of external causes	15,964	2,079	1,505	565	1,498	5,020	2,766	1,144	1,375
Anemia	15,620	711	457	236	374	2,500	2,571	2,236	6,533
Nutrition, metabolic & immune disorders	15,186	1,117	522	199	387	2,016	3,077	2,253	5,609
Hypertensive disease	14,384	36	32	35	125	1,172	4,342	3,314	5,323
Contusions of face & eye	13,875	1,643	2,317	565	1,533	4,569	2,021	530	687
Open wound & injury of lower limb	13,796	907	3,821	987	1,401	3,866	1,704	505	593
Skin symptoms	13,561	2,735	846	217	713	2,827	2,497	1,508	2,215
Other central nervous system diseases & disorders	12,724	859	806	276	493	3,372	3,125	1,679	2,110
Cardiovascular system symptoms	12,692	593	604	268	660	3,519	3,189	1,725	2,129
Acute bronchitis	12,424	5,079	104	39	397	1,860	2,054	1,055	1,833
Otitis media	12,236	7,995	1,107	190	432	1,549	639	186	135
Other neurotic, personality & other nonpsychotic mental disorders	11,916	153	875	687	2,049	4,653	2,447	562	458
Bronchitis & asthma	11,023	1,555	1,494	339	946	2,422	2,202	971	1,091
Intestinal infectious diseases	10,933	3,227	1,382	424	1,327	2,928	920	344	380
Diseases of oral cavity	10,723	1,893	1,194	347	796	3,711	1,830	505	446
Rheumatism, excluding the back	10,679	613	650	242	638	2,961	2,968	1,081	1,524
Convulsions	10,610	4,137	1,842	435	451	1,602	1,096	456	586
Foreign body in ear, nose & throat	9,528	2,457	1,783	359	490	2,238	1,425	465	309
Neoplasms	9,302	189	197	70	154	1,409	3,024	2,083	2,175
Dislocation	9,143	3,181	558	429	963	2,132	899	459	514
Heart failure	9,131	24	5		4	137	1,299	1,972	5,688
Ischemic heart disease	8,718	5	2	3	12	517	3,481	2,077	2,621
Injuries caused by animals & plants	8,597	754	1,672	434	1,168	2,859	1,191	317	197
Other diseases of respiratory system	8,488	1,590	418	227	358	1,865	1,213	730	2,068
Burns	8,183	1,793	961	307	1,073	2,517	1,103	242	177
Chronic obstructive pulmonary disease	8,053	17	2	4	11	242	2,650	2,275	2,851
Psychotic disorders	7,639	39	84	89	395	2,381	1,752	864	2,025
Renal failure	7,558	30	57	42	93	618	1,572	1,604	3,540
Diseases of the external ear	7,513	488	1,186	272	730	2,588	1,493	414	339
Other cerebrovascular disease	7,465		5	5	9	306	2,065	1,832	3,242
Diabetes mellitus	7,420	64	500	198	192	1,133	2,341	1,353	1,635
High risk pregnancy	6,887			14	394	6,428	50		
Drug & alcohol abuse	6,846	38	143	488	940	2,948	1,794	247	89
Central nervous system pain	6,359	77	397	182	751	2,669	1,459	438	386
Other disease of blood & blood forming organs	6,274	1,547	1,152	235	222	995	869	522	730
Gastrointestinal hemorrhage	6,248	259	104	79	237	954	1,363	1,115	2,137
Conditions originating in the perinatal period	6,119	6,119							

ביקורים לפי אבחנות וגיל, 2015 - מספרים מוחלטים (המשך)

אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
Accidents	6,070	532	471	209	594	2,714	991	213	337
Hernia of abdominal cavity	5,852	847	162	48	216	1,365	1,325	757	1,130
Anxiety disorders	5,788	7	191	293	764	2,787	1,268	272	203
Appendicitis	5,604	102	1,292	379	651	2,192	664	187	137
Heart diseases specified	5,510	164	182	114	164	996	1,380	952	1,558
Diseases of veins and lymphatics	5,466	20	52	50	221	1,304	1,533	938	1,347
Other diseases of digestive system	5,421	64	86	45	107	1,268	1,643	884	1,323
Viral infections, specific	5,000	774	355	130	433	1,320	920	477	588
Stroke	4,852	15	17	8	24	287	1,321	1,218	1,959
Infections of kidney	4,782	1,240	419	132	434	1,359	666	226	306
Cholelithiasis	4,745		6	28	145	1,639	1,320	584	1,019
Retinal detachment	4,741	11	57	30	75	565	2,175	1,122	706
Other diseases of kidney & ureter	4,531	212	314	111	249	1,600	1,291	399	355
Complications of surgical and medical care, not elsewhere classified	4,486	253	177	59	195	1,203	1,203	674	718
Keratitis	4,394	51	122	133	594	2,146	892	225	230
Diseases of esophagus, stomach & duodenum	4,371	503	114	117	325	1,497	1,073	362	378
Fracture of spine and trunk	4,231	36	75	72	130	722	979	653	1,560
Disorders of the peripheral nervous system	4,148	80	278	117	192	1,367	1,211	508	394
Hemorrhoids	4,036	8	10	30	400	2,081	948	261	297
Acute myocardial infarction	3,815				4	243	1,626	842	1,095
TIA	3,740				4	248	1,198	901	1,386
Epilepsy	3,693	217	382	178	414	1,375	732	212	176
Late effects of vehicle accidents	3,269	17	61	90	471	1,873	612	119	25
Pulmonary edema	3,235				5	29	463	646	2,088
Poisoning	3,163	991	325	252	293	753	336	93	111
Homicide & injury purposely inflicted by others	3,124	11	182	240	459	1,557	555	75	26
Late effects of cerebrovascular disease	3,089	18	39	15	84	725	1,108	539	559
Fracture of skull	3,076	269	449	248	369	943	350	151	292
Effects of foreign body entering through other orifice	3,008	920	732	206	181	560	252	88	69
Pleurisy	2,943	13	8	5	17	187	691	607	1,415
Suicide & self-inflicted injury	2,848		99	190	721	1,115	464	122	112
Disorders of thyroid, parathyroid & other endocrine	2,390	157	142	71	103	963	400	217	336
Other disorders of pancreatic secretion	2,339	197	68	24	62	287	492	467	740
Other infections	2,207	370	166	44	289	674	347	111	205
Other diseases of circulatory system	2,165	27	22	13	53	354	639	431	624
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries	2,131	26	23	16	24	200	613	495	733
Sepsis	1,999	32	11	3	13	97	273	316	1,254
Congenital anomalies	1,950	596	186	48	141	416	268	125	170
Metabolic symptoms	1,699	457	78	69	54	177	290	232	342
General medical examination	1,232	24	90	57	209	450	238	68	95
Other bacterial infections	1,054	223	111	22	39	221	204	110	123

סה"כ כולל גיל לא ידוע.

ביקורים לפי אבחנות וגיל, 2014 - אחוזים

אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
סה"כ ביקורים עם קידוד אבחנות	100%	10%	8%	3%	7%	35%	17%	8%	12%
Normal delivery & pregnancy	100%			0%	6%	93%	0%		
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	100%	15%	10%	4%	7%	26%	18%	8%	13%
Abdominal & pelvic symptoms	100%	2%	10%	5%	9%	40%	18%	7%	8%
Chest pain	100%	0%	2%	1%	3%	26%	37%	15%	16%
Fever	100%	45%	8%	1%	2%	11%	10%	7%	16%
Other injuries	100%	20%	16%	4%	8%	23%	11%	6%	13%
Examination for suspected conditions not found	100%	11%	8%	3%	8%	39%	16%	6%	8%
Respiratory symptoms	100%	18%	4%	1%	3%	14%	19%	14%	28%
Fracture of upper limb	100%	8%	33%	5%	7%	19%	14%	6%	8%
Open wound & injury of head, neck & trunk	100%	29%	26%	4%	6%	20%	9%	3%	3%
Complications of pregnancy & delivery	100%			0%	7%	91%	1%		
Contusions of lower limb	100%	5%	17%	6%	13%	31%	16%	5%	7%
Contusions of upper limb	100%	5%	26%	7%	14%	27%	13%	3%	4%
Unspecified musculoskeletal disorders of the back	100%	0%	1%	1%	7%	39%	31%	10%	9%
Diseases of female genital organs & breast disorders	100%	1%	2%	2%	10%	68%	14%	2%	2%
Urinary tract infection	100%	6%	4%	2%	6%	19%	18%	14%	32%
Head & neck symptoms	100%	3%	10%	4%	9%	37%	20%	8%	8%
Digestive symptoms	100%	30%	12%	3%	6%	20%	12%	7%	12%
Upper respiratory tract infections	100%	30%	11%	3%	9%	30%	10%	3%	3%
Infections of skin and subcutaneous tissue	100%	8%	7%	4%	9%	29%	22%	9%	12%
Sprains and strains of joints and adjacent muscles	100%	1%	10%	6%	15%	44%	18%	3%	2%
Open wound & injury of upper limb	100%	6%	11%	6%	12%	41%	18%	4%	3%
Pneumonia	100%	25%	9%	1%	2%	11%	12%	10%	29%
Unspecified musculoskeletal disorders excluding the back	100%	8%	10%	3%	8%	27%	24%	10%	10%
Other unspecified disorders of the eye and adnexa	100%	6%	8%	3%	8%	30%	25%	11%	10%
Noninfectious enteritis and colitis	100%	27%	9%	3%	10%	29%	11%	5%	7%
Fracture of lower limb	100%	5%	13%	4%	6%	23%	19%	9%	20%
Urinary symptoms	100%	1%	1%	1%	5%	44%	33%	9%	7%
Vehicle accidents	100%	3%	8%	4%	13%	49%	18%	3%	1%
Diseases of musculoskeletal system	100%	5%	6%	2%	7%	31%	28%	10%	10%
Contusions of trunk	100%	1%	7%	3%	12%	38%	21%	7%	9%
Other diseases of intestines and peritoneum	100%	7%	6%	2%	6%	26%	22%	11%	19%
Diseases of the ear and mastoid process	100%	9%	8%	3%	8%	32%	22%	9%	8%
Syncope & collapse	100%	1%	6%	5%	10%	23%	19%	12%	23%
Malaise & fatigue	100%	1%	1%	1%	4%	20%	22%	15%	36%
Foreign body on external eye	100%	2%	6%	3%	9%	52%	23%	3%	1%
Viral infections, non-specific	100%	45%	12%	3%	6%	19%	8%	3%	4%
Dizziness & giddiness	100%	0%	2%	2%	5%	25%	29%	16%	21%
Factors influencing health status & contact with health services	100%	6%	6%	3%	9%	40%	17%	8%	11%
Diseases of skin	100%	15%	10%	3%	9%	28%	18%	7%	10%

ביקורים לפי אבחנות וגיל, 2015 - אחוזים (המשך)

אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
Other specified disorders of the eye and adnexa	100%	10%	8%	2%	6%	24%	23%	13%	14%
Dysrhythmia	100%	1%	1%	0%	1%	7%	25%	24%	41%
Conjunctival disorders (conjunctivitis)	100%	9%	8%	2%	15%	33%	20%	8%	5%
Accidental falls	100%	15%	11%	3%	5%	16%	13%	9%	27%
Diseases of male genital organs	100%	7%	19%	5%	14%	25%	12%	7%	10%
Other and unspecified effects of external causes	100%	13%	9%	4%	9%	31%	17%	7%	9%
Anemia	100%	5%	3%	2%	2%	16%	16%	14%	42%
Nutrition, metabolic & immune disorders	100%	7%	3%	1%	3%	13%	20%	15%	37%
Hypertensive disease	100%	0%	0%	0%	1%	8%	30%	23%	37%
Contusions of face & eye	100%	12%	17%	4%	11%	33%	15%	4%	5%
Open wound & injury of lower limb	100%	7%	28%	7%	10%	28%	12%	4%	4%
Skin symptoms	100%	20%	6%	2%	5%	21%	18%	11%	16%
Other central nervous system diseases & disorders	100%	7%	6%	2%	4%	27%	25%	13%	17%
Cardiovascular system symptoms	100%	5%	5%	2%	5%	28%	25%	14%	17%
Acute bronchitis	100%	41%	1%	0%	3%	15%	17%	8%	15%
Otitis media	100%	65%	9%	2%	4%	13%	5%	2%	1%
Other neurotic, personality & other nonpsychotic mental disorders	100%	1%	7%	6%	17%	39%	21%	5%	4%
Bronchitis & asthma	100%	14%	14%	3%	9%	22%	20%	9%	10%
Intestinal infectious diseases	100%	30%	13%	4%	12%	27%	8%	3%	3%
Diseases of oral cavity	100%	18%	11%	3%	7%	35%	17%	5%	4%
Rheumatism, excluding the back	100%	6%	6%	2%	6%	28%	28%	10%	14%
Convulsions	100%	39%	17%	4%	4%	15%	10%	4%	6%
Foreign body in ear, nose & throat	100%	26%	19%	4%	5%	23%	15%	5%	3%
Neoplasms	100%	2%	2%	1%	2%	15%	33%	22%	23%
Dislocation	100%	35%	6%	5%	11%	23%	10%	5%	6%
Heart failure	100%	0%	0%	0%	0%	2%	14%	22%	62%
Ischemic heart disease	100%	0%	0%	0%	0%	6%	40%	24%	30%
Injuries caused by animals & plants	100%	9%	19%	5%	14%	33%	14%	4%	2%
Other diseases of respiratory system	100%	19%	5%	3%	4%	22%	14%	9%	24%
Burns	100%	22%	12%	4%	13%	31%	13%	3%	2%
Chronic obstructive pulmonary disease	100%	0%	0%	0%	0%	3%	33%	28%	35%
Psychotic disorders	100%	1%	1%	1%	5%	31%	23%	11%	27%
Renal failure	100%	0%	1%	1%	1%	8%	21%	21%	47%
Diseases of the external ear	100%	6%	16%	4%	10%	34%	20%	6%	5%
Other cerebrovascular disease	100%	0%	0%	0%	0%	4%	28%	25%	43%
Diabetes mellitus	100%	1%	7%	3%	3%	15%	32%	18%	22%
High risk pregnancy	100%			0%	6%	93%	1%		
Drug & alcohol abuse	100%	1%	2%	7%	14%	43%	26%	4%	1%
Central nervous system pain	100%	1%	6%	3%	12%	42%	23%	7%	6%
Other disease of blood & blood forming organs	100%	25%	18%	4%	4%	16%	14%	8%	12%
Gastrointestinal hemorrhage	100%	4%	2%	1%	4%	15%	22%	18%	34%
Conditions originating in the perinatal period	100%	100%							

ביקורים לפי אבחנות וגיל, 2015 - אחוזים (המשך)


אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
Accidents	100%	9%	8%	3%	10%	45%	16%	4%	6%
Hernia of abdominal cavity	100%	14%	3%	1%	4%	23%	23%	13%	19%
Anxiety disorders	100%	0%	3%	5%	13%	48%	22%	5%	4%
Appendicitis	100%	2%	23%	7%	12%	39%	12%	3%	2%
Heart diseases specified	100%	3%	3%	2%	3%	18%	25%	17%	28%
Diseases of veins and lymphatics	100%	0%	1%	1%	4%	24%	28%	17%	25%
Other diseases of digestive system	100%	1%	2%	1%	2%	23%	30%	16%	24%
Viral infections, specific	100%	15%	7%	3%	9%	26%	18%	10%	12%
Stroke	100%	0%	0%	0%	0%	6%	27%	25%	40%
Infections of kidney	100%	26%	9%	3%	9%	28%	14%	5%	6%
Cholelithiasis	100%		0%	1%	3%	35%	28%	12%	21%
Retinal detachment	100%	0%	1%	1%	2%	12%	46%	24%	15%
Other diseases of kidney & ureter	100%	5%	7%	2%	5%	35%	28%	9%	8%
Complications of surgical and medical care, not elsewhere classified	100%	6%	4%	1%	4%	27%	27%	15%	16%
Keratitis	100%	1%	3%	3%	14%	49%	20%	5%	5%
Diseases of esophagus, stomach & duodenum	100%	12%	3%	3%	7%	34%	25%	8%	9%
Fracture of spine and trunk	100%	1%	2%	2%	3%	17%	23%	15%	37%
Disorders of the peripheral nervous system	100%	2%	7%	3%	5%	33%	29%	12%	9%
Hemorrhoids	100%	0%	0%	1%	10%	52%	23%	6%	7%
Acute myocardial infarction	100%				0%	6%	43%	22%	29%
TIA	100%				0%	7%	32%	24%	37%
Epilepsy	100%	6%	10%	5%	11%	37%	20%	6%	5%
Late effects of vehicle accidents	100%	1%	2%	3%	14%	57%	19%	4%	1%
Pulmonary edema	100%				0%	1%	14%	20%	65%
Poisoning	100%	31%	10%	8%	9%	24%	11%	3%	4%
Homicide & injury purposely inflicted by others	100%	0%	6%	8%	15%	50%	18%	2%	1%
Late effects of cerebrovascular disease	100%	1%	1%	0%	3%	23%	36%	17%	18%
Fracture of skull	100%	9%	15%	8%	12%	31%	11%	5%	9%
Effects of foreign body entering through other orifice	100%	31%	24%	7%	6%	19%	8%	3%	2%
Pleurisy	100%	0%	0%	0%	1%	6%	23%	21%	48%
Suicide & self-inflicted injury	100%		3%	7%	25%	39%	16%	4%	4%
Disorders of thyroid, parathyroid & other endocrine	100%	7%	6%	3%	4%	40%	17%	9%	14%
Other disorders of pancreatic secretion	100%	8%	3%	1%	3%	12%	21%	20%	32%
Other infections	100%	17%	8%	2%	13%	31%	16%	5%	9%
Other diseases of circulatory system	100%	1%	1%	1%	2%	16%	30%	20%	29%
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries	100%	1%	1%	1%	1%	9%	29%	23%	34%
Sepsis	100%	2%	1%	0%	1%	5%	14%	16%	63%
Congenital anomalies	100%	31%	10%	2%	7%	21%	14%	6%	9%
Metabolic symptoms	100%	27%	5%	4%	3%	10%	17%	14%	20%
General medical examination	100%	2%	7%	5%	17%	37%	19%	6%	8%
Other bacterial infections	100%	21%	11%	2%	4%	21%	19%	10%	12%

סה"כ כולל גיל לא ידוע


13.3 אבחנות שכיחות לפי בית חולים

בפרק זה מוצגות 20 האבחנות השכיחות שנרשמו במלר"ד בשנת 2015 לפי בית חולים. התפלגות האבחנות השכיחות במלר"ד שונה בין בתי החולים ותלויה, בין היתר, באחוז הביקורים עם רישום של קודי אבחנות לא מוגדרות וכן קודי אבחנות של הריון ולידה. אבחנה של סימפטומים כלליים (Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings) נרשמה ל-6.7% מהביקורים במלר"ד בשנת 2015, כאשר אחוז גבוה נמצא בבתי החולים ברזילי (23.9%), המשפחה הקדושה (23.1%), בני ציון (15.3%), שניידר (14.2%), לניאדו (12%), מאיר (11.5%), שערי צדק (10.2%), שיבא (9.1%), המרכזי בעמק (8.6%), יוספטל (8%) והסקוטי (7.1%). אחוז הביקורים עם אבחנה של סימפטומים כלליים נמוך בוולפסון, רבין ק. בילינסון, קפלן, הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים, סנט וינסנט ומעייני הישועה. בחלק מבתי החולים נפוץ השימוש באבחנה כללית נוספת, בדיקת חשד למצבים שלא אומתו (Examination for suspected conditions not found). בסוראסקי זוהי האבחנה השכיחה ביותר, 9.5% מכלל הביקורים, האבחנה שכיחה גם בהלל יפה וכרמל (5%), נהריה (4%) ופוריה (3%). אבחנות הריון ולידה נרשמות בשכיחות גבוהה במרבית בתי החולים, פרט לסוראסקי, סורוקה, השרון ק. גולדה ושערי צדק, בהם נרשמת אבחנה אחרת במלר"ד יולדות.


שיבא




רמב"ם




אסף הרופא




וולפסון




רביקה זיו




הלל יפה




נהריה




ברזיל




פוריה




מוראסקי




בני ציון




רבין ק. ביילינסון




סרוקה




מאיר




קפל




המרכזי בעמק




הכרמל




השרון ק. גולדה




יוספטל




שניידר




הדסה עין כרם




הדסה הר הצופים




הסקוטי




גנט וינסנט




המשפחה הקדושה




לניאדו



שערי צדק



מעייני הישועה



13.4 מדדי פעילות במלר"ד - 15 האבחנות עם השכיחות הגבוהה והנמוכה

הביקורים במחלקות לרפואה דחופה מוצגים בהתאם לאבחנות עם הדירוג הגבוה והאבחנות עם הדירוג הנמוך ביותר בכל מדד, על פי מדדי הפעילות הבאים:


- אחוז אשפוזים
- אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים מהשחרור
- אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות מהשחרור
- אחוז ביקורים עם הפנייה רפואית
- חציון שהיה
- חציון שהיה למטופלים שאושפזו

אחוז האשפוזים, אחוז הביקורים החוזרים, אחוז הביקורים עם הפניה רפואית וחציון שהיה, מוצגים ל-15 האבחנות עם הדירוג הגבוה ו-15 האבחנות עם הדירוג הנמוך.


אחוז האשפוזים

אחוז אשפוזים גבוה נרשם לביקורים עם אבחנה של אלח דם, דלקת תוספתן, אוטם שריר הלב, בצקת ריאות, מחלות כלי דם במוח, מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, שבץ מוחי, אירוע איסכמי חולף, מחלות במערכת העיכול, פלאוריטיס, אי ספיקת כליות, מחלת ריאות חסימתית כרונית, אנמיה ודימום במערכת העיכול. אחוז אשפוזים נמוך נרשם לביקורים לאחר תאונות דרכים, ביקורים עם גוף זר בעין, אף, אוזן או גרון, הפרעות חרדה, דלקת בלחמית, וכן פציעות, חבלות, פריקות, נקעים, ופציעות שנגרמו על ידי בעלי חיים.

אבחנות עם אחוז אשפוזים גבוה, 2015




אבחנות עם אחוז אשפוזים נמוך, 2015



אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים

אחוז גבוה של ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים נרשם לביקורים של נשים בהריון בסיכון גבוה, נשים בהריון לקראת לידה, סיבוכים של הריון ולידה, פלאוריטיס, שאתות, בצקת ריאות, מחלת ריאות חסימתית כרונית, אי ספיקת לב, אנמיה, מחלות דם וכלי דם, מחלות אנדוקריניות, אי ספיקת כליות, סימפטומים בדרכי השתן והפרעות פסיכוטיות. אחוז נמוך של ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים נרשם לביקורים עם גוף זר בעין, אף, אוזן או גרון, תאונות, הרעלות, תאונות דרכים, פציעות, חבלות, נקעים, ופציעות שנגרמו על ידי בעלי חיים.

אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים גבוה, 2015




אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים נמוך, 2015




אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות

אחוז גבוה של ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות נרשם לביקורים עם אבחנה של מחלות כלי דם במוח, הריון ולידה, זיהומים בכליות, הריון בסיכון גבוה, מחלת לב איסכמית, מצבים שמקורם בזמן הלידה, סיבוכים של הריון ולידה, מחלות במערכת העיכול, אירוע איסכמי חולף, סימפטומים במערכת השתן, מחלות כלי דם, בצקת ריאות, שימוש באלכוהול וסמים, מחלת ריאות חסימתית כרונית ושאתות. אחוז נמוך של ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות נרשם לביקורים עם אבחנה של סחרחורת, מחלות של מערכת השריר והשלד, כאבים בחזה, גוף זר באוזן, אף או גרון, תאונות דרכים, דלקת בלחמית, השפעות מאוחרות של מחלות כלי דם במוח, פציעות, חבלות ונקעים.

אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות גבוה, 2015




אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות נמוך, 2015




אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות

אחוז גבוה של ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות נרשם לביקורים עם אבחנה של הריון ולידה, הריון בסיכון גבוה, מחלות כלי דם במוח, מצבים שמקורם בזמן הלידה, זיהומים בכליות, סיבוכים של הריון ולידה, מחלת לב איסכמית, סימפטומים במערכת השתן, מחלות במערכת העיכול, מחלות כלי דם, מחלת ריאות חסימתית כרונית, אבנים בדרכי המרה, אירוע איסכמי חולף, פלאוריטיס ובצקת ריאות. אחוז נמוך של ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות נרשם לביקורים עם אבחנה של כאבים בחזה, גוף זר בעין, אוזן, אף או גרון, תאונות, דלקת בלחמית, השפעות מאוחרות של מחלות כלי דם במוח, תאונות דרכים, פציעות, חבלות ונקעים שונים.

אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות גבוה, 2015




אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות נמוך, 2015




אחוז ביקורים עם הפניה רפואית

אחוז גבוה של ביקורים עם הפניה רפואית נרשם במחלות ורידים ומערכת הלימפה, אלח דם, דלקת תוספתן, זיהומי עור והרקמות הרכות, אנמיה, הפרעות קצב, סימפטומים מטבוליים, מחלות כלי דם, היפרדות רשתית, ברונכיטיס, דלקת ריאות, זיהומים בכליות, סימפטומים עוריים והפרעות במערכת העצבים הפריפריית. אחוז נמוך של ביקורים עם הפניה רפואית נרשם להפרעות פסיכיאטריות, גוף זר בעין, הפרעות חרדה, סיבוכים של הריון ולידה, פגיעות מכוונות, כוויות, תאונות, תאונות דרכים, בדיקות רפואיות כלליות, הריון בסיכון גבוה, הריון ולידה, וכן פציעות, חבלות, פריקות ונקעים שונים.

אבחנות עם אחוז הפניה רפואית גבוה, 2015




אבחנות עם אחוז הפניה רפואית נמוך, 2015




חציון שהיה

חציון שהיה גבוה נרשם לפונים במצבים הדורשים בירור, השגחה או יעוץ נוסף - דלקת תוספתן, אי ספיקת כליות, מחלות במערכת העיכול, אירוע איסכמי חולף, מחלות כלי דם במוח, מחלות במערכת העצבים המרכזית, אבנים בדרכי המרה, אפילפסיה, מחלות מטבוליות, שבר בעמוד שדרה וגו, סוכרת, סחרחורת, פגיעה עצמית ושימוש באלכוהול וסמים. חציון שהיה נמוך נרשם לביקורים עם גוף זר בעין, אף, אוזן או גרון, מחלות עיניים ואוזניים, כוויות, דלקת בלחמית, דלקת בקרנית, פציעות, חבלות, פריקות ונקעים שונים, וכן פציעות שנגרמו על ידי בעלי חיים.

אבחנות עם חציון שהיה גבוה, 2015




אבחנות עם חציון שהיה נמוך, 2015



חציון שהיה למטופלים שאושפזו

חציון השהיה במלר"ד למטופלים שאושפזו גבוה יותר מאלו ששוחררו לביתם. חציון שהיה גבוה נרשם למטופלים שאושפזו עם השפעות מאוחרות של מחלות כלי דם במוח, דלקת תוספתן, יתר לחץ דם, תאונות דרכים, שימוש באלכוהול וסמים, סימפטומים של ראש וצוואר, שברים בעמוד שדרה וגו, מחלות במערכת העצבים המרכזית והפריפרית, סחרחורת, נפילות, סימפטומים של בטן ואגן, אבנים בדרכי המרה, אי ספיקת כליות ומחלות במערכת העיכול. חציון שהיה נמוך במלר"ד נרשם למטופלים עם זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, מחלות אוזניים, מצבים שמקורם בזמן הלידה, גוף זר בעין, אוזן, אף או גרון, הפרדות רשתית, דלקת בלחמית, דלקת בקרנית ומחלות עיניים אחרות, אוטם שריר הלב, כוויה, תוריון ולידה, סיבוכים של הריון ולידה, פציעות, חבלות שנגרמו על ידי בעלי חיים.

חציון שהיה גבוה למטופלים שאושפזו, 2015



חציון שהיה נמוך למטופלים שאושפזו, 2015



13.5 מדדי הפעילות במלר"ד - לפי קבוצות אבחנות

האבחנות השכיחות במחלקות לרפואה דחופה קובצו לפי מערכות הגוף ו/או לפי סוגי המחלות, חלק מהאבחנות מוצגות בשתי קבוצות שונות, לפי מערכת הגוף או לפי האטיולוגיה:

- מחלות זיהומיות וטפיליות
- שאתות
- מחלות אנדוקריניות, מטבוליות והמטולוגיות
- הפרעות נפשיות והתנהגותיות
- מחלות והפרעות במערכת העצבים
- מחלות עיניים
- מחלות אף אוזן וגרון
- מחלות במחזור הדם
- מחלות מערכת הנשימה
- מחלות מערכת העיכול
- מחלות מערכת המין והשתן
- הריון ולידה
- מחלות עור
- מחלות מערכת השרירים והשלד
- מומים מולדים
- סימפטומים ומצבים בלתי מוגדרים
- פציעות והרעלות

לכל קבוצת אבחנות מוצגים מדדי הפעילות הבאים: מספר ביקורים, אחוז אשפוזים, אחוז ביקורים עם הפניה רפואית, אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים, אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות, חציון שהיה למטופלים שאושפזו וחציון שהיה למטופלים ששוחררו לביתם.

מחלות זיהומיות וטפיליות

קבוצה זו כוללת מספר מחלות זיהומיות בדרגות חומרה שונות, כולל חום למרות שיתכן ואינו ממקור זיהומי. רישום חום ללא ציון הגורם הינה תופעה שכיחה, שאינה מאפשרת לאפיין את סוג המחלה. אחוז אשפוזים גבוה נרשם למטופלים שאובחנו עם אלח דם (96%), דלקת ריאות (60%), זיהומים בכליות (56%), חום (47%) וזיהומים בקטריאליים אחרים (52%), כאשר גם משך השהיה של מטופלים עם אבחנות אלו ארוך יותר בהשוואה לזיהומים אחרים כגון דלקת בלחמית, דלקת אוזניים וזיהומים בדרכי הנשימה העליונות. מעל שני שליש מהפונים שנרשמה להם אבחנה הכלולה בקבוצה זו הגיעו עם הפניה רפואית. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 13%-25%, האחוז גבוה במיוחד לפונים עם זיהום בדרכי השתן (25%), אלח דם (20%) וחום (19%). אחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות גבוה לפונים עם זיהומים בכליות (18%).

מחלות זיהומיות וטפיליות - Infectious and parasitic diseases

אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהי (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Fever	78,025	47%	73%	19%	8%	3.37	3.50	3.28
Urinary tract infection	43,468	36%	70%	25%	8%	3.70	4.20	3.47
Upper respiratory tract infections	37,375	18%	72%	14%	5%	2.75	2.58	2.78
Infections of skin and subcutaneous tissue	34,890	34%	81%	17%	5%	2.78	3.58	2.48
Pneumonia	33,451	60%	77%	18%	7%	3.55	3.70	3.38
Viral infections, non-specific	21,292	11%	70%	16%	5%	3.12	3.95	3.05
Conjunctival disorders (conjunctivitis)	17,101	1%	73%	13%	3%	1.30	2.17	1.28
Acute bronchitis	12,424	34%	78%	17%	5%	3.20	2.90	3.30
Otitis media	12,236	10%	75%	15%	5%	2.23	2.67	2.18
Intestinal infectious diseases	10,933	19%	68%	14%	5%	3.38	3.77	3.33
Viral infections, specific	5,000	27%	76%	17%	6%	3.22	4.67	2.85
Infections of kidney	4,782	56%	77%	21%	18%	3.98	3.98	3.95
Other infections	2,207	24%	71%	18%	5%	2.78	4.22	2.45
Sepsis	1,999	96%	82%	20%		3.75	3.70	4.57
Other bacterial infections	1,054	52%	73%	16%	5%	3.17	3.40	2.92

שאתות

כמחצית (54%) החולים האונקולוגיים שטופלו במחלקות לרפואה דחופה אושפזו, חציון השהיה שלהם (3.87 שעות) גבוה יחסית. כשני שלישי מהחולים הגיעו עם הפניה רפואית, כשליש היו ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים וכעשירית היו ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות.

שאתות - Neoplasms								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Neoplasms	9,302	54%	63%	31%	9%	3.87	4.47	3.45

מחלות אנדוקריניות, מטבוליות והמטולוגיות

אחוז האשפוזים של מטופלים עם מחלות אנדוקריניות, מטבוליות והמטולוגיות גבוה יחסית, ונע בין 33%-79%, האחוז גבוה במיוחד למטופלים עם אי ספיקת כליות (79%). מרבית המטופלים שנרשמה להם אחת האבחנות בקבוצה הופנו ע"י רופא. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 23%-30%, גבוה יחסית לפונים עם אנמיה (30%). חציון השהיה גבוה במיוחד לחולים עם אי ספיקת כליות (4.85 שעות).

מחלות אנדוקריניות, מטבוליות והמטולוגיות - Endocrine, metabolic & hematologic diseases								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Anemia	15,620	67%	80%	30%	6%	3.50	3.50	3.50
Nutrition, metabolic & immune disorders	15,186	59%	75%	24%	5%	4.27	4.38	4.15
Renal failure	7,558	79%	76%	27%	8%	4.85	4.88	4.68
Diabetes mellitus	7,420	53%	76%	23%	7%	4.25	4.33	4.18
Other disease of blood & blood forming organs	6,274	44%	70%	28%	9%	3.45	3.65	3.32
Disorders of thyroid, parathyroid & other endocrine	2,390	33%	71%	28%	9%	3.52	3.88	3.40
Metabolic symptoms	1,699	60%	80%	24%	6%	3.58	3.63	3.56

הפרעות נפשיות והתנהגותיות

מטופלים עם הפרעות נפשיות והתנהגותיות שהגיעו למלר"ד בבתי חולים כלליים מאופיינים עם אחוז אשפוזים נמוך, פרט למטופלים שהגיעו במצב פסיכוטי, להם נרשם אחוז האשפוזים גבוה (46%) וגם משך שהיה גבוה (3.95 שעות). משך שהיה גבוה נרשם גם למטופלים עם שימוש בסמים ואלכוהול (4.13).

Mental and behavioral disorders - הפרעות נפשיות והתנהגותיות								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Other neurotic, personality & other nonpsychotic mental disorders	11,916	15%	59%	24%	8%	3.08	3.38	3.05
Psychotic disorders	7,639	46%	62%	26%	9%	3.95	4.43	3.63
Drug & alcohol abuse	6,844	16%	65%	24%	9%	4.13	5.18	3.98
Anxiety disorders	5,788	4%	56%	20%	5%	2.83	3.73	2.82

מחלות והפרעות במערכת העצבים

מטופלים עם מחלות במערכת העצבים מאופיינים בחציון שהיה ובאחוז אשפוזים גבוה. כשלושה רבעים מהמטופלים הגיעו עם הפניית רופא. אחוז האשפוזים גבוה למטופלים עם אירוע איסכמי חולף (85%), שבץ מוחי (86%) ומחלות כלי דם במוח (91%). אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 13%-24% וגבוה למבקרים עם אפילפסיה (24%) ושבץ מוחי (21%). אחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות גבוה לפונים עם מחלות כלי דם במוח (20%) ואירוע איסכמי חולף (10%).

Nervous system diseases & disorders - מחלות והפרעות מערכת העצבים								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Other central nervous system diseases & disorders	12,724	53%	75%	19%	7%	4.60	5.03	4.27
Other cerebrovascular disease	7,465	91%	74%	17%	20%	4.27	4.23	4.50
Central nervous system pain	6,359	11%	70%	18%	4%	3.38	4.50	3.27
Stroke	4,852	86%	73%	21%		3.98	3.97	4.09
Disorders of the peripheral nervous system	4,148	16%	77%	16%	4%	3.61	4.92	3.43
TIA	3,740	85%	72%	15%	10%	4.72	4.73	4.65
Epilepsy	3,693	45%	74%	24%	8%	4.37	4.17	4.52
Late effects of cerebrovascular disease	3,089	24%	74%	13%	3%	4.63	5.27	4.48

מחלות עיניים

לפונים עם מחלות עיניים נרשם אחוז אשפוזים נמוך וחציון שהיה קצר, במיוחד לפונים עם בעיות אקוטיות כגון גוף זר (חציון שהיה 0.88 שעות וללא אשפוזים), ואחוז נמוך יחסית של ביקורים חוזרים. האבחנות המובילות שנרשמו היו מחלות עיניים אחרות, גוף זר בעין ודלקת בלחמית. יש לציין כי חלק מבתי החולים אינם מקדדים את האבחנה הספציפית ורושמים "מחלת עיניים אחרת" במקום לציין את האבחנה המדויקת.

Ophthalmology diseases - מחלות עיניים								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Other unspecified disorders of the eye and adnexa	32,022	8%	73%	14%	4%	1.88	2.09	1.87
Foreign body on external eye	22,131	0%	58%	12%	3%	0.88	1.55	0.88
Other specified disorders of the eye and adnexa	17,832	17%	75%	17%	6%	2.27	3.48	2.10
Conjunctival disorders (conjunctivitis)	17,101	1%	73%	13%	3%	1.30	2.17	1.28
Retinal detachment	4,741	13%	78%	18%	5%	2.35	2.27	2.37
Keratitis	4,394	10%	68%	18%	8%	1.22	1.65	1.17

מחלות אוזן, פן וגרון

פונים שהגיעו עם מחלות אף, אוזן וגרון מתאפיינים במשך שהיה קצר יחסית ואחוז אשפוזים נמוך. כשלושה רבעים מהמטופלים הגיעו עם הפניית רופא, כולל חולים שהגיעו עקב כניסת גוף זר לאוזן, אף או גרון.

Otolaryngology diseases - מחלות אף, אוזן וגרון								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Diseases of the ear and mastoid process	27,355	21%	75%	14%	4%	2.30	2.73	2.20
Otitis media	12,236	10%	75%	15%	5%	2.23	2.67	2.18
Diseases of oral cavity	10,723	18%	74%	14%	6%	2.22	2.66	2.15
Foreign body in ear, nose & throat	9,528	6%	73%	7%	2%	1.40	2.30	1.35
Diseases of the external ear	7,513	8%	77%	14%	5%	1.55	2.52	1.48

מחלות במחזור הדם

רוב הפונים עם מחלות במחזור הדם הגיעו עם הפניה רפואית. אחוז הביקורים עם הפניה רפואית גבוה במיוחד למטופלים עם מחלות ורידים ומערכת הלימפה (83%) והפרעות קצב (80%). אחוז האשפוזים גבוה לרוב האבחנות בקבוצה, במיוחד למטופלים עם אבחנה של אי ספיקת לב (88%), מחלת לב איסכמית (91%), מחלת כלי דם במוח (91%), אוטם שריר הלב (93%), שבץ מוחי (86%) ואירוע איסכמי חולף (85%). משך שהיה קצר יחסית נרשם למטופלים עם אוטם שריר הלב (2.1 שעות), כביטוי להעברתם המידית ליחידות טיפול ייעודיות, זאת לעומת משך שהיה מעל 3 שעות למרבית האבחנות האחרות בקבוצה, וקרוב ל-4 שעות למטופלים עם שבץ מוחי. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 13%-30%, האחוז גבוה במיוחד למטופלים עם אי ספיקת לב (30%). אחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות גבוה למטופלים עם מחלות כלי דם במוח (20%) ומחלת לב איסכמית (13%).

בקבוצת מחלות זו נכללו גם חולים עם כאבים בחזה, למרות שחלקם אינם ביטוי למחלת לב או מחלות במחזור הדם, עקב הנטייה בבתי החולים לרשום סימפטומים כאבחנת המטופל ולא לרשום את סיבת הכאב. שלושה רבעים (74%) מהחולים עם כאבים בחזה הגיעו עם הפניה רפואית, כנראה כדי לשלול אירוע קרדיאלי, אך רק 40% מהחולים עם אבחנה זו אושפזו.

מחלות במחזור הדם - Circulatory system diseases

אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הבייתה
Chest pain	107,242	40%	74%	15%	3%	3.52	3.57	3.50
Dysrhythmia	17,762	62%	80%	22%	5%	3.42	3.35	3.60
Hypertensive disease	14,384	27%	72%	20%	5%	4.10	5.23	3.85
Cardiovascular system symptoms	12,692	26%	74%	17%	4%	3.45	3.95	3.33
Heart failure	9,131	88%	77%	30%	6%	3.93	3.85	4.60
Ischemic heart disease	8,718	91%	74%	20%	13%	3.48	3.40	4.43
Other cerebrovascular disease	7,465	91%	74%	17%	20%	4.27	4.23	4.50
Other disease of blood & blood forming organs	6,274	44%	70%	28%	9%	3.45	3.65	3.32
Heart diseases specified	5,510	64%	74%	22%	5%	3.76	3.90	3.62
Diseases of veins and lymphatics	5,466	39%	83%	21%	7%	3.75	4.36	3.45
Stroke	4,852	86%	73%	21%		3.98	3.97	4.09
Hemorrhoids	4,036	8%	74%	18%	5%	1.95	2.88	1.90
Acute myocardial infarction	3,815	93%	66%	21%		2.10	2.08	2.53
TIA	3,740	85%	72%	15%	10%	4.72	4.73	4.65
Late effects of cerebrovascular disease	3,089	24%	74%	13%	3%	4.63	5.27	4.48
Other diseases of circulatory system	2,165	34%	79%	23%	6%	3.25	3.84	3.07
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries	2,131	59%	78%	28%	11%	3.52	3.58	3.40

מחלות מערכת הנשימה

קבוצה זו כוללת מחלות ותסמינים קלים כגון מחלות ויראליות בדרכי הנשימה, מחלות אקוטיות כמו דלקת ריאות ומחלות כרוניות כגון מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) ואסתמה. אחוז הביקורים עם הפניה רפואית הינו גבוה במרבית המחלות במערכת הנשימה. המחלות הכרוניות מתאפיינות באחוז אשפוזים גבוה, 92% למטופלים עם בצקת ריאות ו-72% ל-COPD, ובאחוז גבוה של ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים, 31% ו-30%, בהתאמה. גם למחלות אקוטיות אחוז אשפוזים גבוה, 83% לפלאוריטיס ו-60% לדלקת ריאות, ואחוז גבוה של ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים, 32% ו-18%, בהתאמה. לעומת זאת, מחלות ויראליות מתאפיינות באחוז נמוך של אשפוזים ושל ביקורים חוזרים.

מחלות מערכת הנשימה - Respiratory system diseases								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהי (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Respiratory symptoms	59,621	48%	74%	22%	5%	3.37	3.48	3.28
Upper respiratory tract infections	37,375	18%	72%	14%	5%	2.75	2.58	2.78
Pneumonia	33,451	60%	77%	18%	7%	3.55	3.70	3.38
Acute bronchitis	12,424	34%	78%	15%	5%	3.20	2.90	3.30
Bronchitis & asthma	11,023	42%	68%	21%	6%	3.10	3.22	3.02
Other diseases of respiratory system	8,488	52%	74%	19%	6%	2.85	3.02	2.73
Chronic obstructive pulmonary disease	8,053	72%	74%	30%	11%	3.67	3.57	3.87
Pulmonary edema	3,235	92%	72%	31%	10%	3.23	3.13	4.99
Pleurisy	2,943	83%	75%	32%	10%	3.93	3.83	4.35

מחלות מערכת העיכול

מטופלים עם מחלות במערכת העיכול מהווים אחוז גבוה מכלל הפניות למחלקות לרפואה דחופה. רוב הפונים הגיעו עם הפניה רפואית. אחוז האשפוזים גבוה מאוד לחולים עם דלקת תוספתן (94%), אבנים בדרכי המרה (65%), דימום בדרכי העיכול (65%) ומחלות אחרות במערכת העיכול (84%). חציון שהיה ארוך יחסית נרשם למטופלים עם דלקת תוספתן (5.12 שעות), אבנים בדרכי המרה (4.57) ומחלות אחרות במערכת העיכול (4.72). אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 14%-25%, גבוה לפונים עם אבנים בדרכי המרה ועם מחלות אחרות בדרכי העיכול (25%). אחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות גבוה לפונים עם אבנים בדרכי המרה (10%) ומחלות אחרות של מערכת העיכול (12%).

מחלות מערכת העיכול - Digestive system diseases								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Abdominal & pelvic symptoms	163,697	25%	72%	20%	7%	3.92	4.90	3.70
Digestive symptoms	40,544	30%	70%	18%	5%	3.67	3.82	3.62
Noninfectious enteritis and colitis	31,111	22%	69%	15%	5%	3.52	3.70	3.48
Other diseases of intestines and peritoneum	27,694	39%	74%	21%	6%	3.32	4.25	2.92
Intestinal infectious diseases	10,933	19%	68%	14%	5%	3.38	3.77	3.33
Gastrointestinal hemorrhage	6,248	65%	71%	21%	7%	3.32	3.48	3.03
Hernia of abdominal cavity	5,852	31%	75%	20%	5%	2.53	3.25	2.28
Appendicitis	5,604	94%	81%	16%		5.12	5.23	3.42
Other diseases of digestive system	5,421	84%	70%	25%	12%	4.72	4.87	4.09
Cholelithiasis	4,745	65%	69%	25%	10%	4.57	4.88	4.04
Diseases of esophagus, stomach & duodenum	4,371	15%	72%	19%	5%	3.52	4.33	3.38
Hemorrhoids	4,036	8%	74%	18%	5%	1.95	2.88	1.90
Other disorders of pancreatic secretion	2,339	62%	73%	22%	5%	3.75	3.50	4.09

מומים מולדים

מספר הביקורים עם אבחנות של מומים מולדים נמוך יחסית במחלקות לרפואה דחופה. שלושה רבעים מהפונים הגיעו עם הפניה רפואית, כחמישית היו ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים וכשליש אושפזו.

מומים מולדים - Congenital anomalies								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Congenital anomalies	1,950	30%	75%	23%	7%	2.93	3.33	2.82

מחלות מערכת המין והשתן

רוב המטופלים עם אבחנות של מחלות במערכת המין והשתן הגיעו עם הפניה רפואית. מטופלים רבים הגיעו עם דלקת בדרכי השתן, מרביתם (70%) הגיעו עם הפניה רפואית ושליש (36%) אושפזו. אחוז האשפוזים גבוה למטופלים עם אי ספיקת כליות גבוה (79%) וזיהומים בכליות (56%), כאשר לאבחנות אלו גם משך שהיה גבוה (4.85 ו-3.98 שעות, בהתאמה). לחולים עם זיהומים בכליות נרשם אחוז גבוה של ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות (18%) ולחולים עם אי ספיקת כליות אחוז גבוה של ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים (27%).

מחלות מערכת המין והשתן - Genitourinary system diseases								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Urinary tract infection	43,468	36%	70%	25%	8%	3.70	4.20	3.47
Urinary symptoms	30,389	24%	62%	26%	12%	3.90	4.40	3.78
Diseases of male genital organs	16,328	14%	74%	19%	5%	2.70	3.38	2.62
Renal failure	7,558	79%	76%	27%	8%	4.85	4.88	4.68
Infections of kidney	4,782	56%	77%	21%	18%	3.98	3.98	3.95
Other diseases of kidney & ureter	4,531	40%	69%	24%	8%	3.90	4.13	3.80

הריון ולידה

ביקורים אלו הם לנשים בשלבים שונים של ההריון עם סיבוכים שונים הדורשים הערכה רפואית במלר"ד או בחדר הלידה לצורכי ניטור או ללידה. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות ובתוך 30 ימים גבוה לנשים עם אבחנות של הריון ולידה, וחציון השהיה שלהן קצר יחסית, מצב שמצביע על ביקורים של נשים הרות עם חשד לצירים, או לניטור לאחר תאריך הלידה המשוער. לנשים בהריון בסיכון גבוה אחוז האשפוזים גבוה (47%), ואחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים גבוה (61%).

הריון ולידה - Pregnancy and childbirth								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Normal delivery & pregnancy	234,348	44%	32%	50%	26%	2.27	2.02	2.40
Complications of pregnancy & delivery	49,179	37%	56%	39%	18%	2.12	1.88	2.23
Diseases of female genital organs & breast disorders	45,101	22%	67%	25%	8%	2.47	2.62	2.43
High risk pregnancy	6,887	47%	47%	61%	22%	2.97	3.12	2.83
Conditions originating in the perinatal period	6,119	46%	71%	22%	19%	2.27	2.32	2.23

מחלות עור

רוב המבקרים עם אבחנות של מחלות עור הגיעו עם הפניה רפואית. קבוצת מחלות העור מתאפיינת באחוז אשפוזים נמוך (16%-34%) ואחוז נמוך של ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים ובתוך 48 שעות. האבחנה המובילה שנרשמה הייתה זיהומי עור והרקמות הרכות, לה נרשם גם אחוז האשפוזים הגבוה בקבוצה (34%).

מחלות עור - Skin diseases								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהי (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Infections of skin and subcutaneous tissue	34,890	34%	81%	17%	5%	2.78	3.58	2.48
Diseases of skin	18,305	16%	73%	18%	5%	2.55	3.20	2.47
Skin symptoms	13,561	26%	77%	21%	7%	3.38	4.05	3.20

מחלות מערכת השרירים והשלד

קבוצה זו כוללת ביקורים עקב בעיות אורתופדיות שונות שאין טראומתיות. מעל שני שליש המטופלים הגיעו עם הפניה רפואית, למרביתם נרשם אחוז אשפוזים נמוך (10%-22%) ואחוז נמוך יחסית של ביקורים חוזרים.

מחלות מערכת השרירים והשלד - Musculoskeletal system diseases								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהי (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Unspecified musculoskeletal disorders of the back	46,994	10%	65%	19%	5%	3.00	4.85	2.87
Unspecified musculoskeletal disorders excluding the back	32,151	10%	74%	17%	4%	2.98	4.50	2.87
Diseases of musculoskeletal system	28,177	13%	68%	16%	4%	2.87	4.55	2.70
Rheumatism, excluding the back	10,679	22%	76%	17%	4%	2.99	4.10	2.70

סימפטומים ומצבים בלתי מוגדרים

לכ-900 אלף ביקורים, רבע מכלל הביקורים עם אבחנה כלשהי, נרשמו אבחנות של סימפטומים ומצבים בלתי מוגדרים ללא רישום המחלה הגורמת לתסמינים. יש להניח כי חלק מהביקורים מסתיימים ללא זיהוי המחלה, אך בחלקם ניתן להניח כי אבחנה נמצאה וכי רישום הסימפטום במקום האבחנה מצביע על רישום לקוי של קודי האבחנות במלר"ד. האבחנה המובילה בקבוצה זו היא סימפטומים כלליים, כשני שלישי (68%) מהמטופלים עם אבחנה זו הגיעו עם הפנייה רפואית ורבע (25%) אושפזו. לעומת זאת, אחוז אשפוזים גבוה נרשם לחולים עם אנמיה (67%), פרכוסים (62%), סימפטומים מטבוליים (60%) וסימפטומים במערכת הנשימה (48%). חציון שהיה גבוה נרשם למבקרים שהגיעו עם סחרחורת (4.20) ועייפות וחולשה (4.02 שעות).

סימפטומים ומצבים בלתי מוגדרים - Symptoms & ill-defined conditions								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שחררו הביתה
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	178,663	25%	68%	20%	7%	2.73	3.52	2.57
Abdominal & pelvic symptoms	163,697	25%	72%	20%	7%	3.92	4.90	3.70
Chest pain	107,242	40%	74%	15%	3%	3.52	3.57	3.50
Fever	78,025	47%	73%	19%	8%	3.37	3.50	3.28
Examination for suspected conditions not found	60,696	12%	59%	19%	6%	2.32	3.32	2.23
Respiratory symptoms	59,621	48%	74%	22%	5%	3.37	3.48	3.28
Head & neck symptoms	42,817	18%	73%	18%	6%	3.98	5.17	3.82
Digestive symptoms	40,544	30%	70%	18%	5%	3.67	3.82	3.62
Urinary symptoms	30,389	24%	62%	26%	12%	3.90	4.40	3.78
Syncope & collapse	25,504	40%	72%	15%	3%	3.98	4.35	3.80
Malaise & fatigue	24,515	35%	71%	24%	6%	4.02	4.45	3.85
Dizziness & giddiness	20,325	22%	74%	16%	4%	4.20	4.98	4.02
Factors influencing health status & contact with health services	19,543	17%	63%	22%	6%	2.23	3.32	2.08
Anemia	15,620	67%	80%	30%	6%	3.50	3.50	3.50
Skin symptoms	13,561	26%	77%	21%	7%	3.38	4.05	3.20
Cardiovascular system symptoms	12,692	26%	74%	17%	4%	3.45	3.95	3.33
Convulsions	10,610	62%	73%	20%	9%	3.53	2.93	4.22
Complications of surgical and medical care, not elsewhere classified	4,486	36%	67%	23%	7%	2.83	3.45	2.57
Metabolic symptoms	1,699	60%	80%	24%	6%	3.58	3.63	3.56
General medical examination	1,232	16%	49%	20%	6%	2.74	4.52	2.50

פגיעות והרעלות

קבוצה זו כוללת יותר מחצי מיליון ביקורים. למרבית הביקורים עקב פגיעות והרעלות נרשם אחוז אשפוזים נמוך, פרט למטופלים עם שברים בעמוד השדרה ובגו (54%), שברים בגפיים התחתונים (38%) ופגיעה עצמית (53%). למרבית המטופלים עם פגיעות והרעלות נרשם משך השהיה קצר יחסית, אך למטופלים עם שברים בעמוד השדרה ובגו (4.27 שעות) ולאלו שהגיעו עקב פגיעה עצמית (4.17) נרשם חציון השהיה ארוך.

פגיעות והרעלות - Injury and poisoning								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהי (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחזרה הביתה
Other injuries	67,910	15%	65%	13%	4%	2.78	4.00	2.68
Fracture of upper limb	53,047	12%	68%	18%	6%	2.08	2.98	2.02
Open wound & injury of head, neck & trunk	49,673	3%	60%	8%	3%	1.70	3.18	1.68
Contusions of lower limb	49,105	4%	65%	11%	3%	1.87	4.55	1.83
Contusions of upper limb	47,944	2%	65%	10%	3%	1.73	4.03	1.72
Sprains and strains of joints and adjacent muscles	34,578	1%	53%	8%	1%	1.77	4.48	1.77
Open wound & injury of upper limb	34,279	6%	53%	8%	2%	1.80	2.58	1.77
Fracture of lower limb	30,646	38%	70%	18%	5%	2.55	3.73	2.05
Vehicle accidents	29,759	7%	49%	9%	2%	2.53	4.23	2.45
Contusions of trunk	27,898	8%	60%	12%	3%	2.58	4.68	2.50
Foreign body on external eye	22,131	0%	58%	12%	3%	0.88	1.55	0.88
Accidental falls	16,343	22%	67%	15%	4%	3.50	4.93	3.17
Other and unspecified effects of external causes	15,964	17%	61%	15%	5%	2.82	3.34	2.73
Contusions of face & eye	13,875	7%	59%	10%	4%	2.13	3.50	2.07
Open wound & injury of lower limb	13,796	8%	59%	10%	3%	1.92	2.92	1.85
Foreign body in ear, nose & throat	9,528	6%	73%	7%	2%	1.40	2.30	1.35
Dislocation	9,143	7%	56%	13%	4%	1.67	4.13	1.60
Injuries caused by animals & plants	8,597	5%	63%	10%	4%	1.83	2.57	1.80
Burns	8,183	16%	53%	13%	5%	1.50	2.05	1.45
Accidents	6,070	13%	53%	11%	3%	2.18	3.58	2.00
Fracture of spine and trunk	4,231	54%	72%	17%	5%	4.27	5.07	3.47
Late effects of vehicle accidents	3,269	1%	38%	6%	1%	1.92	5.20	1.92
Poisoning	3,163	27%	61%	10%	4%	3.07	2.98	3.08
Homicide & injury purposely inflicted by others	3,124	11%	55%	13%	5%	2.87	4.45	2.75
Fracture of skull	3,076	26%	70%	18%	7%	2.72	4.03	2.34
Effects of foreign body entering through other orifice	3,008	19%	68%	13%	6%	1.92	2.75	1.77
Suicide & self-inflicted injury	2,848	53%	59%	20%	6%	4.17	3.72	4.69

14. עונתיות


14.1 עונתיות - סיבת כניסה וגיל

מספר הפניות עקב מחלה לתינוקות וילדים בגיל 0-4 ולגילאי 75 ומעלה גבוה בחודשי הסתיו והחורף ונמוך בחודשי האביב והקיץ.


מספר הפניות עקב סיבות חיצוניות לתינוקות וילדים בגיל 0-14 נמוך בחודשי החורף וגבוה בשאר עונות השנה, ואילו לגילאי 75 ומעלה מספר הפניות גבוה יותר בחודשי החורף.

התפלגות הביקורים ללא יולדות לפי גיל וחודש, 2010-2015

מחלה



סיבות חיצוניות




14.2 עונתיות - אבחנות שכיחות

התפלגות הביקורים עם האבחנות השכיחות במלר"ד בהתאם לקבוצות האבחנות הראשיות וחודשי השנה מצביעה על השונות בעונתיות של הביקורים בהתאם לסוגי המחלות, שחלקן בעלות אופי עונתי מובהק וחלקן מופיעות בתדירות קבועה במהלך השנה. הנמחלות המאופיינות בעונתיות גורמות לעומס וצפיפות במלר"ד בעונות אלו.


- מחלות זיהומיות: קיימת עונתיות מובהקת במספר הביקורים עם מחלות זיהומיות בדרכי הנשימה, במיוחד דלקת ריאות וברונכיטיס חריפה, שהינן מחלות חורף מובהקות ומספר הביקורים עולה מנובמבר עד מרץ. ביקורים עם רישום של חום בלבד, ללא ציון סוג המחלה, מאופיינים בעונתיות שקשורה בחלקה למחלות חורף, אך הביקורים גבוהים יחסית במהלך כל השנה, ובחודשי סוף הקיץ יש עליה נוספת, שכנראה קשורה לתחלואה גסטרואינטסטינלית.
- מחלות אנדוקריניות ומטבוליות: תדירות הביקורים של מחלות אלו לרוב יציבה במהלך השנה, אם כי בשנת 2015 נרשמה עלייה במספר הביקורים עם הפרעות תזונתיות, מטבוליות ואימונולוגיות בחודשי הקיץ, ובמיוחד בחודש אוגוסט.
- מחלות או תסמינים נפשיים: ביקורים עם הפרעות נוירוטיות, חרדה ושימוש לרעה באלכוהול וסמים מופיעים בשיעור יציב יחסית כל השנה, אך בחודשי החורף מספרם נמוך מעט בהשוואה לשאר חודשי השנה.
- מחלות במחזור הדם: מספר הביקורים עם אוטם שריר הלב, מחלת לב איסכמית, שבץ מוחי ואירוע איסכמי חולף יציב, יחסית, ללא תנודתיות מיוחדת במהלך השנה.
- מחלות מערכת הנשימה: מחלות בדרכי הנשימה מתאפיינות בעונתיות מובהקת. ביקורים עם מחלות ריאה כרוניות נפוצים יותר בחודשי החורף, וכן מחלות זיהומיות של מערכת הנשימה. בנוסף ניכרת עליה בשכיחות של ברונכיטיס ואסתמה בתחילת הסתיו, וסימפטומים נשימתיים בתחילת הסתיו ובאביב, ניתן להניח שבעקבות חילופי העונות והאלרגיות הסביבתיות.
- מחלות מערכת העיכול: ביקורים עם סימפטומים של בטן ואגן, סימפטומים של מערכת העיכול ודלקות מעי לא זיהומיות מצביעים על עליה מובהקת בחודשי האביב ותחילת הקיץ. תדירות הביקורים עם מחלות ותסמינים אחרים במערכת העיכול יציבה יחסית במהלך השנה.
- מחלות מערכת המין והשתן: מספר הביקורים עם דלקות בדרכי השתן ותסמינים שונים במערכת השתן גבוהים יותר בסוף הקיץ ותחילת הסתיו.
- מחלות עור: מספר הביקורים עם בעיות עור גבוה יותר בקיץ, במיוחד בסוף הקיץ ותחילת הסתיו.
- פציעות ותאונות: ביקורים עקב פציעות ותאונות שונות שכיחים יותר בחודשי האביב ותחילת הקיץ. תדירות הביקורים עקב כוויות וגוף זר בעין יציבה במהלך השנה.

ביקורים לפי קבוצות אבחנות ראשיות וחודשי השנה, 2015


מחלות זיהומיות





מחלות אנדוקריניות ומטבוליות




הפרעות נפשיות והתנהגותיות




מחלות במחזור הדם




מחלות מערכת הנשימה




מחלות מערכת העיכול





מחלות מערכת המין והשתן



מחלות עור



פציעות ותאונות



15. מאפיינים גיאוגרפיים

שיעור הביקורים ללא יולדות המתוקן לגיל במגמת ירידה במרבית המחוזות, פרט לשיעור יציב במחוז הצפון. בשנת 2015, שיעור הביקורים במחוז ירושלים היה 195 ל-1,000 נפש, ירידה ב-4% משנת 2012, במחוז חיפה 314, ירידה ב-2%, במחוז המרכז 314, ירידה ב-5%, במחוז תל אביב 302, ירידה ב-5%, במחוז הדרום 307, ירידה ב-8%, ביהודה ושומרון 198, ירידה ב-5% ובמחוז הצפון 388 ל-1,000 נפש, ללא שינוי משנת 2012. ירידה בשיעור הביקורים ניכרת במיוחד בביקורים עקב סיבות חיצוניות, ירידה ב-5% במחוז ירושלים, ב-8% במחוז הצפון, ב-5% במחוז חיפה, ב-10% במחוז ב, זכרמה-7% במחוז תל אביב, ב-13% במחוז הדרום וב-9% ביהודה ושומרון.


שיעור הביקורים ללא יולדות במחוז הצפון גבוה פי 1.29 מהממוצע הארצי, השיעור עקב מחלה גבוה פי 1.26 ועקב סיבות חיצוניות פי 1.37, במחוז חיפה שיעור הביקורים גבוה פי 1.04, פי 1.05 ו-1.04, בהתאמה, במחוז הדרום פי 1.02, פי 1.01 ו-1.01, בהתאמה, ובמחוז המרכז פי 1.04 עקב מחלה וסיבות חיצוניות בהשוואה לממוצע הארצי. במחוז ירושלים השיעור נמוך, 0.65 בהשוואה לממוצע הארצי, עקב מחלה 0.67 ועקב סיבות חיצוניות 0.56, גם ביהודה ושומרון השיעור נמוך, 0.66, 0.67 ו-0.63, בהתאמה, בהשוואה לממוצע הארצי. שיעור נמוך זה הינו, כנראה, תוצאה מפעילות סניפי "טרם" באזור. בנוסף, יש לציין כי השיעור בירושלים אינו כולל את פעילות בתי החולים במזרח העיר.

בשנת 2015, מרבית הפניות היו לבתי חולים הממוקמים באותו מחוז המגורים, 92% במחוז ירושלים, 84% במחוזות חיפה והצפון, 83% במחוז תל אביב ו-81% במחוזות המרכז והדרום. רבע (23%) מתושבי יהודה ושומרון פנו לשערי צדק, 22% להדסה עין כרם והדסה הר הצופים, 12% לבילינסון, 8% לשיבא, 7% למאיר ו-8% לשניידר.

במרבית בתי החולים הפונים הגיעו מאותו המחוז, מלבד רמב"ם שליש (32%) הגיעו ממחוז הצפון, בילינסון 23% הגיעו ממחוז תל אביב ו-7% מיהודה ושומרון, קפלן 30% הגיעו ממחוז הדרום, שניידר 17% הגיעו ממחוז תל אביב ו-9% מיהודה ושומרון ושיבא שליש (33%) הגיעו ממחוז המרכז.

שיעור הביקורים לפי מחוז מגורים, 2015

שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש




שיעור הביקורים לפי סיבת כניסה ומחוז מגורים, 2006-2015
שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015/ 2012	מחוז מגורים
סה"כ ללא יולדות											
326.2	321.7	315.6	315.9	322.4	314.0	316.2	306.7	301.9	304.9	-4%	סה"כ ארצי*
215.5	212.7	208.5	209.8	209.3	199.4	203.1	198.7	192.6	194.7	-4%	ירושלים
383.8	386.6	375.5	395.1	398.2	390.4	389.6	379.3	376.5	387.8	0%	הצפון
337.3	334.5	326.6	323.2	327.5	320.0	321.0	314.3	312.7	314.5	-2%	חיפה
338.1	329.1	324.9	324.7	333.9	324.5	329.0	316.5	313.8	313.8	-5%	המרכז
318.2	308.4	303.8	311.7	321.2	313.9	317.8	305.5	300.8	301.8	-5%	תל אביב
341.0	337.3	330.3	326.4	337.1	332.4	333.4	325.7	312.5	307.3	-8%	הדרום
205.9	198.1	194.0	208.6	220.2	208.3	208.1	197.8	196.4	197.8	-5%	יהודה ושומרון
מחלה											
236.0	233.4	229.6	233.5	237.3	229.7	232.0	226.3	224.4	228.3	-2%	סה"כ ארצי*
166.3	164.0	161.6	165.8	161.9	150.1	153.2	154.2	149.9	152.2	-1%	ירושלים
274.6	278.1	270.1	287.9	291.3	281.2	277.6	273.7	275.8	285.2	3%	הצפון
245.9	250.7	247.2	244.4	243.9	236.3	238.8	234.3	234.5	236.4	-1%	חיפה
243.0	235.7	234.0	237.4	244.8	237.7	242.8	233.3	233.3	235.9	-3%	המרכז
228.2	220.6	218.9	231.1	234.9	230.8	236.2	225.7	223.9	225.9	-4%	תל אביב
244.8	241.8	235.3	237.1	246.3	242.2	242.8	239.3	229.5	228.1	-6%	הדרום
149.3	145.6	143.8	159.3	165.0	154.7	155.4	148.3	149.0	150.6	-3%	יהודה ושומרון
סיבות חיצוניות											
87.9	85.7	83.3	80.3	81.5	82.3	82.5	79.3	76.3	75.5	-8%	סה"כ ארצי*
43.1	41.5	39.8	37.3	37.0	42.8	44.3	44.1	42.3	42.0	-5%	ירושלים
108.4	107.6	104.6	106.3	106.1	108.4	111.4	105.1	100.2	102.1	-8%	הצפון
91.0	83.3	78.8	78.3	83.0	83.1	81.8	79.6	77.8	77.7	-5%	חיפה
94.6	92.8	90.3	86.7	87.6	86.2	85.6	82.5	79.7	77.3	-10%	המרכז
89.2	87.0	84.0	79.8	81.8	82.1	80.6	78.7	76.0	75.0	-7%	תל אביב
91.7	91.1	90.2	84.9	85.8	85.4	86.5	82.1	79.1	75.3	-13%	הדרום
54.7	50.4	48.6	47.5	50.0	51.7	51.3	48.7	46.7	46.7	-9%	יהודה ושומרון


* סה"כ ארצי כולל ביקורים עם ישוב מגורים לא ידוע.

שיעור הביקורים לפי סיבת כניסה ומחוז מגורים, 2006-2015
 שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש


סה"כ ללא יולדות



מחלה




סיבות חיצוניות




יחס שיעורים מחוזלסה"כ ארצי, 2015
שיעור מתוקן לגיל


סה"כ ללא יולדות



מחלה



סיבות חיצוניות



ביקורים ללא יולדות לפי מחוז מגורים ומחוז בית החולים, 2015

מחוז מגורים								מחוז בית החולים
יהודה ושומרון	הדרום	תל אביב	המרכז	חיפה	הצפון	ירושלים	סה"כ	
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	סה"כ
44.8%	0.8%	0.5%	0.9%	0.4%	0.5%	92.0%	8.6%	ירושלים
2.7%	0.6%	0.6%	0.8%	8.2%	83.7%	1.0%	18.7%	הצפון
1.7%	0.5%	0.6%	1.9%	84.3%	12.3%	0.5%	13.8%	חיפה
33.2%	12.8%	14.4%	81.0%	4.1%	1.3%	2.9%	26.7%	המרכז
14.3%	4.2%	82.9%	13.9%	2.0%	1.1%	2.2%	19.4%	תל אביב
3.3%	81.0%	1.0%	1.6%	1.0%	1.0%	1.5%	12.9%	הדרום

ביקורים ללא יולדות לפי מחוז מגורים ובית החולים, 2015

מחוז מגורים								
יהודה ושומרון	הדרום	תל אביב	המרכז	חיפה	הצפון	ירושלים	סה"כ	
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	סה"כ
11.2%	0.3%	0.2%	0.4%	0.2%	0.2%	27.7%	2.6%	הדסה עין כרם
10.3%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	19.8%	1.9%	הדסה הר הצופים
23.3%	0.3%	0.2%	0.3%	0.1%	0.2%	44.4%	4.1%	שערי צדק
0.8%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	12.0%	0.3%	2.7%	רבקה זיו
0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.8%	20.4%	0.1%	4.3%	נהריה
0.6%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	11.7%	0.3%	2.6%	פוריה
1.2%	0.1%	0.1%	0.2%	6.6%	18.2%	0.2%	4.7%	המרכזי בעמק
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	9.9%	0.0%	2.0%	הסקוטי
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	5.2%	0.0%	1.1%	סנט יונסנט
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	1.3%	המשפחה הקדושה
0.4%	0.2%	0.2%	0.3%	24.9%	7.5%	0.2%	4.8%	רמב"ם
1.1%	0.2%	0.3%	1.5%	28.7%	0.4%	0.2%	4.2%	הלל יפה
0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%	2.0%	0.0%	1.9%	בני ציון
0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	18.7%	2.4%	0.1%	2.9%	הכרמל
1.9%	1.4%	1.5%	19.6%	0.4%	0.3%	0.8%	5.6%	אסף הרופא
11.7%	0.7%	5.6%	10.1%	0.8%	0.3%	0.3%	4.1%	רבין ק. בילינסון
7.5%	0.3%	3.8%	17.8%	1.2%	0.3%	0.3%	5.6%	מאיר
0.7%	9.7%	0.4%	12.2%	0.2%	0.1%	1.0%	4.7%	קפלן
2.2%	0.1%	0.6%	5.3%	0.1%	0.0%	0.1%	1.5%	השרון ק. גולדה
7.6%	0.5%	2.1%	5.7%	0.4%	0.1%	0.2%	2.2%	שניידר
1.6%	0.2%	0.4%	10.3%	1.1%	0.2%	0.3%	2.9%	לניאדו
8.1%	2.1%	20.4%	8.1%	0.7%	0.4%	0.7%	6.3%	שיבא
0.4%	0.4%	23.9%	1.6%	0.1%	0.1%	0.3%	4.6%	וולפסון
2.2%	1.5%	32.8%	3.6%	1.1%	0.6%	1.0%	7.1%	סוראסקי
3.6%	0.3%	5.9%	0.6%	0.1%	0.0%	0.3%	1.3%	מעייני הישועה
0.5%	26.1%	0.2%	0.4%	0.2%	0.1%	0.3%	4.0%	ברזילי
2.1%	46.7%	0.4%	0.7%	0.5%	0.5%	0.6%	7.3%	סורוקה
0.6%	8.3%	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%	0.5%	1.6%	יוספטל

ביקורים ללא יולדות לפי מחוז בית חולים ומחוז המגורים, 2015

מחוז מגורים								מחוז בית החולים
יהודה ושומרון	הדרום	תל אביב	המרכז	חיפה	הצפון	ירושלים	סה"כ	
2.5%	14.5%	17.2%	25.4%	12.5%	20.4%	7.6%	100.0%	סה"כ
12.8%	1.4%	0.9%	2.6%	0.6%	1.2%	80.5%	100.0%	ירושלים
0.4%	0.5%	0.6%	1.0%	5.5%	91.6%	0.4%	100.0%	הצפון
0.3%	0.6%	0.7%	3.4%	76.4%	18.3%	0.3%	100.0%	חיפה
3.1%	7.0%	9.3%	77.0%	1.9%	1.0%	0.8%	100.0%	המרכז
1.8%	3.1%	73.5%	18.2%	1.3%	1.2%	0.9%	100.0%	תל אביב
0.6%	91.5%	1.3%	3.1%	1.0%	1.6%	0.9%	100.0%	הדרום

ביקורים ללא יולדות לפי בית חולים ומחוז המגורים, 2015

מחוז מגורים								
יהודה ושומרון	הדרום	תל אביב	המרכז	חיפה	הצפון	ירושלים	סה"כ	
10.6%	1.9%	1.2%	3.9%	0.7%	1.4%	80.2%	100.0%	הדסה עין כרם
13.5%	1.2%	0.8%	2.2%	0.7%	1.5%	80.0%	100.0%	הדסה הר הצופים
13.8%	1.1%	0.8%	1.9%	0.4%	0.8%	81.0%	100.0%	שערי צדק
0.7%	1.1%	1.3%	2.6%	1.6%	91.7%	0.9%	100.0%	רבקה זיו
0.1%	0.3%	0.4%	0.6%	2.2%	96.1%	0.2%	100.0%	נהריה
0.6%	0.9%	1.1%	2.1%	1.4%	93.1%	0.8%	100.0%	פוריה
0.6%	0.4%	0.5%	0.9%	17.5%	79.7%	0.3%	100.0%	המרכזי בעמק
0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.8%	98.9%	0.1%	100.0%	הסקוטי
0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.7%	99.0%	0.1%	100.0%	סנט וינסנט
0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.4%	99.3%	0.1%	100.0%	המשפחה הקדושה
0.2%	0.7%	0.7%	1.4%	64.7%	31.9%	0.4%	100.0%	רמב"ם
0.6%	0.8%	1.1%	9.2%	86.1%	1.9%	0.4%	100.0%	הלל יפה
0.1%	0.3%	0.3%	0.5%	77.3%	21.3%	0.2%	100.0%	בני ציון
0.1%	0.3%	0.4%	0.6%	81.2%	17.4%	0.1%	100.0%	הכרמל
0.8%	3.5%	4.6%	88.2%	0.8%	1.0%	1.0%	100.0%	אסף הרופא
7.0%	2.5%	23.3%	62.4%	2.4%	1.7%	0.6%	100.0%	רבין ק. בילינסון
3.3%	0.7%	11.7%	80.5%	2.7%	0.9%	0.3%	100.0%	מאיר
0.4%	29.9%	1.4%	65.7%	0.4%	0.6%	1.6%	100.0%	קפלן
3.5%	0.7%	6.5%	87.6%	0.7%	0.6%	0.3%	100.0%	השרון ק. גולדה
8.6%	3.2%	16.9%	67.3%	2.5%	0.9%	0.6%	100.0%	שניידר
1.3%	1.0%	2.3%	88.9%	4.6%	1.1%	0.7%	100.0%	לניאדו
3.2%	4.8%	55.9%	32.7%	1.4%	1.2%	0.8%	100.0%	שיבא
0.2%	1.3%	88.3%	8.9%	0.4%	0.5%	0.4%	100.0%	וולפסון
0.8%	3.0%	78.9%	12.7%	1.9%	1.7%	1.0%	100.0%	סוראסקי
6.7%	2.7%	75.6%	11.8%	0.8%	0.6%	1.9%	100.0%	מעייני הישועה
0.3%	94.7%	0.9%	2.4%	0.5%	0.7%	0.5%	100.0%	ברזילי
0.7%	93.1%	1.0%	2.4%	0.8%	1.3%	0.7%	100.0%	סורוקה
1.0%	76.0%	3.8%	8.2%	3.2%	5.3%	2.5%	100.0%	יוספטל

רשימת אבחנות לפי ICD-9-CM

אבחנה	ICD-9-CM
Intestinal infectious diseases	001-009
Other bacterial infections	010-037, 039-041, 320
Sepsis	038
Viral infections, specific	042-078, 487-488
Viral infections, non-specific	079
Other infections	080-139, 321-326
Neoplasms	140-239, M800-M997
Disorders of thyroid, parathyroid & other endocrine	240-246, 252-259
Diabetes mellitus	249-250
Other disorders of pancreatic secretion	251
Nutrition, metabolic & immune disorders	260-279
Anemia	280-285
Other diseases of blood & blood forming organs	286-289
Psychotic disorders	290-299
Other neurotic, personality & other nonpsychotic mental disorders	300, 3001-3039, 306-319
Anxiety disorders	3000
Drug & alcohol abuse	304-305
Other central nervous system diseases & disorders	327-337, 340-344, 347-349
Central nervous system pain	338-339, 346
Epilepsy	345
Disorders of the peripheral nervous system	350-359
Other specified disorders of the eye and adnexa	360, 362-369, 371, 373-378
Retinal detachment	361
Keratitis	370
Conjunctival disorders (conjunctivitis)	372
Other unspecified disorders of the eye and adnexa	379
Diseases of the external ear	380
Otitis media	381-382
Diseases of the ear and mastoid process	383-389
Heart diseases specified	390-398, 415-425, 429
Hypertensive disease	401-405
Acute myocardial infarction	410
Ischemic heart disease	411-414
Dysrhythmia	426-427
Heart failure	428
Stroke	430-434, 436
TIA	435
Other cerebrovascular disease	437
Late effects of cerebrovascular disease	438

רשימת אבחנות לפי ICD-9-CM, המשך

אבחנה	ICD-9-CM
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries	440-449
Diseases of veins and lymphatics	451-454, 456-458
Hemorrhoids	455
Other diseases of circulatory system	459
Upper respiratory tract infections	460-465, 472-476
Acute bronchitis	466
Other diseases of respiratory system	470-471, 477-478, 500-510, 512-513, 515-519
Pneumonia	480-486
Bronchitis & asthma	490-495
Chronic obstructive pulmonary disease	496
Pleurisy	511
Pulmonary edema	514
Diseases of oral cavity	520-529
Diseases of esophagus, stomach & duodenum	530-539
Appendicitis	540-543
Hernia of abdominal cavity	550-553
Noninfectious enteritis and colitis	555-558
Other diseases of intestines and peritoneum	560-569
Other diseases of digestive system	570-573, 575-577, 579
Cholelithiasis	574
Gastrointestinal hemorrhage	578
Other diseases of kidney & ureter	580-583, 587-589, 591-598
Renal failure	584-586
Infections of kidney	590
Urinary tract infection	599
Diseases of male genital organs	600-608
Diseases of female genital organs & breast disorders	610-629
Complications of pregnancy & delivery	630-649, 660-679
Normal delivery & pregnancy	650-659, V22
Infections of skin and subcutaneous tissue	680-686
Diseases of skin	690-709
Diseases of musculoskeletal system	710-723, 730-739
Unspecified musculoskeletal disorders of the back	724
Rheumatism, excluding the back	725-728
Unspecified musculoskeletal disorders excluding the back	729
Congenital anomalies	740-759
Conditions originating in the perinatal period	760-779
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	780.0-780.1, 780.5, 780.8-781.9, 790-799
Syncope & collapse	780.2

רשימת אבחנות לפי ICD-9-CM | המשרד

אבחנה	ICD-9-CM
Convulsions	780.3
Dizziness & giddiness	780.4
Fever	780.6
Malaise & fatigue	780.7
Skin symptoms	782
Metabolic symptoms	783
Head & neck symptoms	784
Cardiovascular system symptoms	785
Respiratory symptoms	7860-7864, 7866-7869
Chest pain	7865
Digestive symptoms	787
Urinary symptoms	788
Abdominal & pelvic symptoms	789
Fracture of skull	800-804
Fracture of spine and trunk	805-809
Fracture of upper limb	810-819
Fracture of lower limb	820-829
Dislocation	830-839
Sprains and strains of joints and adjacent muscles	840-848
Other injuries	850-869, 900-909, 919, 929, 950-959
Open wound & injury of head, neck & trunk	870-879, 910-911, 918, 925-926
Open wound & injury of upper limb	880-887, 912-915, 927
Open wound & injury of lower limb	890-897, 916-917, 928
Contusions of face & eye	920-921
Contusions of trunk	922
Contusions of upper limb	923
Contusions of lower limb	924
Foreign body on external eye	930
Foreign body in ear, nose & throat	931-934
Effects of foreign body entering through other orifice	935-939
Burns	940-949
Poisoning	960-989
Other and unspecified effects of external causes	990-995
Complications of surgical and medical care, not elsewhere classified	9960-9998
Accidents	E000-E807, E830-E879, E890-E904, E907-E929, E9291-E9499, E970-E999
Vehicle accidents	E810-E829
Accidental falls	E880-E888
Injuries caused by animals & plants	E905-E906
Late effects of vehicle accidents	E9290

רשימת אבחנות לפי ICD-9-CM, המשך

אבחנה	ICD-9-CM
Suicide & self-inflicted injury	E950-E959
Homicide & injury purposely inflicted by others	E960-E969
Factors influencing health status & contact with health services	V01-V21, V24-V69, V72-V91
High risk pregnancy	V23
General medical examination	V70
Examination for suspected conditions not found	V71

רשימת אבחנות לפי ICD-10-CM

בתי החולים מדווחים בדרך כלל אבחנות פסיכיאטריות לפי ICD-10-CM:

אבחנה	ICD-10-CM
Other central nervous system diseases & disorders	F00
Psychotic disorders	F01-F06, F20-F23, F38, F84
Drug & alcohol abuse	F07, F55
Other neurotic, personality & other nonpsychotic mental disorders	F11-F19, F34, F40, F42-F45, F50-F51, F60-F80, F90-F99
Anxiety disorders	F41
Epilepsy	G40
Conditions originating in the perinatal period	P00-P96
Examination for suspected conditions not found	Z03

Additional diagnoses charts and tables can be found as follows:

- Leading diagnoses (all ages) – page 87
- Leading diagnoses (ages 0-4) – page 88
- Leading diagnoses (ages 0-17) – page 89
- Leading diagnoses (ages 18-21) – page 90
- Leading diagnoses (ages 22-44) – page 91
- Leading diagnoses (ages 45-64) – page 92
- Leading diagnoses (ages 65-74) – page 93
- Leading diagnoses (ages 75 and over) – page 94
- Visits by diagnosis and age (absolute numbers) – pages 95-97
- Visits by diagnosis and age (percent) – pages 98-100
- Leading diagnoses by hospital – pages 102-115
- Hospitalization rate by diagnosis – page 117
- Repeat visits by diagnosis within 30 days – page 118
- Repeat visits by diagnosis within 24 hours – page 119
- Repeat visits by diagnosis within 48 hours – page 120
- Medical referral rate by diagnosis – page 121
- Length of stay by diagnosis – page 122
- Length of stay by diagnosis for hospitalized patients – page 123
- Selected outcome measures by diagnosis (outline below) – pages 125-135

Diagnosis	Number of visits	Hospitalization rate	Medical referral rate	Repeat visits (1) (2)	Median length of stay (3) (4) (5)
-----------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------

- (1) 30 day repeat visit rate
- (2) 48 hour repeat visit rate
- (3) Median length of stay – all visits
- (4) Median length of stay – discharges
- (5) Median length of stay - hospitalizations

Seasonality of selected diagnoses – pages 138-141


Deaths

In 2015 there were 2,057 deaths registered in the ER, 0.07% of all visits, 0.09% of illness-related visits and 0.03% of injury-related visits.

Diagnoses

The top primary discharge diagnoses as measured by the ICD-9-CM code (see diagnoses list starting on page 120) were tabulated separately for each age group. The most common diagnoses recorded in the ER in 2015 were various symptom diagnoses, injuries and infections.


Leading diagnoses, 2015




Hospitalization Rates

Hospitalization rates from the ER have fallen in the last decade; 27% of non-maternity patients in 2015 compared to 32% in 2006. In 2015, a third (30%) of all ER patients were hospitalized, 27% of non-maternity patients, 32% of illness-related, 11% of injury-related and 48% of maternity patients. The percent of hospitalizations among patients with a medical referral is higher than among self-referrals. The hospitalization rate is high (32%) among babies under a year old and increases further from age 55. Two-thirds (61%) of patients aged 85 and over were hospitalized, half (53%) of patients aged 75-84 and 43% of patients aged 65-74. The lowest rate is among 18-21 year olds.


Hospitalization rate, 2006-2015



Hospitalization rate by age, 2015




Visits by visit cause, 2015




Visits by visit cause and patient age, 2015

Percent



Rate of injury-related visits, 2006-2015


Rate per 1,000 persons



Referrals to the ER

Two-thirds (69%) of visits to the ER in 2015 were medical referrals, 72% of illness-related visits and 60% of injury-related visits; an increase from 63%, 67% and 53% respectively in 2006.

Percent of visits with medical referral by visit cause, 2004-2013



Visit Cause


Two-thirds of visits (65%) in 2015 were illness-related visits, a quarter (22%) injury-related visits and 13% were maternity visits. Females aged 14-44 and aged 75 and over account for more illness-related visits than males, whereas males aged 64 and under account for more injury-related visits. Two-thirds (69%) of injury-related visits were injuries or other accidents, a fifth (19%) were traffic accidents, a tenth (10%) were work accidents and 3% were assaults. Two-thirds of visits due to each of assaults, work accidents, terror attacks and traffic accidents were aged 15-44. More than half of visits due to injuries and two-thirds of visits due to other accidents were boys aged 1-24.

Arrival Time


The number of ER visits is high between 10am-2pm and between 6-9pm, on Fridays and on Saturday evenings with the peak number of visits occurring on Sundays. The number of visits by children and young adults under 25 years is higher in the evening and of adults aged 65 and over is higher in the morning.

Visits by day of week and time of day, 2015

Absolute numbers




Percent of visits by patient age and time of day, 2015




Occupancy Rates

The occupancy rate in all ER departments was 112% in 2015 compared to 99% in 2012. The occupancy rate is highest between 2-5pm and lowest between 5-9am.

Occupancy rates by ER arrival time, 2012, 2015



Occupancy rates by month and year, 2012, 2015




Length of Stay


In 2015 the average duration of an ER visit was 3.79 hours and the median duration was 2.90 hours; an increase from 3.39 and 2.48 hours respectively in 2012. Visit length is longer during the morning shift than during the evening and night shifts. The median duration for hospitalized patients is higher (3.73) than for patients who were discharged (2.67). A fifth (22%) of ER visits were longer than five hours in 2015 compared to 17% in 2012. Visit length increases with age, the median duration for children aged 0-17 was 2.38 hours in 2015 compared to 3.80 hours for ages 65 and over.

Median visit length by discharge type, 2012, 2015

Non-maternity visits




Percent of visits longer than 5 hours by shift, 2015




Repeat Visits

The rate of repeat visits to the ER has been relatively stable in recent years. In 2015, a fifth (18%) of visits were repeat visits within 30 days; the rate for illness-related visits was 20% and for injury-related visits was 11%. The rate of repeat visits is high among those aged 55 and over and increases with age. The rate is also high among babies under one year and among young adults aged 18-21 years. The lowest rate of repeat visits is among youth aged 5-14. The rate of repeat visits is higher for males than for females except among those aged 15-44 years where the rate is higher for females.

Repeat visits within 30 days, 2006-2015



Repeat visits within 30 days by patient age, 2015



In 2015, 1.7 million people visited the ER at least once. Two-thirds (67%) visited once, a quarter (26%) visited two or three times and 7% visited four or more times (70%, 25% and 5% respectively for non-maternity visits). The average number of non-maternity visits per patient in 2015 was 1.5 visits.

A line graph titled "Percentage of people who have ever been married by age group and gender". The Y-axis represents the percentage from 0% to 60% in 10% increments. The X-axis shows age groups: 0, 1-4, 5-44, 55-44, 55-44, 55-44, 55-44, 55-44, 55-44, 55-44, 55-44, 55+, and 55+. Two data series are plotted: Female (orange line with circles) and Male (blue line with circles). Data points are labeled with their respective percentages.

Age Group	Female (%)	Male (%)
0	26%	28%
1-4	26%	27%
5-44	18%	19%
55-44	28%	30%
55-44	26%	31%
55-44	27%	29%
55-44	28%	29%
55-44	30%	33%
55-44	35%	37%
55-44	42%	45%
55+	47%	51%

The line graph displays the number of visits to a health professional across various age groups, categorized by the frequency of visits. The Y-axis represents the number of visits, ranging from 0 to 700. The X-axis shows age groups: 0, 1-4, 5-44, 55-77, 88-11, 22-44, 55-44, 55-44, 55-44, 55-44, 55-44, and 55+.


Four data series are plotted:

- All** (Black line with circles): Represents the total number of visits. It starts at approximately 340 for age 0, dips to around 110 for age 5-44, and then rises sharply to nearly 600 for the 55+ group.
- One visit** (Blue line with circles): Represents the number of visits where the patient had only one visit. It starts at approximately 250 for age 0, dips to around 100 for age 5-44, and rises to about 300 for the 55+ group.
- Two to three visits** (Orange line with circles): Represents the number of visits where the patient had two to three visits. It starts at approximately 80 for age 0, dips to around 20 for age 5-44, and rises to about 210 for the 55+ group.
- Four and more visits** (Brown line with circles): Represents the number of visits where the patient had four or more visits. It remains consistently low, starting at approximately 10 for age 0 and rising slightly to about 70 for the 55+ group.


Age Group	All	One visit	Two to three visits	Four and more visits
0	340	250	80	10
1-4	190	140	40	10
5-44	110	100	20	10
55-77	130	100	20	10
88-11	230	160	60	10
22-44	190	130	40	10
55-44	170	120	30	10
55-44	180	120	40	10
55-44	200	130	50	10
55-44	240	150	70	20
55-44	370	200	110	40
55+	580	300	210	70

Rate of non-maternity ER visits by patient age, 2006-2015

Rate per 1,000 persons




Distribution of non-maternity visits by age and gender, 2015



Rate of non-maternity visits by gender, 2012, 2015

Age adjusted rate per 1,000 persons




Trends in ER Visits


In 2015 there were 2.9 million visits to the ER; 2.6 million excluding maternity visits. The age adjusted rate of visits has decreased between 2006 and 2015, 353 per 1,000 persons in 2015 compared to 362 in 2012. The rate decreased by 8% for those aged 18-21 years, by 6% for children aged 1-14 years, by 7% for those aged 65-74 years compared to an increase of 10% for those aged 85 and over. The rate of ER visits is high among babies under one year of age, among adults aged 18-34 years and among the elderly aged 65 and over. The lowest rate of visits is found among children and adolescents aged 5-17 years. The rate of total visits is higher for males than females, 32 per 100 persons compared to 29 respectively in 2015. The rate for males is higher among all ages except for those aged 22-34 years.

Rate of ER visits, 2006-2015

Age adjusted rate per 1,000 persons



Percent change in the rate of total visits by age, 2015/2012



Emergency Room Visits in Israel, 2015


Summary

The publication "Emergency Room Visits, 2015" covers different aspects of visits to Emergency Rooms (ER) in the 28 acute care hospitals in Israel in 2015 with comparisons to prior years. The publication presents trends in licensed beds and trends of ER visits in the last decade based on reporting by the hospitals (excluding hospitals in East Jerusalem). The publication includes data on visit and patient characteristics in all ERs.

Licensed Beds

At the end of 2015 there were 1,195 licensed ER beds; of these 1,176 were in acute care hospitals. The number of licensed beds per capita in acute care hospitals fell to 0.139 per 1,000 persons compared from 0.143 in 2012.

Licensed beds in acute care hospitals per 1,000 persons, 2006-2015



State of Israel
Ministry of Health
Health Information Division

Emergency Room Visits

Summary

2015



Ziona Haklai
Jill Meron, Gali Shlichkov, Dr Yael Applebaum, Miriam Aburbeh

Jerusalem
November 2016