



ראש שירותי בריאות הציבור

Director of Public Health Services

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

א' בטבת, התשפ"א  
16 דצמבר 2020  
479380320  
(בתשובה נא ציין מספרנו)  
מס' תיק – 21

## דף מידע לחיסון נגד נגיף קורונה החדש Coronavirus (COVID-19) – vaccines

### **תרכיב נגד COVID-19 BNT162b2 תוצרת, Pfizer BioNTech החיסון**

הנך מועמד/ת לקבל חיסון זה כדי למנוע תחלואה בנגיף קורונה החדש. להלן מידע אודות החיסון, התועלת הצפויה ותופעות הלוואי האפשריות.

חיסון זה, המסתייך לקבוצת חיסוני mRNA, מכיל חלקיקים שיוצרו במעבדה, שבאמצעותם התאים יוכלו ליצר חלבון שדומה לחלבון הקיים במעטפת נגיף הקורונה. חלקיקים אלו עטופים במעטפה המורכבת מחלקיקי שומן זעירים שעוזרים לתגובה החיסונית. בעזרת טכנולוגיה זו, המערכת החיסונית שלך תייצר נוגדנים לנגיף הקורונה ובמידה ותיחשף לנגיף, מערכת החיסון שלך תופעל כנגד הנגיף ובסיכוי של מעל 95% תמנע את ההדבקה.

### **החיסון הוא בטוח ויעיל במניעת המחלה.**

החיסון אינו מכיל נגיפים, או חלקי נגיפים. החיסון מופק במעבדה כדי לגרום לתגובה חיסונית של המתחסן כנגד הנגיף. בנוסף, חלקיקי החיסון מתפרקים ונעלמים מהגוף זמן קצר לאחר חדירתם לתא. החיסון אינו יכול לגרום למחלת COVID 19 או להשפיע על הקוד הגנטי של גוף האדם.

### **מי יכול לקבל את החיסון?**

את החיסון יקבלו, בשלב הזה, בני 16 שנים ומעלה. זאת מאחר והחיסון טרם נבדק על ילדים מתחת לגיל 16 או על נשים הרות ומניקות.



ראש שירותי בריאות הציבור

Director of Public Health Services

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## מי לא יקבל את החיסון בשלב זה – ההנחיות נכון להיום הן:

1. מתחת לגיל 16
2. אנשים עם רקע של תגובה אלרגית חמורה מידית לחיסון, תרופה או מזון כלשהו. הורית נגד זו חלה גם על כל מי שהונחה על ידי גורם רפואי להחזיק מזרק אפינפרין (אפיפן).
3. מחלימים מ COVID 19
4. נשים הרות ומניקות. (לגבי מצבים מיוחדים, בהם התועלת בחיסון עשויה להיות גבוהה, יש להתייעץ עם רופא).

## החיסון ניתן בשתי מנות במרווח מינימום של 21 יום בין המנות.

**דרך מתן החיסון:** זריקה לתוך שריר הזרוע (כמו מרבית החיסונים)

**תופעות לוואי אפשריות:** לחלק ממקבלי החיסון יתכנו תופעות לאחר קבלת החיסון, אלו לרוב תופעות קלות וחולפות כגון - אודם וכאב באזור ההזרקה, עליית חום, צמרמורת, עייפות, כאבי ראש, חולשה, כאבי שרירים, כאבי פרקים, בחילות ולימפאדנופתיה (הגדלת קשריות לימפה). חשוב להדגיש, תופעות אלרגיות, לרבות תגובה אלרגית מידית מסוג אנפילקטי, הן נדירות ביותר.

**יש לציין שמרבית תופעות הלוואי חולפות בין יום ליומיים אחרי מתן החיסון ושכיחות מעט יותר במנה השנייה.**

חשוב להמתין במרפאה 15 דקות לאחר מתן החיסון.

למקבלי המנה השנייה של החיסון, תינתן תעודה על קבלת החיסון ("הפנקס הירוק"). למחזיק תעודה זו יהיה סטטוס הדומה למי שמוגדר כמחלים, לרבות פטור מבידוד וכניסה למקומות המוגדרים כ"אי ירוק". סטטוס זה ייכנס לתוקף תוך 7 יום ממועד קבלת המנה השנייה (לא כולל יום מתן החיסון).

בכל שאלה על תופעות לוואי ניתן לפנות לרופא המטפל.

למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר משרד הבריאות: <https://gov.il/covid19-vaccine>