


**הנחיות חדשות לביצוע מוניטורים במחלקת יולדות**

1 message

Thu, Jan 30, 2020 at 1:54 PM

<YPerlitz@poria.health.gov.il> **יורי פרליץ**



במטרה להקל על עומס ביצוע מוניטורים במחלקות יולדות וחדר לידה הוחלט:

1. PGE2:

- א. לפני הכנסת PGE2 יש לבצע מוניטור, לוודא שאין צירים ושאינן חשד למצוקה עוברית.
- ב. לאחר הכנסת ה PGE2 אין צורך בביצוע מוניטור, אלא כשמתחילים צירים.

2. קטטר פולי:

במידה ובוצע מוניטור במשך היום והוא תקין אין צורך בביצוע מוניטור מיד לפני או לאחר הכנסת הקטטר, אלא כשמתחילים צירים.

דגשים:

יש לבצע מוניטור בכל מקרה שהיולדת מתלוננת על הפחתה בתנועות עובר, צירים, או כל מקרה אחר שהרופא חושב שיש חשש למצוקה עוברית.

באופן רוטיני יש לבצע מוניטור אחד ליום לכל יולדת המאושפזת במחלקת יולדות. אם המוניטור בוצע בקבלה הרי שאין צורך לחזור עליו. רק במקרים חריגים, כגון פיגור בגדילה עם הפרעה בזרימות יש להגביר את תדירות ביצוע המוניטורים.

בברכה,

**ד"ר יורי פרליץ**

**מנהל היחידה להריון בסיכון גבוה**

**המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה**

מחלקת יולדות, בית חולים פוריה, תל אביב

Width: 1366

טלפון: 04-6652309

נייד: 050-6267439

[yperlitz@poria.health.gov.il](mailto:yperlitz@poria.health.gov.il)

