

מרפאת כאב

הסבר לפני ביצוע פעולות פולשניות בדימות

מטופל/ת יקר/ה, נקבע עבורך טיפול פולשני בדימות – הזרקה תחת שיקוף רנטגן ואולטרסאונד.

הזרקות תחת שיקוף רנטגן - מתבצעות על ידי רופא מומחה. מטרת הטיפול - שיכוך כאב, אבחון מדויק של מקור הכאב או שניהם. הטיפול מתבצע בדרך כלל בהרדמה מקומית, ומתן תרופות לתוך הוריד לצורך טשטוש (סדציה). במהלך הפגישה יבוצע ניטור מתאים של סימנים חיוניים.

הנחיות כלליות לפני הפעולה:

- עליך להודיע לרופא ולאחות אם הנך רגיש/ה לתרופות או למזון (אלרגיה).
- במידה ואת/ה נוטל/ת תרופות לדילול דם (נוגדות קרישה) יש להפסיקן, אחרת לא נוכל לבצע את ההזרקה.
- חובה להיוועץ עם רופא משפחה/ קרדיולוג/ נירולוג לצורך קבלת אישור להפסקת לקיחת התרופה.

שם התרופה	יש להפסיק את נטילת התרופה לפני תחילת הטיפול בהתאם לזמן המצוין
Clopidogrel (Plavix*, Clopidexel*)	7 ימים
Prasugrel (Effient*)	7-10 ימים
Ticlopidine (Ticlidil*)	10-14 ימים
Apixaban (Eliquis*)	3-5 ימים
Rivaroxaban (Xarelto*) Edoxaban (Irixiana*)	3 ימים
Dabigatran (Pradaxa*)	4-6 ימים (בהתאם לתפקוד הכלייתי)
Warfarin (Coumadin*) Acenocoumarol (Sintrom*)	5 ימים יש לבצע INR 24 שעות לפני הפעולה
Enoxaparin (Clexane*)	24 שעות

- עליך להימנע מאכילה 6 שעות לפני הפעולה. מותרת שתיית מים, תה, קפה ללא חלב ומיצים צלולים. ביום הפעולה יש לקחת את התרופות הקבועות פרט לתרופות לטיפול בסוכרת.
- יש להגיע עם מלווה. אין לנהוג 8 שעות לאחר הטיפול.
- זמן הטיפול כחצי שעה עד שעה. לאחר מכן תועבר/י להתאוששות. משך השהייה במרכז הרפואי כשעתיים.

הוראות לאחר הטיפול:

1. מומלצת מנוחה ביום הטיפול, אך אין הגבלה ממשית בפעילות ובתפקוד. התפקוד בהתאם ליכולתך.
2. ייתכן כאב מקומי, תחושות שונות במקום ההזרקה או הגברה מסוימת של הכאב המקורי בגב או בגפה ביומיום הראשונים לאחר הטיפול.
3. ניתן ורצוי לקחת תרופות נגד כאב, במקרה הצורך גם לאחר הטיפול.
4. ההקלה בכאב היא הדרגתית ולא חייבת להיות מלאה. במקרים רבים יש צורך ביותר מטיפול אחד.
5. ניתן להוריד את התחבושות לאחר מספר שעות, מותר להתקלח חופשי ללא הגבלות.

לידיעתך, ניתן לעדכן או לבטל את התור בווטסאפ 052-7241043, בטלפון 03-5028111 או בפקס 03-5028475.

בברכת החלמה מהירה,
צוות מרפאת כאב

מרפאת כאב

טל: 03-5028111 | פקס: 03-5028475 | ווטסאפ: 052-7241043