



סימוכין: 1161318221

דף תשאול המתחסן האלרגי לקראת מתן תרכיב BNT162B2

תוצרת חברת Pfizer-BioNTech

אלרגיה מיידי (מתווכת IgE) הינה תגובה ייחודית לאלרגן allergen-specific. לאור זאת, הסיכון לתגובה אלרגית לחיסון הקורונה אינו מוגבר ברוב המטופלים עם רקע אלרגי. האלרגנים הפוטנציאליים הינם חומרים הנמצאים בחיסון עצמו. עד כה, תוארו מקרים בודדים של אלרגיה לחיסון, חלקם ללא רקע אלרגי ידוע. לפיכך, בכל מקום בו מתבצע החיסון יש לוודא הימצאות של ציוד המתאים לטיפול באנפילקסיס.

יש לברר עם המטופל את גורם האלרגיה טרם החלטה על חיסון:

1. החיסון מותר, יש להשגיח 15 דקות לאחר החיסון

- קיום של רגישות לאלרגנים הבאים:
- אלרגנים נשאפים (קרדית אבק בית, חיות מחמד, אבקני צמחים)
- מזון
- תרופות בבליעה (כדורים, סירופ)
- לטקס
- חומר ניגוד רנטגני (בבליעה או בהזרקה)
- עקיצת דבורניים
- אורטיקריה כרונית ספונטנית, ללא גורם אלרגי ידוע
- G6PD

2. החיסון מותר, יש להשגיח 30 דקות לאחר חיסון

תגובה לאחד האלרגנים הנ"ל הייתה קשה (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת לחץ דם).

המטופל/ת נושא/ת מזרק אפיפן בשל רגישות לאחד האלרגנים הנ"ל.

תגובה קשה לתרופה מוזרקת אחת או יותר.

אנפילקסיס מסיבה לא ידועה או אבחנה של מסטוציטוזיס סיסטמי.



שרותי בריאות הציבור
אגף לאפידמיולוגיה
Division of Epidemiology

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

3. יעוץ מומחה באלרגיה לפני החלטה לגבי מתן התרכיב

אלרגיה לפוליאיתילן גליקול (PEG) שאינה מסוג אנפילקסיס.

4. לא לחסן

תגובה אנפילקטית לאחר מנה של חיסון קורונה בעבר או שידוע על אלרגיה מסוג אנפילקסיס לפוליאיתילן גליקול (PEG) או לאחד ממרכיבי החיסון האחרים.

נכתב בהתאם להמלצות האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית.