



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
המרכז הלאומי לבקרת מחלות

דו"ח ניטור תחלואה מנגיפי נשימה

שבוע 32 המסתיים בתאריך 10/8/24

סיכום: במהלך שבוע 32, שיעור הפניות הגולמי בשל תחלואה-דמוית שפעת מצוי בטווח שיעורי הפניות הנצפים בין עונות השפעת. ירידה במספר ובאחוז החולים המאושפזים החדשים עם בדיקה חיובית לנגיף הקורונה.

ניטור קליני:

מרפאות בקהילה: שיעור הפניות הגולמי בשל תחלואה-דמוית שפעת מצוי בטווח שיעורי הפניות הנצפים בין עונות השפעת. נמשכת הירידה בשיעורי הפניות הגולמיים בשל זיהום בדרכי הנשימה העליונות ובשל דלקת ראות.

בתי חולים ("שירותי בריאות כללית"):

עלייה באחוז הביקורים בשל דלקת ראות במיון ילדים. במיון פנימי- ירידה קלה באחוז הביקורים. ללא שינוי משמעותי באחוז הביקורים במיון ילדים בקרב תינוקות עד גיל שנתיים בשל ברונכיוליטיס.

מעבדה:

בתי חולים ("שירותי בריאות כללית"):

במהלך שבוע 32, דווחו בקרב מאושפזים בבתי חולים של "שירותי בריאות כללית":


- ❖ נגיפי השפעת – 3 מקרים חיוביים חדשים לשפעת מסוג A.
- ❖ RSV – 7 מקרים חיוביים חדשים.
- ❖ נגיף הקורונה – 62 מקרים חדשים, המהווים 6.6% מסך הדגימות שנבדקו.

1. פניות למרפאות בקהילה בשל תחלואה דמוית-שפעת (ILI)


שיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל תחלואה דמוית-שפעת דומה לטווח השיעורים הנצפים בין עונות השפעת (תרשימים 1+2). מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה דומה.

תרשים 1: שיעור פניות בשבוע בשל תחלואה דמוית-שפעת, 2019-2024 בהשוואה לממוצע רב-שנתי

*נא לשים לב שנתוני שבועות 20-32 משויכים לעונת 2024/2025



תרשים 2: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל תחלואה דמוית-שפעת, 2018-2024




2. פניות למרפאות בקהילה בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות (URI)

נמשכת הירידה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות. הירידה מתבטאת בעיקר בגילאי 11-2 שנים. בקרב שאר קבוצות הגיל - לא נצפה שינוי משמעותי בשיעור הפניות. שיעור הפניות הגולמי מצוי עדיין מתחת לממוצע הרב-שנתי (תרשימים 3+4). מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה מעט שונה: הירידה בשיעור הפניות נצפתה בכל קבוצות הגיל.


תרשים 3: שיעור פניות בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, 2019-2024 בהשוואה לממוצע הרב-שנתי

*נא לשים לב שנתוני שבועות 20-32 משויכים לעונת 2024/2025





תרשים 4: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, 2018-2024




3. פנייה למרפאות בקהילה בשל תחלואה בדלקת ריאות

בשבוע האחרון, נצפתה ירידה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל דלקת ריאות (תרשים 5). הירידה מתבטאת בגילאי 0-11 שנים. בשאר קבוצות הגיל, לא נצפה שינוי משמעותי (תרשים 6). שיעור הפניות הגולמי המשיך להימצא מעל לממוצע הרב-שנתי (תרשים 5). מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה מעט שונה: הירידה בשיעור הפניות מתבטאת בעיקר בקרב בני 0-2 שנים.


תרשים 5: שיעור פניות בשל דלקת ראות, שנים 2019-2024 בהשוואה לממוצע רב-שנתי

*נא לשים לב שנתוני שבועות 20-32 משויכים לעונת 2024/2025






תרשים 6: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל דלקת ראות, שנים 2018-2024



4. פניות למרפאות בקהילה בשל כלל האבחנות, "מכבי שירותי בריאות"

בשבוע 32, נצפתה ירידה בשיעור הפניות של כל קבוצות הגיל (למעט קשישים בני 65 שנים ומעלה) בשל כלל האבחנות למרפאות "מכבי שירותי בריאות" (תרשים 7).

תרשים 7: שיעור פניות למרפאות בקהילה בשל כלל האבחנות לפי גיל, שנים 2018-2024



* התרשים בחלון שבפינה הימנית העליונה מציג שיעור פניות גולמי למרפאות בשל כלל האבחנות, 2018-2024.

5. ביקורים בחדרי מיון בבתי החולים של "שירותי בריאות כללית" בשל תחלואה


בדלקת ריאות (מבוסס על מחסן הנתונים של משרד הבריאות המנוהל באגף המידע)

במהלך שבוע 32, נצפתה עלייה באחוז הביקורים בשל דלקת ראות במיון ילדים, בהשוואה לשבוע הקודם והוא מצוי עדיין מעל לממוצע הרב-שנתי. במיון פנימי, נצפתה ירידה קלה באחוז הביקורים בהשוואה לשבוע הקודם והוא נע סביב הממוצע הרב-שנתי. (תרשימים 8+9).

תרשים 8: אחוז הביקורים בשבוע במיון פנימי בשל דלקת ראות, בתי חולים כללית,

בשנים 2019-2024 בהשוואה לממוצע הרב-שנתי

* נא לשים לב שנתוני שבועות 20-32 משויכים לעונת 2024/2025






תרשים 9: אחוז הביקורים בשבוע במיון ילדים בשל דלקת ראות, בתי חולים כללית,

בשנים 2019-2024 בהשוואה לממוצע הרב-שנתי

*נא לשים לב שנתוני שבועות 20-32 משויכים לעונת 2024/2025




6. ביקורים בחדרי מיון בבתי החולים של "שירותי בריאות כללית" של תינוקות

מתחת עד גיל שנתיים בשל בرونכיוליטיס (מבוסס על מחסן הנתונים של משרד הבריאות

המנוהל באגף המידע)

ללא שינוי משמעותי באחוז הביקורים של בני 0-2 שנים במיון ילדים בשל בرونכיוליטיס. אחוז הביקורים נמוך, ומתאים לתקופה שבין העונות (תרשים 10).

תרשים 10: אחוז הביקורים של תינוקות בני 0-2 שנים במיון ילדים בשל בرونכיוליטיס, בתי חולים כללית, בשנים 2018-2024 בהשוואה לממוצע הרב שנתי



7. מעבדה: דגימות לשפעת שנבדקו בבתי חולים הכלליים של "שירותי בריאות


כללית" בישראל

תרשים 11 מציג את תוצאות הדגימות לנגיפי השפעת בחולים המאושפזים בבתי החולים של "שירותי בריאות כללית" בישראל.

במהלך שבוע 32, דווח על 3 מקרים חיוביים חדשים לנגיף השפעת מסוג A בקרב מאושפזים (תרשים 11).

תרשים 11: מקרים חיוביים לנגיפי השפעת במאושפזים בבתי חולים של "שירותי בריאות כללית", 2022-2024

*המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.




8. מעבדה: דגימות ל-RSV שנבדקו בבתי חולים הכלליים של "שירותי בריאות

כללית" בישראל

במהלך שבוע 32, דווח על 7 מקרים חיוביים ל-RSV בקרב מאושפדים בבתי חולים של "שירותי בריאות כללית" בישראל (תרשים 12).

תרשים 12: מקרים חיוביים לנגיפי RSV במאושפדים בבתי חולים של "שירותי בריאות כללית", 2022-2024




9. נתונים מדגימות מאושפזים שנבדקו לנגיפי נשימה במעבדה המרכזית

לנגיפים במרכז הרפואי שיבא, תל השומר

תרשים 13 מציג את אחוז הדגימות החיוביות לנגיפי דרכי הנשימה ממאושפזים שנבדקו במעבדה המרכזית לנגיפים, במרכז רפואי שיבא, נכון לשבוע 32. הנגיף הנפוץ ביותר בדגימות שנבדקו בשבועות האחרונים, הוא נגיף הרינו (Rhinovirus).

תרשים 13: אחוז הבדיקות החיוביות לנגיפי דרכי הנשימה ממאושפזים שאובחנו במעבדה המרכזית לנגיפים, במרכז רפואי שיבא, תל השומר, 2024-2021




8. מאושפזים עם דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים כלליים של

"שירותי בריאות כללית"

תרשים 14 מתאר את מספר ואחוז המקרים החדשים לשבוע עם דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים של שירותי בריאות כללית. בשבוע 32 דווחו 62 מקרים חדשים, לעומת 110 בשבוע הקודם. אחוז הדגימות החיוביות היה 6.6%, לעומת 11.7% בשבוע הקודם.

תרשים 14: מספר המאושפזים החדשים החיוביים ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים כלליים של שירותי בריאות כללית, 2022-2024

*הנתונים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.




9. מצב התמותה בישראל

9.1. תמותה מכלל הסיבות (הנתונים מעודכנים לשבוע 29 המסתיים ב-20/7/2024)

נכון לשבוע 29 שהסתיים ב-20/7/2024, שיעור הפטירות מכלל הסיבות דומה לממוצע הרב-שנתי.


תרשים 15: שיעור פטירות כלל ארצי, 2019-2024 בהשוואה לממוצע רב שנתי



9.2 תמותה כתוצאה מדלקת ראות (הנתונים מעודכנים לשבוע 30 המסתיים ב-27/7/24)

נכון לשבוע 30, אחוז התמותה מדלקת ראות מצוי בתחום הצפי העונתי (תרשים 16).

תרשים 16: אחוז מקרי מוות מדלקת ראות מכלל מקרי המוות, 2019-2024, בהשוואה לצפי עונתי רב-שנתי



10. תמונת מצב בעולם- שפעת

חצי הכדור הצפוני

ארגון הבריאות העולמי WHO: על פי הדו"ח האחרון המעודכן עד ל-28/7/2024¹, במדינות

ממחגות, פעילות השפעת מצויה ברמה נמוכה האופיינית לתקופה שבין העונות¹.

במקביל, נמשכת פעילות השפעת במס' מדינות באזורים הבאים¹:

❖ מרכז אמריקה והקאריביים, מערב אפריקה, צפון אירופה - A/H3N2.

❖ דרום מזרח אסיה - A(H1N1)pdm09.

❖ דרום אסיה, מרכז אפריקה- פעילות משולבת של A/H3N2 ו-A(H1N1)pdm09¹.

ארצות הברית CDC: נכון לשבוע 31 שהסתיים בתאריך 3/8/2024, דווח על פעילות שפעת נמוכה

ברמה הלאומית².

אירופה ERVISS: נכון לשבוע 30 שהסתיים בתאריך 4/8/2024, דווח על שיעורי תחלואה נשימתית

גבוהים ב-2 מדינות מתוך 19 ברחבי אירופה. פעילות השפעת ממשיכה להיות נמוכה, והיא נמצאת

מתחת לסף האפידמי³.

חצי הכדור הדרומי

ארגון הבריאות העולמי WHO: על פי הדו"ח האחרון המעודכן עד ל-28/7/24¹, פעילות השפעת

ממשיכה להיות גבוהה במספר מדינות בדרום אמריקה, מזרח אפריקה ואוקיאניה¹. פרוט לפי אזורים,

מראה את פעילות זני השפעת:

❖ דרום אמריקה הטרופית ואוקיאניה - A/H3N2.

❖ מזרח אפריקה ודרום אמריקה הממוזגת - A/H1N1pdm09¹

מקורות מידע (שפעת):

1. [Global Respiratory Virus Activity Weekly Update N° 487 \(who.int\)](https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity-weekly-update-n-487)

2. Weekly U.S. Influenza Surveillance Report. <https://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm>

3. <https://erviss.org>

11. תמונת המצב בעולם – COVID-19

ארגון הבריאות העולמי WHO: על פי הדו"ח האחרון המעודכן עד ל-28/7/2024, פעילות נגיף ה-SARS-CoV-2 גבוהה ברוב הארצות המדווחות בצפון אירופה, בדרום-מערב אירופה, ובמספר ארצות במרכז-אמריקה והקריביים, דרום-אמריקה הטרופית, אסיה המערבית, המזרחית והדרומית ובדרום-מזרח אסיה. עליה בפעילות הנגיף דווחה במספר ארצות באירופה, ובאסיה המערבית, המזרחית והדרומית¹.

ארצות הברית CDC: עפ"י דיווח המעודכן ל-3/8/2024, דווח על 17.6% דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 בשבוע 31, עליה של 1.2% לעומת שבוע 30. אחוז הביקורים במחלקות לרפואה דחופה עמד על 2.3% בשבוע 31, בהשוואה ל-2.2% בשבוע שקדם לו (עליה של 4.1%)².

ווריאנטים: ברמה הגלובלית, ווריאנט האומיקרון הינו הדומיננטי ביותר, כאשר מתוכו תתי-ווריאנטים JN ו-JN קפ וגזרותיהם הם הנפוצים ביותר (ראה טבלה 1).

טבלה 1 : אחוז תתי-ווריאנטים דומיננטיים במדינות שדיווחו ריצוף גנומי של SARS-CoV-2³

(על סמך הנתונים המעודכנים במאגר המידע³ ב-10/8/24, הנכונים ליולי 2024)

KP.2.3 (%)	KP.3.3 (%)	KP.3.2 (%)	KP.3.1.3 (%)	KP.3.1.1 (%)	KP.3.1 (%)	JN.1.8 (%)	JN.1.16.1 (%)	JN.1.16 (%)	JN.1 (%)	
				24	19					אנגליה
			24	18	15					דנמרק
	15			25					14	גרמניה
				73						ספרד
17				20						ארצות הברית
						10	11	20	10	ישראל
	10	13			23					אוסטרליה

מקורות מידע (COVID-19):

1. [Global Respiratory Virus Activity Weekly Update N° 487 \(who.int\)](https://www.who.int/news-room/feature-stories/global-respiratory-virus-activity-weekly-update-n-487)



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ICDC – Israel Center for Disease Control

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

2. [COVID Data Tracher CDC https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#maps_percent-covid-ed](https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#maps_percent-covid-ed)

3. <https://www.gisaid.org>