



מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה
מסמך מספר 135


מומלץ להגביר את מספר הבדיקות ולשפר את האכיפה כדי לודא שהתפשטות המגיפה בבאקה אל-גרביה וג'ת נעצרת

1. נוכח ההתפשטות המחודשת של מגפת הקורונה בבאקה אל-גרביה ובג'ת בשבועות האחרונים, בוצע ניתוח של נתוני התחלואה באזור.
2. **באקה אל-גרביה** – החל מה-10 ביוני נדבקו 48 איש (נכון ל- 22 ביוני) וישנם כיום 44 חולים פעילים בעיר (15 חולים ל-10,000 איש). בסה"כ נבדקו 1,068 איש מאז ה-10 ביוני ושיעור הבדיקות החיוביות הממוצע בתקופה זו עומד על **7.33%**. רוב הנדבקים הם צעירים (82% מתחת לגיל 50) ורק 2% הם מעל לגיל 70. מחקר אפידמיולוגי אודות 29 מהנדבקים מעלה כי רובם המכריע (76%) נדבקו בעקבות מפגש ביתי/אירוע משפחתי וכ-10% נדבקו במוסדות השכלה. יצוין, כי **בשלושת הימים האחרונים זהו 6 חולים חדשים בלבד, אך חשוב לציין כי מספר הבדיקות היה יחסית נמוך (192 בדיקות, ממוצע של 64 בדיקות ליום) (ראו נספח א').**
3. **ג'ת** – החל מה-26 במאי נדבקו 19 איש (נכון ל-22 ביוני) וישנם כיום 18 חולים פעילים בעיר (14 חולים ל- 10,000 איש). בסה"כ נבדקו 332 איש מאז ה-26 במאי ושיעור הבדיקות החיוביות עומד על 5.7%. יצוין, כי בימים האחרונים (מאז ה- 18 ביוני) **זהו בישוב 9 חולים ושיעור החיוביים הוא 12%**. רוב החולים (כ- 70%) הם מתחת לגיל 50 ואין חולים מעל לגיל 70. מחקר אפידמיולוגי על אודות 11 מהנדבקים מעלה, כי רובם המכריע (91%) נדבקו בעקבות מפגש ביתי/מגע עם קרובי משפחה ו-9% נדבקו במוסדות השכלה (ראו נספח ב').
4. **לאור נתוני התחלואה באזור, מומלץ להגביר את מספר הבדיקות - כדי להבין האם המחלה ממשיכה להתפשט בישובים אלו; לבצע הסברה ייעודית המותאמת לאוכלוסייה - בדגש על חשיבות הבידוד וההתנהלות במרחב הביתי; וכן להגביר את מאמצי האכיפה של נהלי הבידוד וההתנהלות במרחב**

הציבורי. באופן כללי, במקרה של התפרצות המגפה בישוב כלשהו, **מומלץ להגביר את היקף הבדיקות בישובים סמוכים כדי למנוע התפרצות אזורית.**

נספח א'


מגמות התחלואה בבאקה אל גרביה¹



¹ נכון ל- 22 ביוני כחצות.

נספח ב'

מגמות התחלואה בג'ת²



² נכון ל- 22 ביוני בחצות.

מקורות

נתוני משרד הבריאות