

רשימת תרופות וטרינריות להוספה למזון לבעלי חיים - מעודכן ל-24.06.2021 - לרשימה המלאה והעדכנית יש לבדוק במאגר התרופות (ראו https://data.health.gov.il/Drugs/index.html#/byDrug)											
מס"ד	שם מסחרי באנגלית	שם מסחרי בעברית	חומר פעיל	חומר פעיל נוסף	קבוצה תרופית	מין בע"ח בהתוויה	מינון ע"פ ההתוויה	ימי המתנה ע"פ ההתוויה	התווית נגד ואזהרות	תוקף רישום	מס' רישום
1	AMPROXINE 25 VETERINARY	אמפרוקסין 25 וטרינרי	AMPROLIUM	ETHOPABATE	אנטיביוטיקה - קוקסידיוסטטים	תרנגולות פטם	לטיפול: הוסף 1000ג' לטון תערובת במשך 5 ימים למניעה: הוסף 500ג' לטון תערובת	2 ימים	אין להשתמש במזון המכיל בנטוניט או ליגינין סולפט לא לשימוש במטילות	07-2020	079 59 92104 00
2	AUROFAC 200 G VETERINARY	אורופאק 200ג' וטרינרי	CHLORTETRACYCLINE		אנטיביוטיקה	חזירים	חזירים: 2 ק"ג אורופאק 200 לכל טונה מזון מעורב לחזירים יונקים או מזון לגידול חזירונים, מספוא ייחודי לפיטום חזירים	10 ימים	שימוש בו זמנית עם קלציום חלב מלא וברזל עלול להפחית מיעילות התכשיר.	03-2024	082 27 91865 00
						תרנגולות	תרנגולות: 2.5 ק"ג אורופאק 200 לכל טונה מספוא ייחודי לאפרוחים, מספוא ייחודי לתרנגולות צעירות, מספוא ייחודי לפטמים, מספוא ייחודי למטילות, מספוא ייחודי לתרנגולות לרבייה.				
						עגלים	עגלים: 5 ק"ג אורופאק 200 לכל טונה מזון תחליף חלב לפיטום עגלים או מזון תחליף חלב לגידול עגלים. עגלים: 3 ק"ג אורופאק 200 לכל טונה קמח להאבסת עגלים.				
3	AVATEC 15% CC VETERINARY	אואטק קדם תערובת וטרינרי	LASALOCID SODIUM		אנטיביוטיקה - קוקסידיוסטטים - יונפורים	פטמים הודיים בקר כבשים	לא צוינו מינונים בתווית - ***קדם תערובת***	5 ימים	לא לשימוש במטילות לא לשימוש בבעלי חיים המייצרים חלב למאכל אדם. אסור לשימוש בסוסים אין להשתמש בו זמנית עם תרופות אחרות נגד קוקסידיוזיס. אין להשתמש בתכשיר במידה וידועה רגישות ללסלוסיד סודיום	05-2022	082 12 91483 00
4	AVATEC 150 GRAM VETERINARY	אואטק 150ג' וטרינרי	LASALOCID SODIUM		אנטיביוטיקה - קוקסידיוסטטים - יונפורים	פטמים	פטמים: יש לערבב היטב 500-830 גרם של אואטק 150 ג' וטרינרי בטון תערובת, על מנת להגיע למינון של 75-125PPM לסלוסיד סודיום בתערובת מזון סופית. המינון המקובל הוא 600ג' לטון, על מנת להגיע לריכוז של 90PPM לסלוסיד סודיום בתערובת	5 ימים	לא לשימוש במטילות לא לשימוש בבעלי חיים המייצרים חלב למאכל אדם. אסור לשימוש בסוסים אין להשתמש בו זמנית עם תרופות אחרות נגד קוקסידיוזיס. אין להשתמש בתכשיר במידה וידועה רגישות ללסלוסיד סודיום	05-2026	146 20 33397 00
						הודיים	הודיים: יש לערבב היטב 500-830 גרם של אואטק 150 ג' וטרינרי בטון תערובת, על מנת להגיע למינון של 75-125PPM לסלוסיד סודיום בתערובת מזון סופית. להאכיל עד גיל מקסימום של 16 שבועות				
5	BMD 10% VETERINARY	ב.א.מ.די 10% וטרינרי	BACITRACIN METHYLENE DISALICYLATE		אנטיביוטיקה - קוקסידיוסטטים	הודיים	הודיים: (לטיפול) ריכוז 10% BMD במזון 220PPM במשך 5-7 ימים מהופעת סימני המחלה תרנגולות פיטום: (לטיפול) ריכוז 10% BMD במזון 110-220PPM במשך 5-7 ימים מהופעת סימני המחלה תרנגולות פיטום: (למניעה) ריכוז 10% BMD במזון 55PPM	0 ימים		05-2028	083 70 92374 00
6	CLOPIDOL 25 VETERINARY	קלופידול 25 וטרינרי	CLOPIDOL		אנטיביוטיקה - קוקסידיוסטטים	תרנגולות פטם	יש לערבב 1/2 ק"ג מהתכשיר לטון תערובת לקבלת רמה של 125ג' לטון (125PPM).	5 ימים	אין להשתמש בעופות רבייה, הטלה ובהודיים	08-2021	081 80 92248 00
7	CLOPIDOL PLUS VETERINARY	קלופידול פלוס וטרינרי	CLOPIDOL	METHYL BENZOQUATE	אנטיביוטיקה - קוקסידיוסטטים	פטמים בלבד	יש לערבב 0.5 ק"ג מהתכשיר לטון תערובת	5 ימים	אין להשתמש בתכשיר בעופות רבייה, הטלה ובהודיים	02-2023	082 36 92291 00

אגף הפקוח על מזון לבע"ח
השירותים הווטרינריים

מס"ד	שם מסחרי באנגלית	שם מסחרי בעברית	חומר פעיל	חומר פעיל נוסף	קבוצה תרפויטית	בע"ח בהתוויה	מינון ע"פ ההתוויה	ימי המתנה ע"פ ההתוויה	התוויות נגד ואזהרות	תוקף רישום	מס' רישום
8	COXIDINE HUVEPHARMA 200 VETERINARY	קוקסידין יובפרמה 200 וטרינרי	MONENSIN SODIUM		אנטיביוטיקאים - פוליאטר - קוקסידיוסטטים - יונפורים	תרנגולות פטם הודים	תרנגולות: 500-625g של קוקסידין יובפרמה 200 וטרינרי לכל טונה מזון (100-125 מ"ג/ק"ג מונזין סודיום). הודים: 300-500g של קוקסידין יובפרמה 200 וטרינרי לכל טונה מזון (60-100 מ"ג/ק"ג מונזין סודיום).	1 ימים	מנות המכילות תחמיץ או מזון רטוב אחר יש לחשב לפי בסביב של 90% מזון יבש על מנת לקבל מינון נכון של מונזין. אין להשתמש במטילות ביצים למאכל אדם אין לתת להודים מעל גיל 16 שבועות אין לתת בו זמנית עם תכשיר רפואי המכיל טיאמולין וטרלאנדומיצין אלא מתום 7 ימים מסוף טיפול או עד 7 ימים לפני התחלת הטיפול מחשש לעיכובי גדילה חמורים ואף תמותה. אין לתת בזמנית עם אריתרומיצין, אולאנדומיצין, סולפהדומיטוקסין, סולפהדומידין, סולפנקווינוקסלין. אין לתת עם קוקסידיוסטט אחר אין לתת לעופות רבייה אין לתת את התכשיר לבע"ח ממשפחת הסוסיים (לדוג' סוסים, זברות, חמורים, ולכלבים	12-2023	083 98 92417 00
9	COXIRIL VETERINARY	קוקסיריל וטרינרי	DICLAZURIL		אנטיביוטיקאים - קוקסידיוסטטים	תרנגולות פטם הודים לפיטום	תרנגולות פטם: כמות מינימלית ומקסימלית של דיקלאזוריל במספוא: 0.8-1.2PPM. יש לערבב הודים לפיטום: כמות מינימלית ומקסימלית של דיקלאזוריל במספוא: 0.8-1.2PPM. יש לערבב 160-240g קוקסיריל וטרינרי ל-1 טון מספוא.	בשר פטם: 0 ימים בשר הודיים: 0 ימים	לא פורסם עלון לצרכן/רופא באתר משרד הבריאות התכשיר אינו מיועד לעופות מטילות אין לערבב את החומר הפעיל, דיקלאזוריל עם קוקסידיוסטטים אחרים חיי מדף לאחר ערבוב במספוא: 3 חודשים. חיי מדף בקדם תערוכת: 6 חודשים.	06-2022	158 95 34634 00
10	COXISTAC 12% GRANULAR VETERINARY	קוקסיסטק 12% גרנולר וטרינרי	SALINOMYCIN		אנטיביוטיקאים - קוקסידיוסטטים - יונפורים	תרנגולות פטם	יש לערבב 1/2 ק"ג מהתכשיר לטון תערובת לקבלת רמה של 60 ג' לטון (60PPM).	2 ימים	אין להשתמש בתכשיר בעופות רבייה, הטלה ובהודים אין לתת במזון לסוסים, עלול להיות רעיל לבע"ח אלו אין להכניס למזון המכיל קוקסידיוסטטים אחרים אין לתת טיאמולין כאשר נותנים תערובת עם קוקסידיוסטט, או לפחות יש להפריד 7 ימים בין תרופה אחת לשנייה	12-2023	083 96 92386 00
11	CYCOSTAT 66 G VETERINARY	סיקוסטט 66G וטרינרי	ROBENIDINE HYDROCHLORIDE		אנטיביוטיקאים - קוקסידיוסטטים	תרנגולי פטם תרנגולי הודו ארנבות	פטם: יש להוסיף 540-450g של סיקוסטט 66G לכל טונה מזון הודים: יש להוסיף 540-450g של סיקוסטט 66G לכל טונה מזון ארנבות: יש להוסיף 1000-750g של סיקוסטט 66G לכל טונה מזון	5 ימים	לא לשימוש במטילות אין לתת בו זמנית עם תכשירים אחרים למניעת קוקסידיוזיס.	03-2030	083 13 92348 00
12	CYGro GRANULES VETERINARY - CYGro 1% PREMIX VETERINARY	סייגרו גרנולות וטרינרי - סייגרו 1% קדם תערובת וטרינרי	MADURAMYCIN		קוקסידיוסטטים - יונפורים	פטמים והודיים	יש לערבב 500g סייגרו 1% קדם תערובת בתוך כל טונה אחת של מזון	7 ימים	אין להשתמש בעת ובעונה אחת יחד עם תרופות אנטיקוקסידיליות אחרות יש להרחיק את התכשיר מסוסים ודומיהם כי הוא עלול להיות רעיל לבע"ח אלו	08-2024	082 99 91512 00
13	DABICYCLINE 500 VETERINARY	דאביציקלין 500 וטרינרי	OXYTETRACYCLINE		אנטיביוטיקה	דגים במזון: דגים בלבד	לדגים: להגשה ע"י ערבוב במזון. המינון המומלץ: 150g דאביציקלין 500 לכל 1 טון דגים משקל חי. משך הטיפול 10 ימים.	400 ימי מעלה או 20 יום ב 23 מע"צ.	לא מומלץ להשתמש בו"ז עם תכשירים המכילים פניצילין	05-2021	072 62 91206 00
14	DECCOX 6% VETERINARY GRANULAR PREMIX FOR ANIMALS	דקוקס 6% וטרינרי קדם תערובת מגורעת	DECOQUINATE		אנטיביוטיקאים - קוקסידיוסטטים - קווינולונים	עגלים טלאים עזים פטמים	טיפול בעגלים טלאים עזים + מניעה בטלאים: יש להתאים ריכוז הדקווינאט על בסיס יומי לצריכה של 1מ"ג דקווינאט לכל ק"ג משקל גוף. משך מתן - 28 ימים. למניעה בעגלים, ולמניעה בטלאים דרך מתן לכבשה האם: יש להתאים ריכוז דקווינאט על בסיס יומי לצריכה של 0.5מ"ג דקווינאט לכל ק"ג משקל גוף. משך מתן - לא פחות מ 28 ימים. במקרים חריפים ניתן להכפיל את המינון. מתן לכבשה: לשימוש בכבשים בהריון. יש להתאים את ריכוז הדקווינאט על בסיס יומי לצריכה של 2.0מ"ג דקווינאט לכל ק"ג משקל גוף. משך מתן - טיפול יומי למשך 14 שבועות אחרונים להריון. טיפול בפטמים: לכל טונה מספוא להוסיף 0.5ק"ג דוקס 6% וטרינרי (לקבלת 30PPM דקווינאט). משך מתן - ייקבע ע"י רופא וטרינרי.	בקר: 1 ימים צאן: 1 ימים פטמים: 0 ימים	לא לשימוש בפרות חולבות אין לערבב הטיפול בתכשיר זה יחד עם טיפולים אנטיקוקסידיליים נוספים.	07-2024	082 95 92333 00

לשמות ליבכם, רשימת התרופות מתעדכנת במאגר התרופות
ככל שישנו חוסר התאמה בין הרשום בטבלה זו למידע במאגר, המידע במאגר הוא הקובע.

אגף הפקוח על מזון לבע"ח
השירותים הווטרינריים

מס"ד	שם מסחרי באנגלית	שם מסחרי בעברית	חומר פעיל	חומר פעיל נוסף	קבוצה תרפויטית	בע"ח בהתוויה	מינון ע"פ ההתוויה	ימי המתנה ע"פ ההתוויה	התוויות נגד ואזהרות	תוקף רישום	מס' רישום
15	DIAZIGAL PREMIX VETERINARY	דיאזיגל פרמיקס וטרינרי	SULPHADIAZINE	TRIMETHOPRIM	אנטיביוטיקה	תרנגולות	תרנגולות: 1 ק"ג לטונה תערובת למשל 5-7 ימים או לפי הוראות רופא וטרינרי דגים: 240 ג' דיאזיגל פרמיקס לכל טון משקל חי דגים למשך 10 ימים.	8 ימים דגים: 690 מ"י מעלה (30 ימים בטמפ' של 23 מע"צ)	אין להגיש לעופות בתקופת ההטלה	11-2023	082 28 92278 00
16	ELANCOBAN 200 VETERINARY PREMIX	אלנקובן 200 וטרינרי פרמיקס	MONENSIN SODIUM		אנטיביוטיקה - פוליאטר - קוקסידיוסטטים - יונפורים	פסמים תרנגולי הודו בקר	פסמים וחיידוש הטלה: יש לערבב 500-600 ג' של אלנקובן 200 וטרינרי בטון אחד של תערובת לקבלת 100-120 ג' מוננזין חומר פעיל לטון תערובת. תרנגולי הודו: יש לערבב 180-108 ג' של אלנקובן 200 וטרינרי בטון אחד של תערובת לקבלת 54-90 ג' מוננזין חומר פעיל לטון תערובת. בקר לפיטום במפסמות: 0.28-0.84 מ"ג חומר פעיל לקילוגרם משקל גוף ליום, עד מקסימום של 360 מ"ג מוננזין חומר פעיל לבעל חיים ליום. בקר במרעה: 0.28-0.84 מ"ג חומר פעיל לקילוגרם משקל גוף ליום, עד מקסימום של 200 מ"ג מוננזין חומר פעיל לבעל חיים ליום. במשך 5 הימים הראשונים אין לתת מעל 100 מ"ג חומר פעיל ליום, כאשר החומר מעורבב בלא פחות מחצי ק"ג פרמיקס או תערובת המכילה את התכשיר. בקר בוגר במפסמות או במרעה: 0.28-0.84 מ"ג חומר פעיל לקילוגרם משקל גוף ליום, עד מקסימום של 200 מ"ג מוננזין חומר פעיל לבעל חיים ליום. במשך 5 הימים הראשונים אין לתת מעל 100 מ"ג חומר פעיל ליום, כאשר החומר מעורבב בלא פחות מחצי ק"ג פרמיקס או תערובת המכילה את התכשיר. עגלים: 0.84-2.00 מ"ג חומר פעיל לקילוגרם משקל גוף ליום, עד מקסימום של 200 מ"ג מוננזין חומר פעיל לבעל חיים ליום.	0 ימים	אין להגיש לפרות חולבות התכשיר אינו מיועד למטילות אין להגיש את התכשיר לפרגיות שגילן גבוה מ-16 שבועות אסור בסוסים פרות וחמורים. פטאי בסוסים אין לתת כלורמפניקול או סולפונאמידים בזמן הטיפול מחשש להרעלה אין לתת בו זמנית עם תכשיר רפואי המכיל טיאמולין וטרלאנדומיצין אלא מתום 7 ימים מסוף טיפול או עד 7 ימים לפני התחלת הטיפול מחשש לעיכוב גדילה חמורים ואף תמותה. אין להשתמש באלנקובן 200 וטרינרי ביחד עם קוקסידיוסטט אחר.	10-2021	081 45 91803 00
17	FLUBENGAL 5% VETERINARY PREMIX POWDER	פלובנגל 5% וטרינרי	FLUBENDAZOLE		אנטיהלמינטיים	תרנגולות פסם תרנגולות מטילות	600 ג' פלובנגל לטונה תערובת (30PPM). יש להגיש את התכשיר במשך 7 ימים רצופים.	14 ימים לפני השחיטה ביצים: 1 ימים		03-2024	082 83 92321 00
18	GALFENICOL VETERINARY POWDER MEDICATED PREMIX	גלפניקול וטרינרי אבקה	FLORFENICOL		אנטיביוטיקה	דגים	10 מ"ג/ק"ג משקל גוף דגים /יום למשך 5-7 ימים.	4 ימים בטמפ' מים של לא פחות מ 23 מע"צ (או 92 מ"י מעלה).		09-2023	083 90 92394 00
19	KOFFODOX 50 VETERINARY	קופודוקס 50 וטרינרי	DOXYCYCLINE		אנטיביוטיקה	תרנגולות פסם עגלים טלאים	תרנגולות פסם: 15-30 מ"ג לק"ג משקל גוף עגלים: 5 מ"ג חומר פעיל לק"ג משקל גוף לראש ליום במשך 4 ימים. טלאים: 10 מ"ג חומר פעיל לק"ג משקל גוף לראש ליום במשך 4 ימים.	11 ימים תרנגולות פסם: 11 ימים עגלים: 4 ימים טלאים: 10 ימים	אין לטפל בו זמנית עם פניצילין.	01-2022	081 99 92265 00
20	KOFOZIN 25%	קופוזין וטרינרי	NICARBAZIN		אנטיביוטיקה - קוקסידיוסטטים	עופות פסמים	יש לערבב 0.5 ק"ג מהתכשיר לטון תערובת לקבלת 125 ג' לטון.	1 ימים	אין לתת לעופות רביה והטלה	01-2023	080 20 91237 01

אגף הפקוח על מזון לבע"ח
השירותים הווטרינריים

מס"ד	שם מסחרי באנגלית	שם מסחרי בעברית	חומר פעיל	חומר פעיל נוסף	קבוצה תרפויטית	בע"ח בהתוויה	מינון ע"פ ההתוויה	ימי המתנה ע"פ ההתוויה	התוויות נגד ואזהרות	תוקף רישום	מס' רישום
21	MADURA 1%	מדורה 1% וטרינרי	MADURAMYCIN		קוקסידיוסטטים- ינופורים	תרנגולות לפיטום ולתרנגולי הודו	יש לערבב 500g המתכשיר לטון תערובת לקבלת רמה של 5 ג' לטון (5PPM).	4 ימים	אין להשתמש בעופות רביה והטלה אין להכניס למזון המכיל קוקסידיוסטטים אחרים יש להרחיק את החומר מפני מסוסים - עלול להיות קטלני עבורם	07-2024	082 92 92334 00
22	MAXIBAN 160G PREMIX VETERINARY	מקסיבן 160g' פרמיקס וטרינרי	NICARBAZIN	NARASIN	אנטיביוטיקטים- קוקסידיוסטטים	תרנגולות פיטום	יש לערבב בתערובת הסופית כדלהלן: 0.5 ק"ג מקסיבן 160' עם 999.5 ק"ג תערובת מזון לקבלת ריכוז רצוי בתערובת להגשה של 40PPM נרזין + 40PPM ניקרבזין. או 0.625 ק"ג עם 999.375 ק"ג תערובת מזון לקבלת ריכוז רצוי בתערובת להגשה של 50PPM נרזין + 50PPM ניקרבזין.	0 ימים	אין להשתמש בתכשיר בתרנגולות מטילות התכשיר אסור לשימוש בסוסים. יש לנועם בהחלט גישה של סוסים פרדות וחמורים לתערובת מזון המכילה מקסיבן 160g' פרמיקס וטרינרי. אין להשתמש בתערובת להאכלת הודים, בזני עופות אחרים ובארנבות. לסוסים אין להשתמש בתכשירים המכילים טיאמולין וטרולאנדומיצין אלא מתום 7 ימים מסוף הטיפול במקסיבן 160g' פרמיקס וטרינרי. יש להמתין 7 ימים לפני השימוש במקסיבן 160g' פרמיקס וטרינרי ולא להשתמש בטיאמולין וטרולאנדומיצין. קיימת המלצה לא להשתמש בקבוצות החמורים: ינופורים, סולפונאמידים, אריתרומיצין ופורלידון ביחד עם מקסיבן 160g' פרמיקס וטרינרי. אין להשתמש במקסיבן 160g' פרמיקס וטרינרי בו זמנית עם קוקסידיוסטט אחר.	03-2022	079 98 92087 00
23	MAXUS 100 VETERINARY PREMIX	מקסוס 100 וטרינרי פרמיקס	AVILAMYCIN		אנטיביוטיקה	תרנגולי פטם	יש לערבב 0.3-0.15 ק"ג של מקסוס ב 1000 ק"ג של תוסף מספוא, כך שריכוז אבילמיצין יהיה 15-30PPM. יש לתת כמקור מזון יחיד לתקופה של 21 ימים עוקבים	בשר ושיירים: 0 ימים בשימוש לפי התוויה	אין להשתמש בתוספי מספוא המכילים חמורים ליצירת כופתיות (pellet binding agents), למעט אם החומר הוא Calcium lignosulfate	02-2025	163 88 35209 00
24	NICARBAZIN 25% VETERINARY	ניקרביזין 25% וטרינרי	NICARBAZIN		אנטיביוטיקטים- קוקסידיוסטטים	עופות פטמים	יש לערבב 0.5 ק"ג מהתכשיר לטון תערובת לקבלת 125g' לטון.	1 ימים	אין לתת לעופות רביה והטלה	01-2023	080 20 91237 00
25	OXYGAL VETERINARY	אוקסיגל וטרינרי	OXYTETRACYCLINE		אנטיביוטיקה	במזון: קרפיונים בלבד	קרפיונים: 75 מ"ג/ק"ג משקל גוף ליום למשך 10 ימים רצופים. מיועד כתוסף רפואי למזון לקרפיונים, לפי תחשיב של צריכת המזון היומית השווה ל-1% משקל גוף. עבור שיעור צריכת מזון של 1% ממשקל הגוף, יש לערבב 37.5g' תוספת אוקסיגל ב- 5 ק"ג תערובת. עבור שיעור צריכת מזון של 1% ממשקל הגוף, יש לערבב 187.5g' תוספת אוקסיגל ב- 25 ק"ג תערובת. עבור שיעור צריכת מזון של 1% ממשקל הגוף, יש לערבב 7.5 ק"ג תוספת אוקסיגל ב- 1 טונה תערובת.	400 ימי מעלה או 15 יום ב 23 מע"צ.	אין להשתמש בו זמנית עם פניצילינים	07-2024	080 93 92200 00

לתשומת ליבכם, רשימת התרופות מתעדכנת במאגר התרופות
ככל שישנו חוסר התאמה בין הרשום בטבלה זו למידע במאגר, המידע במאגר הוא הקובע.

אגף הפקוח על מזון לבע"ח
השירותים הווטרינריים

מס"ד	שם מסחרי באנגלית	שם מסחרי בעברית	חומר פעיל	חומר פעיל נוסף	קבוצה תרפויטית	בע"ח בהתוויה	מינון ע"פ ההתוויה	ימי המתנה ע"פ ההתוויה	התוויה נגד ואזהרות	תוקף רישום	מס' רישום
26	PANACUR 4% VETERINARY	פנקור 4% וטרינרי	FENBENDAZOLE		אנטיהלמיניטים	חזירים	מנה מומלצת: 5 מ"ג פנבנדזול לק"ג משקל גוף. לנגעים בתולעי כליות - 10 מ"ג פנבנדזול לק"ג משקל גוף. חזירים לפיטום במשקל 20 ק"ג, תצרוכת מזון של 1 ק"ג לחיה ליום: מינון תרפויטי במנת מזון יומית: 2.5 ק"ג אבקת פנקור לטון תערובת מזון. פיזור מינון תרפויטי על פני 5-15 ימים: עבור 5 ימי טיפול - 0.5 ק"ג אבקת פנקור לטון תערובת מזון. עבור 10 ימי טיפול - 0.25 ק"ג אבקת פנקור לטון תערובת מזון. עבור 15 ימי טיפול - 0.17 ק"ג אבקת פנקור לטון תערובת מזון. חזירות במשקל 200 ק"ג, תצרוכת מזון של 2 ק"ג לחיה ליום: מינון תרפויטי במנת מזון יומית: 12.5 ק"ג אבקת פנקור לטון תערובת מזון. פיזור מינון תרפויטי על פני 5-15 ימים: עבור 5 ימי טיפול - 2.5 ק"ג אבקת פנקור לטון תערובת מזון. עבור 10 ימי טיפול - 1.25 ק"ג אבקת פנקור לטון תערובת מזון. עבור 15 ימי טיפול - 0.83 ק"ג אבקת פנקור לטון תערובת מזון.	בשר ושיירים: 7 ימים		12-2024	163 44 35216 00
27	ROBENZ 66 G	רובנז 66ג' וטרינרי	ROBENIDINE HYDROCHLORIDE		אנטיבקטריאלים -קוקסידיוסטטים	תרנגולי פטם תרנגולי הודו	יש להוסיף 540-66G לכל טונה מזון	5 ימים	לא לשימוש במטילות אין לתת בו זמנית עם תכשיר אחר למניעת קוקסידיוזיס.	04-2025	143 37 33185 00
28	SACOX 120	סאקוקס 120 וטרינרי	SALINOMYCIN		אנטיבקטריאלים - קוקסידיוסטטים - יונפורים	תרנגולות פטם	583-70-120 של סאקוקס לכל טונה (השווה ל- 70-120 סלינומיצין סודיום לכל טונה מזון).	1 ימים	למתן לתרנגולות מטילות עד גיל 12 שבועות בלבד אין לתת לתרנגולות רביה. לא לשימוש במטילות אין לתת לסוסים והודיים. אין לערבב או לתת יחד עם כל תכשיר רפואי בעל אופן פעילות רפואית דומה לסלינומיצין אין לערבב או לתת עם תכשיר רפואי המכיל טיאמולין למשך 7 ימים לפני ואחרי הטיפול בסלינומיצין.	07-2023	083 83 92411 00
29	SULFAMETHOPRIM PREMIX VETERINARY	סולפמתופרימ פרמיקס וטרינרי	SULPHADIAZINE	TRIMETHOPRIM	אנטיביוטיקה	תרנגולי פטם תרנגולי הודו עגלים יונקים Pre ruminating	תרנגולי פטם: 1 ק"ג סולפמתופרימ פרמיקס לכל 1000 ק"ג מזון למשך 5-7 ימים. תרנגולי הודו: 1 ק"ג סולפמתופרימ פרמיקס לכל 1000 ק"ג מזון למשך 5-7 ימים. עגלים יונקים לפני הקמת מערכת מעלי גירה: 3 ק"ג סולפמתופרימ פרמיקס לכל 1000 ק"ג מזון למשך 7 ימים. דגים: 240ג' סולפמתופרימ פרמיקס לכל 1 טון דגים משקל חי, למשך 7-10 ימים.	8 ימים 5 ימים	אין להגיש לעגלים עם מערכת מפותחת של מעלי גירה אין להגיש למטילות המייצרות ביצים למאכל אדם * מופיע רק בעלון באנגלית	03-2030	081 23 92209 01