

## דף מידע לניתוח ורידים מורחבים (דליות) של האשך (Varicocele)

### רקע

ורידים מורחבים של האשך (וריקוצלה) הוא מונח המתאר התרחבות של הוורידים (דליות ורידים) המנקזים את האשך. ממצא זה מופיע לרוב מסביב לאשך השמאלי, בדרגות חומרה שונות. מקור הבעיה בנערים אינו ידוע ומשערים כי הוא נובע ממהלך מפותל וארוך יותר של וריד האשך השמאלי ומניקוז מופרע שלו לתוך וריד הכליה.

בדרך כלל זהו מצב חסר סימפטומים, ורק במעט מהמקרים חשים תחושת כובד וכאב קל, בעיקר במאמץ. המצב קיים בנערים ומתבגרים ולעיתים עלול לפגוע ביצירת זרע באותו אשך במבוגרים. נמצא כי יותר משליש מהגברים המגיעים לטיפול בעקרות סובלים מבעיה זו.

וריקוצלה מתגלה באופן מקרי, בדרך כלל במהלך בדיקת הנער לפני גיוס. האבחון מתבצע בבדיקת רופא כירורג או אורולוג, וכן בעזרת אולטרה סאונד של האשכים. ישנן דרגות שונות של מצב זה, ורק כשמדובר במצב חמור מופנה הנער להתערבות רפואית. הטיפול המוצע בדרך כלל הוא ניתוח היכול להתבצע באופן מסורתי דרך הבטן, המפשעה או בגישה הלפרוסקופית.

### לפני הניתוח

הניתוח נערך בצורה מתוכננת ולא דחופה. על ילדכם להיות בצום שש שעות לפני הניתוח, כדי למנוע שאיפה של אוכל לתוך דרכי הנשימה, כתוצאה מחומרי ההרדמה המרפים את השריר החוצץ בין דרכי הנשימה לדרכי העיכול. שתייה של מים או תה מותרת עד שעתיים לפני הניתוח.

## מהלך הניתוח

ניתוח וריקוצלה מבוצע באשפוז וכרוך בהרדמה כללית. במהלכו המנתח קושר את הוורידים המורחבים. ניקוז האשך לאחר הניתוח מתבצע בוורידים חלופיים ואין עם כך בעיה.

## אחרי הניתוח

ההחלמה מהניתוח היא קצרה ולרוב ללא סיבוכים. מיד לאחר ההתעוררות יכול הילד לאכול או לשתות. כמו בכל ניתוח, גם בניתוח זה עלולים להופיע כאבים. אחיות המחלקה עוקבות באופן שוטף אחר עוצמת הכאב. תרופה נגד כאבים ניתנת באופן קבוע ביממה הראשונה לאחר הניתוח, כל 4-6 שעות דרך העירווי המחובר לווריד, ובמידת הצורך ניתנות גם תרופות אחרות.

## כיצד תנהגו בביתכם

עם השחרור מבית החולים תוזמנו לביקורת ראשונה, כשבוע ימים לאחר הניתוח, לביקורת למרפאתנו. יש לציין כי כיום אנו סוגרים את הפצעים בדרך כלל עם תפרים מסיסים הנושרים עצמונית בתוך כשבועיים ואין צורך בהוצאת תפרים! עד לביקורת במרפאה יש לעודד את הילד לנוע, לנשום עמוק ולרדת מהמיטה. במידה וישנם כאבים יש לתת תרופות נגד כאבים. כדאי להימנע ממאמץ גופני במשך כשבועיים לאחר השחרור מבית החולים, כדי למנוע כאבים ופתיחה אפשרית של הפצעים אשר אינם חזקים עדיין כרקמה הרגילה. אם הילד מרגיש לא טוב ומופיעים חום גוף גבוה, בחילה והקאה יש לפנות מיד לרופא המטפל או ליחידה לכירורגית ילדים. יש לשים לב לפצעים ולזכור כי אודם, כאבים, בצקת או הפרשה באזורי פצעי הניתוח מחשידים לזיהום מקומי בפצע הניתוח, וגם במצב זה יש לפנות מיד לרופא המטפל או ליחידה לכירורגית ילדים.