

דף מידע אודות בדיקת גסטרוסקופיה

המכון הגסטרואנטרולוגי ממוקם בקומה 6 באגף הישן (סמוך לבניין מרפאות החוץ).
יש להירשם תחילה בבניין מרפאות חוץ.

עליך להביא:

- התחייבות כספית מקופת חולים. חיילים - אסמכתא תקציבית.
- מכתב הפניה מרופא המשפחה הכולל מידע לגבי מחלות רקע ותרופות קבועות.
- **נבדק מתחת לגיל 18** חייב בליווי הורה, **נבדק שאינו בר חתימה** יגיע בליווי אפוטרופוס + צו בית משפט.
- **הריון:** לחלק מחומרי ההרדמה עשויות להיות תופעות שליליות על העובר. לכן אם הנך בהריון או שיש סיכוי שאת בהריון אנא ידעי את הצוות המטפל בקבלתך.
- **הבדיקה מבוצעת תחת זריקת טשטוש על כן יש להגיע עם מלווה. אסור לנהוג לאחר הבדיקה!**

תרופות מיוחדות:

נוגדי קרישה:

- קומדין - יש להפסיק 5 ימים טרם הפעולה.
- פרדקסה, אליקוויס, קסרלטו - יש להפסיק 48 שעות טרם הפעולה (72 שעות במידה וקימת פגיעה בתפקוד הכלייתי).
- קלקסן - יש להפסיק 24 שעות טרם הפעולה.
- פלביקס 5 - יש להפסיק 5-7 ימים טרם הפעולה.
- חובה להיוועץ עם רופא המשפחה לגבי האפשרות להפסיק את טיפול בנוגדי הקרישה/ צורך בטיפול חלופי.**

תרופות נגד סוכרת/ להרזיה:

- ויקטוזה, סקסנדה, ריבלסוס - הניתנות באופן יומי - יש להפסיק ליטול 3 ימים טרם הפעולה.
- טרוליסיטי, אוזמפיק - הניתנות באופן שבועי - זריקה אחרונה 14 יום טרם הפעולה.
- באם את/ה דוק/ה לטיפול אנטיביוטי מניעתי, עליך להיוועץ עם רופא המשפחה שלך לגבי נטילת התרופות.

ההכנה לבדיקה:

- עליך להיות בצום מוחלט 8 שעות לפני הבדיקה (מומלץ לאכול ארוחה קלה בלבד לפני תחילת הצום).
- בחולי סוכרת או אלו המטופלים בתרופות לסוכרת/הרזיה - מומלץ צום של 12 שעות.

מטרת הבדיקה:

- במהלך בדיקת הגסטרוסקופיה מבוצעת הסתכלות ישירה לתוך חלל הושט, הקיבה והתריסריון.
- הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר בצורת צינור גמיש ודק המוחדר דרך הפה. במהלך הבדיקה ניתן לאבחן, ליטול דגימות (ביופסיות), לבצע עצירת דימום מדרכי העיכול העליונות.

כיצד מתבצעת הבדיקה ומה מרגישים בזמן הבדיקה?

- תקבלי/י חלוק שתלבשי/י לאחר שתפשיטי/י את בגדיך.
- בחדר הבדיקה תשאל אותך אחות שאלות על מצב בריאותך, ניתוחים שעברת, תרופות שאת/ה נוטל/ת באופן קבוע ורגישויות לתרופות.
- תתבקשי/י לחתום על טופס הסכמה לבדיקה.
- הבדיקה מתבצעת כאשר את/ה שוכב/ת על הצד.
- האחיות תחבר לאצבע שלך מכשיר קטן לצורך ניטור של הדופק ורמת החמצן בדם לפני, במהלך ולאחר הפעולה.
- תוחדר ברנולה לצורך קבלת גישה ורידית - דרכה הרופא ייתן לך זריקת טשטוש שתגרום לך להיות רדום/ה בזמן הבדיקה.
- תינתן תוספת חמצן באמצעות משקפי חמצן.
- הבדיקה נמשכת כ- 15 דקות.



מה קורה לאחר הבדיקה?

- בתום הפעולה תועברו/י לחדר התאוששות, שם תנוטרו/י עד להתעוררות מלאה.
- לאחר התעוררות תקבלו/י שתיה ומזון קל.
- רופא ישחרר אותך לאחר כשעה, ימסרו לך תוצאות הבדיקה ומכתב עבור הרופא המטפל.
- חשוב שיהיה לך מלווה בגלל השפעת זריקת הטשטוש.
- אסור לנהוג לאחר הבדיקה.
- תקבלו/י הנחיות לגבי חידוש כלכלה וחידוש תרופות קבועות מהאחות ומהרופא המשחרר.

אילו תופעות לוואי יכולות להופיע לאחר הבדיקה ומה לעשות במקרה שיופיעו?

- תחושה של אי נוחות בבית הבליעה שיכולה להמשך עד 48 שעות.
- אם נלקחו דגימות למעבדה או נכרת פוליפ, יתכן ויופיע דימום.
- קיים סיכון נמוך להתנקבות של המעי, במקרים נדירים יש צורך בתיקון ניתוחי.
- בכל מקרה שבו יש דימום, כאב בטן משמעותי או חום - יש להתקשר למכון הגסטרואנטרולוגי בטלפון: 04-8359426 עד השעה 15:00. אחרי השעה 15:00 יש לפנות לחדר המיון של ביה"ח בני ציון או למר"מ של קופת חולים.
- אסור לך לנהוג ביום הפעולה בשל השפעות הטשטוש.

מתי מקבלים את תוצאות הבדיקה?

דו"ח הפעולה יימסר בשחרור ממכון הגסטרו. אם נלקחו דגימות במהלך הפעולה - הן יועברו למטופל/ת באמצעות מייל מאובטח וכן לרופא המפנה באמצעות המערכת הממוחשבת בקופת החולים כעבור כ- 4-6 שבועות. במקרים מסוימים תוזמן/י לשיחה עם רופא לצורך קבלת הנחיות טיפוליות נוספות.

צוות מכון הגסטרואנטרולוגי מאחל לך בריאות שלמה

