

ליולדת שלום רב ומזל טוב,

### הנדון: הסבר על בדיקת שמיעה ליילודים

כמקובל בכל המרכזים הרפואיים המתקדמים בעולם, יש צורך לבצע בדיקת שמיעה לכל פג ולכל יילוד הנמצא בסיכון לליקוי שמיעה.

למרות שהסיכון לליקוי שמיעה הינו קטן, חשוב לבצע בדיקת שמיעה כדי לגלות ליקוי כזה מוקדם ככל האפשר. זאת על מנת למנוע איחור התפתחותי, במיוחד בתחום התפתחות הדיבור ורכישת השפה.

בדיקת השמיעה מבוצעת ע"י רופאה, באמצעות מכשיר ממוחשב שבודק את תגובת המוח לגירוי קולי (BERA), ע"י אלקטרודות המודבקות לראש והשמעת צלילים לאוזניים.

בדיקת ה-BERA איננה פולשנית ואיננה כרוכה בכל כאב או אי-נעימות. היא אינה פולטת כל קרינה או כל דבר מזיק ומסוכן כלשהו. כמו כן היא איננה דורשת שיתוף פעולה מצד היילוד.

**כדי למנוע אי דיוקים של תוצאות הבדיקה, חשוב שהיילוד ישן ולא יזוז בזמן הבדיקה.**

לכן כהכנה לבדיקה זו, יקבל היילוד סירופ TRICHLONAM במינון נמוך להרגעה (לא להרדמה), כדי שישן במשך הבדיקה (זוהי תרופת טשטוש בלבד).

כל יילוד לפני הבדיקה יעבור בדיקת רופא ילדים כדי לוודא שאין כל ממצא היכול להפריע לבדיקה. מיד לאחר הבדיקה, תימסר תשובה ראשונית בעל-פה להורים, ותשובה סופית תישלח בדואר.

**יש לציין, כי עליך לרשום את היילוד לקופת חולים, על מנת שתתאפשר קבלת התחייבות לבדיקה זו.**

**לפני הבדיקה, יש לבצע מספר פעולות:**

1. צום של שעתיים.

2. על היילוד להיות עייף כדי שיירדם בבדיקה. לשם כך יש להעירו כשעתיים מוקדם משעת ההשכמה הרגילה שלו ולדאוג שישאר ער עד לבדיקה (כדי שיירדם בקלות לאחר מתן הסירופ).

3. מומלץ לשקול את היילוד עד שבוע לפני הבדיקה, היות והתרופה ניתנת בהתאם למשקלו.

4. לאחר מתן הסירופ רצוי להאכיל את היילוד.

5. לנוחיותכם וכדי להקל על הרדמת היילוד, מומלץ להביא אתכם עגלה או סל-קל.

לביורורים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם במרפאת אא"ג הממוקמת בבנין מרפאות חוץ, קומה ראשונה, או בטלפון: **04-8359449** בין השעות 8:00-13:30.

**נא להעביר בפקס טופס התחייבות : 04-8359273.**

בברכה,

צוות מרפאת אף אוזן גרון

